

1195.

1697^E. 2 f. (19)

23,506/B

J. X. m.
18

Mr R. J. T. Lucas H. 06


$\frac{G}{b} r$



EMMENOLOGIA.

AUTHORE

JOH. FRIEND M.D. Col. Med. Londin.
& Societatis Reg. Soc.



Malma Friend

Imprimatur.

GUL. DELAUNE.

Vice-Can. Oxon.

Novemb. 1. 1703.

EMMENOLOGIA:

IN QUA

Fluxus Muliebris Menstrui

PHÆNOMENA,

PERIODI, VITIA,

CUM

MEDENDI METHODO,

AD

RATIONES MECHANICAS

Exiguntur.

AUTHORE

JOH. FRIEND M.D. *Coll. Med. Londin.
& Societatis Reg. Soc.*

EDITIO TERTIA.

LUGDUNI BATAVORUM:

Apud Janssonios Vander Aa. MDCCXX.

MEMORANDUM



MEMORANDUM

MEMORANDUM

MEMORANDUM

MEMORANDUM

MEMORANDUM

MEMORANDUM

MEMORANDUM

MEMORANDUM

MEMORANDUM

MEMORANDUM



PRÆFATIO.



MI SERA profectò videtur
& iniqua foëminarum con-
ditio, ut, quæ humani ge-
neris conservatrices à natu-
râ destinatæ sint, eadem morbis maxi-
mè obnoxia effingerentur. Quamcun-
que enim vitæ rationem sequantur,
paucæ sunt, quibus contingit doloris
expers & illibata sanitas: quippe si
conjugio fruantur, ex eo ipso leporum
fonte amari aliquid surgit, & longa
saltem tædia, si nihil asperius, secum
affert graviditas; si cœlibi otio se tra-
dant, vix ita sibi cavere possunt, quin
morbo aliquo laborent, ob id ipsum,

P R Æ F A T I O.

quia non fiunt gravidaë. Eæ enim sanguinis suppetiæ, quas in foetûs usum atque alimentum accumulare debent mulieres, si paulò ultra debitum modum aut intus excrescant, aut foras profluant, mille in tenello corpore turbas excitant. Eo quidem artificio efformatur muliebris fabrica, ut certis quibusdam temporibus depleri possit ista sanguinis redundantia : infinita tamen indies obversantur mala, quæ salutare hoc naturæ opus interpellant ; ita ut, ne, evacuatione hæc minùs rite peractâ, sua foeminis malè constet sanitas, ars in subsidium advocanda sit. Quæ cùm ancilla quædam & ministra sit, quæ naturæ opus, siquid obstaculi intervenerit, promoveat atque expediat ; nisi agendi modum, quo utitur natura, accuratè intellexerit, ita parum illius conatibus auxilio erit, ut vix potuerit non admodum officere. Investigato autem naturæ tramite, ars siquando eam sequi atque æmulari velit, nullo errore huc illuc temere vaga-

P R Æ F A T I O.

vagabitur, sed ad metam rectâ contendet.

In hâc quidem, quam aggredimur, disquisitione non utili minùs quàm jucundâ, elaborârunt seculorum pene omnium ingenia: sed ut nullum serè est argumentum, de quo plura scribunt medici; ita nec ullum, in quo lectori minùs satisfaciunt. Quâ in re quòd tam infelicitèr cesserit viris tum doctrinâ tum studio ad hanc rem satis instructis, nullam aliam causam reperio, nisi quòd abstrusissima quæque principia & maximè recondita sequerentur; simpliciora verò, & quæ quasi ante pedes jacuerunt, aut non viderent, aut contemnerent. Ita cùm ingenio suo abrepti, in rebus admodum obscuris immorarentur, non mirum est, si suorum potiùs somniorum fuerint, quàm naturæ interpretes. Hæc faciliè sentiet, siquis eos, qui de mensibus ad satietatem usque scripserunt, authores pervolvat; qui quidem fere omnes iis ratiociniis men-

P R Æ F A T I O.

fium naturam explicant, quæ ipsa debuerant, nec tamen possunt, explicari. Talia sunt eorum, qui à lunæ phasibus, aut archæo, aut fermento quodam menses deducunt, commenta. Quòd si naturæ vestigia fideliter legamus, ipsa nobis se ultro indicabit; neque unquam æquè feliciter innotescet corporis humani machina, ac si leges eas, quas Mechanicis h. e. suis motibus præscripsit natura, consulamus. Hisce enim principiis unicè inniti debent vera Physices fundamenta: quibus quicquid superstruxeris, id non modò simplicitate suâ legentis studium excitabit, sed evidentiam etiam assensum coget.

Dolendum sanè est Theoriam Medicinalem, quæ in multis saltem eadem certitudine ac Geometria elaborari potest, uti ferè in authorum scriptis tractatur, non modò conjecturalem videri, sed & absurdam; in quibus quidem eæ, quæ de morborum causis finguntur, Hypotheses, ita parum ad seve-

P R Æ F A T I O.

severiorem rationis normam accedunt, ut præclarè satis actum sit, si non sensui planè repugnent. Multa sunt, quæ ingenuum hunc medicinæ fontem contaminârunt; nihil tamen penitiùs inquinavit, quàm infamis iste, qui in artem medicam dudum irrepsit, Chymixæ abusus: abusus inquam, quia si intra proprios limites consistat Chymia, nullum humanis commodis æquè inservit Instrumentum, nullum vel citiùs, vel efficacius morbos abigit. Hujus quippe provincia est, pharmacis eleganter concinnatis & quasi contractis medicinam Præcticam ditare: quòd si ulterius excurrat Chymia, & ad morborum Theoriam sua accommodet principia, ingenia alioquin peracuta in errores agit, & vanâ scientiæ imagine deludit. Quid enim ea aut in causis morborum ritè explicandis, aut symptomatis feliciter curandis præstare possunt principia, quæ ita nulla sunt, ut in animo quidem philosophantium locum fortasse habeant, in rerum tamen naturâ

PRÆFATIO.

naturâ minimè existant? De quibus etiam inter ipsos disciplinæ hujus fautores nondum convenit. Utcunque verò commentitia fuerint Chymicorum elementa, à plerisque tamen ad morborum cognitionem illustrandam adhibentur: eo utique successu, ut non plus commodi Praxi medicæ, quàm Theoriæ detrimenti intulerit Chymia. Ita arti per se satis rationali offecit, uti hætenus tractata est, Philosophia Chymica: cujus tamen penitior scientia ita medicinæ prodesse poterit, ut si ad Mechanicas rationes exigatur, (quod fieri aliquando posse non desperandum est) nihil sit, quod etiam Theoriæ illustrandæ magis inservitutum videatur.

Sed huic de morbis scientiæ, depravatæ admodum & pene intermortuæ, medicas tandem manus adhibuit, vir studii atque ingenii admirabilis, Bellini: qui quidem in artem medicam introduxit sanius quoddam ratiocinandi genus, ex Mechanices at-
que

P R Æ F A T I O.

que Anatomix fontibus depromptum. Eam utili Theorix facem prætulit, quæ & hodie ad hoc studium præclara quædam ingenia excitavit, &, si rectè auguramur, felicibus posterorum coeptis prælucebit. Etenim hinc omnino investiganda est vera morborum, tum causa, tum indicatio; hujusmodi quippe principia non modò certa & naturæ maximè congrua reperiuntur, sed & intellectu etiam facillima. Optandum esset ut provinciam hanc susciperent, quibus medicinæ palma, ab exteris etiam, ultro concessa est, medici nostrates; famamque eam, quam in curatione morborum illustrandâ jure obtinuit, in Theoriâ quoque excolendâ sibi vindicaret Anglia. Eam quippe desideramus Theoriam, quæ à Praxi felicissimâ sit deducta, ad eamque rursus accommodata: quæ cùm hætenus ferè nuda fuerit & more tantùm philosophico descripta, hodie fortè minùs æstimatur; dum ii qui rationem illam, quâ ad Praxin applicanda sint elementa

P R Æ F A T I O.

elementa Mechanica, parum perspiciunt, ea ne omnino quidem applicari posse arbitrantur.

*Quòd si ex elementis hisce Mechanicis optimè educatur Theoria medica, Muliebrium certè, siqua alia, morborum causa haud ita difficilis est, quin magnâ saltem ex parte perspici atque illustrari queat. Et sanè operam nostram nullum æquiùs postulat argumentum, quàm ut morbis istis quàm certissimum remedium excogitemus, qui cùm in foeminis gravissimos dolores excitant, tum in nobis etiam, qui humanitati pariter & medicinæ studemus, non vehemens minùs curandi studium excitare debent. Cùm autem universi ferè, quibus mulieres laborant, morbi ab aliquo mensium vitio, uti rectè notat Hippocrates, deriventur; hoc haud malè collocâsse videbor, si mensium naturam paulò luculentius, quàm hactenus in libris tractatam reperio, explicare sim aggressus. In quo quidem opusculo nihil reconditum, nihil à
communi*

P R Æ F A T I O.

*communi sensu longiùs remotum reperiet
lector : siquidem id mihi unicè curæ
fuit, ut veritatem, quàm maximè pos-
sem, assequerer ; quæ quo magis ob-
via & familiaris fuerit, eo solet esse ac-
ceptior.*


C A P.





I N D E X

C A P I T U M.

1.  *E Purgationis menstruæ naturâ.* Pag. 1
2. *Variæ de mensibus opiniones recensentur.* P. 3
3. *De Plethoræ causis, & quare fiat in Fœminis.* p. 12
4. *De Structurâ Uteri & Vaginæ.* p. 19
5. *De modo quo menses movet Plethora.* p. 21
6. *Argumenta contra Plethoram refelluntur.* p. 30.
7. *De Periodis.* p. 36
8. *Phænomena mensium explicantur.* p. 47
9. *De*

9. *De iis quæ aut citiùs cient, aut diu-
tiùs retardant menses.* p. 58
10. *De Symptomatis quæ à suppressis
mensibus oriuntur.* p. 66
11. *De methodo in Suppressis mensi-
bus Therapeuticâ: cui subnectun-
tur Historiæ.* p. 95
12. *De Symptomatis quæ à mensium
fluxu immodico oriuntur.* p. 127
13. *De Methodo in fluxu mensium im-
modico Therapeuticâ: cui adjici-
untur Historiæ.* p. 135
14. *De Remediorum Viribus & Ope-
ratione.* p. 147





C A P. I.

De Purgationis Menstruæ naturâ.

PURGATIO *menstrua*, sive fluxus sanguinis ab utero singulis mensibus emanans, periodos suas communiter inchoat *secundo septenario*, terminat *septimo*, sive numeri septenarii quadrato: communiter dico, quia nonnullæ sunt mulieres, in quibus tardiùs inchoatur fluxus; paucae etiam, quas multò ante annum decimum quartum invadit; aliæ rursus, quas post quadragesimum nonum non deserit: memorantur præterea foeminae menstruis prorsus immunes.

Evacuati sanguinis *quantitas* pro varietate temperamenti, victûs, ætatis &c. diversa est: in sanis tamen & adultis vulgò assurgit ad uncias viginti, quibus convenit mensura ab *Hippocrate* assignata, duæ scilicet *Heminæ*^a. Nec minor est in *qualitate* diversitas; aliquando enim ad *Lympham* propiùs, quàm ad sanguinem accedit humor menstruus: in sanis verò reperitur *rubicundus* valde & *floridus*, qualis (uti idem notat *Hippocrates*^b) è venâ sectâ Vi-

^a *Morb. Mul. lib. I. f. 15.*

^b *Id.*

Ætimæ recenter mactatæ cruor effluit. Qui tamen nonnunquam ita vitatur, ut pene inter venena referendus sit: sed hoc non proprio ipsius vitio debetur, sed admixtis fordibus & aliunde ducto contagio. Qui aliter censet, Authorum de hâc re argumenta consulat.

Eadem est *Periodorum* inconstantia; est enim ubi die 27 aut 20, est ubi *bis* in mense, uti in *salacibus* observat *Duretus*^a, etiam aliquando absque sanitatis noxâ^b. Est demum, ubi *ne semel* in mense redit periodus: quæ tamen frequentissimè singulis *mensibus* recurrit. Pari modo se habet fluxûs *duratio*: in aliis enim *trium*, in aliis *quatuor*, in nonnullis non nisi *sex* dierum spatio terminatur: plerumque tamen *triduo* absolvitur^c.

Hæc omnia phænomena in sequentibus locus erit expendere; nunc ad ea, quæ sub mensium fluxu ferè solent accidere, veniendum est.

Instante fluxu, in puellis saltem nondum purgatis, hæc præcipuè observantur symptomata, *Dolor & æstus partium vicinarum, ad lumbos præsertim & coxas*, aliquando etiam *inflammatio, cephalalgia, appetitûs remissio, crurum lassitudo*; durante profluvio, invadit sæpe *nausea & languor*.

In *Biliosis* temperamentis paulò maturiùs fluunt menses, citiùsque periodos suas faciunt; in puellis mollioribus & *minùs sanguineis* feriùs erumpunt. Ita si regio paulo cali-


^a In Holler. 255.

^b Panarol. Cent. 2. Obs. 41. Med. Septentr. p. 33.

^c Hipp. de Morb. Mul. I. S. 15.

dior sit, anno uno aut altero septenarium secundum anteverunt ; si *frigidior*, excedunt. In *prægnantibus*, etiam & ferè semper in *lactantibus* deficiunt ; saltem tertio mense elapso non reperiuntur in gravidis. Ex *diuturniore morbo convalescentes* ægrè & non nisi tardè admodum revivunt. Fœminis *gulæ deditis* & genio liberiorius indulgentibus fluxus sæpe ad sextum diem & ultra extenditur ; in *obesioribus*, & iis qui aut *tenui victu* aut *exercitio multo* utuntur, citiùs terminatur. Quantitas sanguinis evacuati ad *ætatis* usque *florem* augetur ; *florente ætate*, æqualis permanet ; *ætate* rursus *declinante* paulatim minuitur. In *junioribus* tenuior, in *senibus* crassior reperitur sanguis.

Varietatis hujusce ratio explicabitur in eâ, quam tractaturi sumus, periodorum doctrinâ.



C A P. II.

Varie de Mensibus Opiniones recensentur.

CAusas hujusce fluxûs, ad oceani morem stato tempore æstuantis, & studio investigârunt & scriptis tradiderunt medici, tum veteres, tum recentiores : infinitum esset quid de iis quisque senserit, referre ; satis erit argumentorum capita depromere, ut, si illorum sententiæ nobis parum placeant, quid melius possit exquiri, videamus.

In *causis* igitur investigandis, alii *finalem*, alii *efficientem* assignant; nonnulli, uti *Galenus*, utramque.

Causa finalis fluxûs menstrui ab Authoribus statuitur, vel *mulieres ad concipiendum aptiores reddere*, vel *fœtui præbere nutrimentum*. Qui priorem sententiam amplexi sunt^a, menstruum fluxum ideo necessarium esse dicunt, ut sanguis à sordibus & recrementis purgatus, tum foeminas magis ad coitum impellat, tum semen feliciùs excipiat. Huic argumento facilè occurritur; neque enim in sanis sanguis ille, qui ejicitur, impurus est aut vitiosus, sed optimus & fragrantissimus: quippe non glandulæ alicujus ope secernitur, sed ex capillaribus arteriis erumpit, ideoque naturam arteriosi, h. e. *purissimi* sanguinis retinet. Quòd si hæc menstrua purgatio conceptui promovendo ita esset necessaria, nullæ certè conciperent mulieres, nisi quibus fluxerint Menses; quod quidem experientiæ & Historiæ Medicæ prorsus repugnat^b.

Alteram ex finalibus causis asserit *Galenus*, eique scriptores ferè omnes assentiunt; refragantur tamen nonnulli, & his duobus potissimum argumentis in *Galenum* insurgunt.

1°. *Ne guttulam quidem materni sanguinis ad fœtum derivari aiunt; quia scilicet neque ulla datur inter Vasa Uterina & Umbilicalia Anastomosis: neque fœtus sanguine, sed succo lacteo per os nutritur*^c: qui hoc asserunt, pari

^a Charleton, Sylvius.
Med. Septentr. p. 30. Sennert. tom. 3.
Catamen. p. 36. & 43.

^b Hild. l. 5. obser. 41. Bonet.

^c Charleton de

etiam ratione possent dicere infantes à materno sanguine non haurire alimentum, quoniam lacte, non sanguine nutriuntur. Unde verò id ipsum lac suppeteret, nisi ex materni sanguinis penu ad mammas deferretur? Jam in foetu nutriendo eadem valet ratio; siue enim ipso matris sanguine per arterias uterinas delato, siue liquore, qui in *Amnio* continetur, alatur foetus; utrinque facilè constat sanguinem maternum foetui alendo inservire: quis enim istius liquoris aliam investigabit originem, qui cum ex materno sanguine derivari neget? ita ut si concedatur foetum *per os* nutriri, quicquid fuerit pabuli, id omne à matre sit petendum. Foetum vero *per os* solummodo non nutriri, satis probant monstra sine capite in lucem edita, & nonnulli ore naribusque obturatis infantes: ulterius adhuc processit Medicorum^a in re Anatomicâ peritia, & foetum, placentâ intercedente, sanguine materno ali luculenter satis evicit. Exhibuit enim eam, (quam negant nonnulli^b) inter *vasa uterina* & *umbilicalia Anastomosis*: cum enim ovum in utero per septimanam unam aut alteram fluctuârit, ab eo, uterinâ lymphâ mollito & humectato, erumpunt protinus vasorum *umbilicalium* stamina, pari modo atque ex semine in terræ gremium immisso undique se diffundunt fibræ: hæc interiori uteri tunicæ ita se insinuant, ut vena umbilicalis arterias matris hypogastricas penetret, arteriæ verò umbilicales venis maternis inferan-

^a *Columb. Anatom. p. 460. Casser. Placent. Tab. 5.* ^b *Wharson, Charleton.*

tur. Per hos aditus perennis inter foetum & matrem agitur sanguinis circuitus: scilicet umbilicalis vena arteriosum sanguinem à matre accipit, quem in foetûs usum ad venam cavam, adeoque ad cor deducat; uti arteriæ umbilicales sanguinem, nutriendo foetui parum idoneum, in venas maternas regerunt. Quòd si nulla per hæc vasa daretur nutritio, non modò pabulo suo defraudaretur foetus, sed ne tunicæ quidem, quibus obvolutus est, ullo modo possent nutriri.

2^{do}. Negant causam esse *finalem* sanguinis menstrui, ut foetui in nutrimentum cedat, *quia quantitas novem mensium spatio evacuata nimis exigua videtur, ut alendo foetui sufficiat*^a. Utrùm verò sufficere possit necne, hujusmodi edocebit calculus. In foeminis rectè se habentibus sanguis menstruus effunditur ad uncias viginti; ita quantitas novem mensibus effusa erit lib. 15. quia verò nonnunquam accidit, ut gravidis etiam, per tres saltem priores menses, fluant menstrua, licèt, modica valde & immixta, supponatur effusi sanguinis quantitas eâ proportionem decrescere, ut primo mense dimanet $\frac{1}{2}$ seu $\frac{2}{3}$ 10, secundo $\frac{1}{3}$ seu $\frac{2}{3}$ 6 $\frac{2}{3}$ tertio $\frac{1}{4}$ seu $\frac{2}{3}$ 5, postea verò omnino deficiat: unciis demum $21 \frac{2}{3}$ ex lib. 15. subductis, quantitas sanguinis residua, quam prægnans in foetûs nutrimentum commodare possit, erit lib. $13 \frac{2}{3}$ 2 $\frac{1}{3}$. quæ si cum recenti foetu atque involucris omnibus in trutinâ ponatur, excedet pondere; nullumque dubio locum relinquet, quin

^a Bayle dissert. de Mensib.

embryoni incrementum satis idoneum largiri possit. Medium enim foetus recentis pondus est lib. 12, aliquando majus, frequenter etiam minus reperitur. Quod si prægñanti menses deficient, suppetunt ad alendum foetum lib. 15; quibus verò ultra uncias viginti assurgit fluxus, uti non rarò fit, eæ foetui, etiamsi monstrum sit, alimentum novimestre facilè ministrabunt.

Igitur non video cur à *Galen*i sententiâ recedendum sit, qui in *Definitionibus Medicis* hoc docet, τὰ κατὰ φύσιν παρέχει τῇ γυναικὶ πρὸς ὑγίαν ἐκκένετρα· ὁπιοχενδέντα ὃ δὲ τὸ σύλληψιν, τῷ ἐμβρύῳ τὸ τροφὸν παρέχει. *Tribuntur mulieri menstrua, quæ sanitatis gratiâ vacuentur; embryoni autem nutrimentum præbeant, per conceptum suppressa.* Quæ verba modò sint ritè intellecta, veritati optimè respondent. Ea enim quæ inter Scriptores multùm agitur quæstio, *An fœtus scilicet menstruo sanguine alitur*, perridicula est & à sanâ, h. e. *Galen*i mente alienissima: quasi verò ille unquam crediderit foetum nutriri eo ipso sanguine, qui foras ejicitur: quasi non hoc potius voluerit, sanguinem in muliere *redundare*, ut non tantùm proprio corpori alendo satis habeat, sed & concepto foetui *pabulum* insuper ministraret; ideo tamen per uterum extra gravitatem singulis mensibus expurgari, quoniam redundet: neque enim menses fluere, nisi redundaret sanguis, *Galenum* credidisse statim videbimus.

De *Efficiente* hujusce profluvii causâ non minùs inter se discrepant authores: dum alii *Lu-*

nam, alii *Fermentum* quoddam, alii denique *plethoram* statuunt. De his sigillatim pauca sunt dicenda, ut quænam ad veritatem propiùs accedat sententia, perspici queat.

Et 1^{mo} qui mensium causam à *Lunâ* petunt, hoc unico omnes ducuntur argumento, quòd fluxûs uterini periodus *Lunæ cursibus* respondeat, adeoque ad illius imperium dirigatur: quod sanè argumentum facilè & breviter convelli potest, si quis reponat menstruis periodos contingere *Lunæ* minimè congruentes, siquidem eæ frequentius *crescente* adhuc *mense*, quàm *exacto* recurrunt. Quòd si huic profluvio præesset *Luna*, mulieres omnes, quibus eadem esset regio, ætas, atque temperies, eodem tempore, iisdemque vicibus ad menstrua ciceret: quod tamen ita parum fit, ut ne fieri quidem possit.

2^{do}. A *Fermento* quodam menstruorum causam deducunt ex recentioribus plerique^a; quod quidem, diverso licèt vocabulo obvolutum, idem est ac apud *Democritum fervor uterinus*. Statuunt nimirum colluviem menstruam per uterum purgari ope *fermenti*, quod in totâ universi sanguinis massâ diffundi censet *Graaffius*, *Bayléus* verò uteri indigenam agnoscit. Uterque *fermentum* hoc in *salibus* quibusdam situm esse contendit, qui motu suo sanguinis massam ita exagitant, ut statis quibusdam temporibus, singulis scilicet mensibus, acriùs effervescat, & per uteri vasa exitum quærat. Quomodo peragatur hæc *fermentatio*, aut cur his periodis vi-

^a Graaff. Bayl. Etmüller.

res suas exerat, argumentis lectori parum satisfaciunt, verbis admodum imponunt. Eorum enim sententia, quæ propria *singulis visceribus fermenta* tribuit, non modò circulanti sanguini, sed communi sensui repugnat. Ubi enim *fermentum* istud delitescit, ubi tam securo fruitur hospitio, ut ab humoribus præterfluentibus minimè turbari aut abripi queat? quòd si *fermento sedem in visceribus* largiamur, unde ei tanta suppetit supellex, ut perpetuis impendiis exhauriri nequeat? Desideraret certè novi fermenti suppetias, ut perenne hoc fermentandi munus obiret. Altera de *fermentis* opinio, quòd scilicet *totius sanguinis massa fermentescat*, à veritate æquè aliena est: sive enim ad *Chymicorum* mentem exponatur *fermentatio*, actio scilicet *mutua acidi & alkali*; sive latiùs sumpta ^a *partium motum intestinum* denotet, neutro modo sanguini competere potest: non priori, quia in sanguine desit ^b *acidum*: non posteriori, quia fluidi cujuscunque partes, quæ sub iisdem planis horizontalibus jacent, *æqualiter* premuntur, adeoque ad *quietem* se componunt, nisi novo aliquo impetu in motum ciantur. Ita si daretur aliquis in sanguine *motus intestinalis*, brevi deficeret, nisi liquido, quod à corde immittitur, excitaretur denuo & revivisceret: quòd si à liquido, quod à corde influit, *motus intestinalis* oriatur, satis constat alium in sanguine motum dari non posse, præter eum, quo continuò progreditur & circulatur.

^a Willis de Febr. b

Boyle. Pitcarn.

Sed exolevit ferè hodie absurda illa de *fermentis* doctrina, & à sanissimis saltem scriptoribus jam diu explosa est. Quòd si aliquam rationis speciem præ se ferre queant *fermenta*, ad hunc modum exponi debent; nempe quòd in *utero* sitæ sint *glandulæ*, in quibus liquor sive *fermentum* quoddam secernitur, quod in sanguinem *singulis tantùm mensibus* deducitur, eumque in motum vividiorum fuscitans & rarefaciens, & uteri canales fortiùs distendens, viam *mensibus* aperit. Hoc verò fermentum *semel* tantùm in mense effunditur, quia ductuum excretoriorum orificia ita tenuia & angusta sint, ut id solâ vi quantitatis, spatio *menstruo* secretæ, exitum reperiatur; pari modo ac in *testiculis* fit. Hæc hypothesis, utcunque primâ facie cæteris paulò magis probabilis videatur, cum iis tamen æquè à veritate abhorret: idem quippe contra omnes de *fermentis* hypotheses valet argumentum, nempe si à *fermento*, non à *plethorâ* concitarentur *mensēs*, brevi spatio ea sanguinis quantitas foras effusa esset, quæ vitæ fomitem penitus extingueret. Contra *fermenta* acriter contendit in iuo de *Catameniis* libro *Charletonus*, & *Bayléi* sententiam satis viriliter evertit: qui tamen cum exponit suam, totum illud argumentum ex ipso *Bayléo*, iisdem per omnia ferè verbis expressum, mutuatur, quod paginis proximè præcedentibus rejecerat & refutârat.

3^{tio}. Denique *plethoræ* tribuit *Galenus* menstrui fluxûs originem, in libro de *Venæsectione* adversus *Erasistratum*, εχ αὐτῇ (φύσει) γυναι-

κας μὲν ἀπάσας ἐφ' ἐκάστῳ μηνὶ κενῶν, τὸ πλεονέκτον
 ἀποχέεσθαι ἔαται; ἔδει γὰρ, οἶμαι, οἰκοῖν τὸ
 θῆλυ γένος ἕτε ἰσχυροῖς πόνοις διατάρμενον, ἔδει
 ὁμιλεῖν ἡλίῳ καθαρῶ, ἔδει δὲ ἀμφὶ ταῦτα πλεῖστον
 ὑποτρέφον, ἵαμα φυσικὸν ἔχειν ἔπειτα πλεῖστον ἢ κένωσιν.
Nonne natura ipsa mulieres cunctas evacuat,
sanguine superfluo singulis mensibus foras ef-
fuso? quippe muliebri genus, quod domi a-
geret neque vehementibus laboribus exercere-
tur, neque sub claro sole viveret, & propterea
quamplurimos humores coacervaret, oportebat
opinor evacuationem hujusce plenitudinis,
tanquam remedium à naturâ datum, accipe-
re. Hanc de *plethorâ* sententiam multi post
Galenum secuti sunt; quam tamen apud au-
 thores ita parum illustratam reperio, ut neque
 luculenter satis appareat, vel quibus de causis
mensēs moveat *plethora*, vel quænam in fœ-
 minis vera sit ipsius *plethoræ causa*. Igitur
 quoniam his ritè explicatis menstrui fluxûs na-
 turam clariùs innotescere posse confidimus;
 disquiremus primò, unde originem deducat, &
 quomodo in fœminis crescat *plethora*; deinde
 quibus viribus, & quâ potissimùm de causâ,
 sanguinem *per uterina vasa* exoneret: quibus
 ultimo loco adjicientur argumenta, quæ *perio-*
dicum profluvii istius *recursum* expedient quo-
 dammodo, & illustrabunt.

C A P. III.

*De Causis Plethoræ, & quare fiat in
Fœminis.*

UT causis *plethoræ* investigandis rectiùs sternatur via, liceat his uti præmissis.

1^o. *Corpus omne in eodem statu permanere, si evacuatio additioni fuerit æqualis; & vice versâ.*

2^{do}. *Si animali cuius periodicæ aliqua supervenerit sanguinis eruptio, & idem exactâ eruptione status redierit qui sub initium periodi fuit, ita ut nec minùs nec magis ponderosum fiat animal, in eo ante eruptionem istam fuisse plethoram: & porro evacuationes omnes ante eruptionem factas additioni fuisse impares, at unâ cum erumpente sanguine æquales.*

Hæc per se satis liquent; unica quippe, ex quâ quantitas materiæ cujusque dignoscitur, mensura, est *pondus*. Si igitur corporis *pondus* idem maneat, manet eadem etiam *quantitas materiæ*; seu quod idem est, quantum additur corpori, tantum etiam & ab eo evacuat. Si verò minùs evacuetur quàm apponitur, crescet pondus corporis, adeoque quantitas materiæ erit major; quæ si ad hunc modum aucta in *vasis* sanguineis accumuletur, nec in habitum corporis diffundatur, inducetur sanguinis *plethora*, donec fiat eruptio. Ipsa autem eruptio per vices recurrens indicat sanguinem

non

non in carnes absumi, sed intra *vasa* coacervari.

Quocunque igitur in corpore talis oriatur *plethora*, ut necesse sit certis quibusdam periodis materiæ redundantis excretionem fieri, satis liquet omnes eas evacuationes, quæ periodorum intervallis factæ sunt, quantitate materiæ corpori ingestâ fuisse minores: quòd si corpus, factâ hâc excretionem periodicâ, in eundem cum illo statum redigatur, quem incipiente periodo obtinuit, sequitur omnino ultimam hanc evacuationem, intermediis omnibus conjunctam, ad mensuram quantitatis per totius periodi decursum ingestæ assurgere.

Et hæcenus quidem non tam *conjecturâ*, quàm *demonstratione* perventum est.

Itaque ut hæc omnia instituto nostro accomodemus, ex certissimis principiis concludi potest, cum fœmina, expurgatis mensibus, eundem obtineat corporis statum, quo sub periodi menstruæ initium fruebatur, (quod experientia confirmat) in eâ decursu istius periodi evacuationes cæteras assumptis alimentis impares fuisse: itidem, quia hæ fuerint impares, humorem nutritium in corpore redundare; qui si intra circulationis ambitum conclusus sit, sanguini eam, pro quâ contendimus, inferret *plethoram*.

In eodem verò statu jugiter permanere, tum ex *visu*, tum ex *staticâ*, probantur integræ valetudinis mulieres; in quibus totius ferè ætatis decursu nulla ponderis mutatio sentitur, modò eadem observetur vivendi ratio, idemque adhibeatur rerum, quas vocant, *Non-naturalium* usus.

usus. Sed ne fortè paulò altiùs excurrere videamur, libet ad medium aliquod, ne dicam perexiguum, tempus descendere; & id tantùm petimus, ut foemina sana, & mensibus ritè purgata, per quinque annos eadem permanere concedatur: hoc si impetramus, sequitur ex *Præmiss.* 1. evacuationes omnes eo quinquennio peractas alimenti copiae respondisse; è quibus tamen evacuationibus est *fluxus menstruus*; quod si, menstruis subductis, evacuationes reliquæ non responderint, patet ex *Præm.* 2. fuisse ante e-jectos menses in muliere *plethoram*.

Aliud argumentum, cur evacuationes cæteræ ad ingesta alimenta parum assurgant, ab ipsis mensibus desumi potest; si enim assurgerent, profluvium menstruum non tam inter *crises salutare*, quàm *morbos* poni deberet; & misellæ foeminæ quinquennii spatio sanguinis puri lib. 100, ut in capite præcedente demonstratur, frustra evacuarent, seu quod idem est, lib. 100 de pondere suo amitterent. Itaque tantùm abesset ut sano corpore fruerentur; corpus eo tempore vix haberent.

Pariter eâdem certitudine colligimus, secretionem in cæteris animalibus ingestæ materiæ respondere; quoniam, cùm ætatis florem consecuta sint, in eodem prorsus statu permanent; quia verò evacuationis additionisque eadem sit proportio, ideo in iis non accumulari *plethoram*: neque porro menses fluere debere, qui citra *plethoram* non moventur. His alia forsan in sequentibus adjicietur ratio, cur *bruta* fluxui menstruo non sint obnoxia.

Satis

Satis jam perspicuè ostensum est, in muliere dari *plethoram*; quibus verò de causis ista fiat redundantia, seu, quod idem est, quare in eâ deficiat totius alimenti evacuatio, hoc etiam si explicare potero, argumento plenius satisfacere videbor.

Perspirationem igitur, eâ enim secretionem alimenti pars longè maxima dissipatur, in fœminis *imminuere* probantur sequentia.

I. Uri observat, accuratissimus rerum investigator, *Sanctorius*^a *Vires imbecilles*: & has quidem à *molliori texturâ* rectè deducere videtur *Hippocrates*^b; quò enim magis *solidæ* fuerint partes, eò *robustior* fit corporis compages. Sed quæcunque sit imbecillitatis hujusce causa, certum est *mulieres* viris esse *imbecilliores*; idque ex *pulsu* satis innotescit. *Pulsus* enim *muliebrem* ferè *languescere* dicas, si cum *virili* conferatur; quod etiam annotavit *Galenus*^c; à *pulsu* porrò certissima *roboris* indicia sunt petenda. Quid enim est *robor*, nisi vis illa quæ à sanguine & spiritibus in membra derivatur? ea verò quomodo derivari potest, nisi cor, cujus solius motu diriguntur sanguis & spiritus, validiùs contrahatur? Quòd si cordis contractio sit validior, fieri nullo modo potest, ut non *fortiùs* increbrescat *pulsus*. De hoc qui dubitat, dubitare etiam potest, utrùm sit *pulsus*. Sed ut ad rem redeamus, *Sanctorii Aphorismus* ab iis quæ dicta sunt demonstrari potest: si enim *pulsus* sit *imbecillior*, minor

^a Med. Stat. f. 1. 52.
Puls. 3. 2.

^b De Gland. f. 11.

^c De Caus.

sanguinis quantitas ad glandulas, non inter-
cutes modò, sed alias omnes dato tempore de-
feretur, ideoque minor erit humorum secretio :
etiam id ipsum quod secernitur, propter eam
quam explicuimus *imbecillitatem*, è fibris,
quarum tensio remissior est, non ita promptè
aut fortiter exprimi potest.

Ad hunc modum à *viribus imbecillis* orie-
tur *perspirationis defectus*: quòd si in foemi-
nis *vasorum orificia* multò, quàm in viris, exi-
liora sint, (quod rationi fortè non repugnat,
quia & earum compages magis delicata sit, sub-
tiliúsque pertexta, & moles semper ferè con-
tractior) alterum à nostrâ parte erit argumen-
tum; quia tum copia scilicet liquidi in vasa se-
cretoria influentis minor suppetit. Est enim
secretio, ut velocitas sanguinis, & vasis secre-
torii orificium; uti demonstravit *Bellini*. A-
deoque ob minorem sanguinis velocitatem,
quam ex *pulsu* cognoscimus, & capillarium
angustias, quæ ex *texturâ* delicatulâ etiam
probari posse videntur, minor erit in foeminis
materiæ perspirabilis secretio.

2. *Temperamentum*, quod *humidius* esse in
foeminis, quàm in viris rectè ^a pronuntiat
Hippocrates. Foeminarum enim corpora, tum
ad tactum tum ad visum, multò molliora & te-
neriora sunt quàm virorum; à quâ partium
mollitie *humidi redundantiam* idem ille Autor
non absurdè deducit ^b: quò enim minùs solidæ
sint partes, eò magis in iis abundat fluidum ^c.
In viris autem, quò solidior evadit corporis

^a Nat. Puer. f. 6. ^b Morb. Mul. I. f. II. ^c De Gland. f. II.

compages, eò minus fluidi relinquitur; solidarum enim partium moles, nisi imminutâ fluidi copiâ, increlcere nequaquam potest. Itaque ratione molis suæ plus habent sanguinis mulieres, quàm viri. Hinc est quòd citiùs ad debitam magnitudinem assurgant; quia liquidi copia, ex quâ solidæ partes conflantur, in iis sit uberior: ita ut minori tempore æquale, vel æquali tempore amplius nutrimentum inde hauriri queat, uti argumentatur *Hippocrates*^a, fusiùsque ostendit *Pitcarnius*. Cùm igitur fœminæ hâc gaudeant temperie, *humiditatem in iis non remitti* bene colligit modò laudatus author; quia rariore sint texturâ^b; patet etiam ex *staticâ Sanctorianâ*, *humida* corpora minùs perspirare, & plenius nutrimentum secretioni insensibili officere. Eodem fundamento nititur *Aphorismus ille*^c, *ab aquæ potatione perspirationem insensilem impediri*. Pariter *aquosas*, (i. e.) per-quam humidas, *mulieres diutiùs purgari* scribit *Hippocrates*^d.

3. *Vita domi acta & labore minùs exercita*; ideoque hinc etiam originem trahere *plethoram* rectè statuit *Galenus*, & optimus naturæ interpres, *Hippocrates*^e. Etenim annotante *Sanctorio*^f, “*Exercitio corpora leviora fiunt*; “ omnes quippe partes, præcipuè muscoli & ligamenta, motu ab excrementis purgantur; “ perspirabile ad exhalationem præparatur, & “ spiritus tenuiores fiunt”: ita quicquid sit humoris superflui, id fortiùs foras exprimitur; op-

^a *Morb. Mul* I. f. II.

^b *De Gland.* f. II.

^c *Mel. Stat.*

f. 3. 67.

^d *Ipid.* 6. 1.

^e *De Gland.* f. II.

^f S. 50.

timè enim notavit *Hippocrates*, labore aliquid humoris abduci^a. Contrà verò quiete nimia gravius fit corpus, & propter inhibitam perspirationem humores intra vasa redundant: igitur rectè docet idem *Sanctorius*, perspirationem, ubi in sanis deficit, exercitio sarciri^b.

Quæret fortasse aliquis, quare foeminas minùs perspirare contendam, cùm in iis plerumque æquè copiosus ac in viris observetur sudor? cui hic hæret scrupulus, discat è *Sanctorio*, quòd perspiratio & sudor ita parum inter se conveniant, ut nihil ferè habeant commune; contrà quòd hic ampliùs provocatur, eò magis illa minuitur^c. Saltem si præcesserit sudor paulò uberior, perspirationem ad horas & fortasse dies aliquot languescere & ratio evincet, & Statice^d.

Ultimo de otiosa vitâ argumento facile erit reponere, plurimas inveniri mulieres, exercitio quidem laboribusque assuetas, non ideo tamen mensibus immunes. Sed meminerit lector desidiam non esse unicam plenitudinis menstruæ causam: utcunque labori se assuescat mulier, humidam suam secum portat temperiem, & vires imbecilles. Quòd si cui & vita athletica, & siccum temperamentum contigerit, dubitari forsan potest, utrùm illi fluxura sint menstrua: pro me certè haud parum facit quod observârunt *præctici*, eas, quibus menses penitus defuisse compertum est, calidissimi^e fuisse temperamenti *Viragines*: quæ cùm ad robur masculinum accedant, & laboribus ut

^a *Morb. Mul.* I. II.

^b S. 5. 34.


^c S. I. 12. 13. 23. 110.

^d S. 5. 3.

^e *Plater. Obs. Med.* p. 247.

plurimum se exercent, alimentum omne facile digerunt, & per poros eliminant^a. Igitur in his *pulsus validiores* observat *Galenus*^b. Ita mensibus *saltatrices* destitui scribit *Sennertus*^c, *Forestus*^d etiam *cantatrices*: quod & experientia satis confirmat. In quibus quidem omnibus *labor* id efficit, ut evacuationes copię ingestę respondeant; adeoque nec ulla desideretur mensium purgatio.

Sed utcunque de causis disceptari queat, de re certum est. Plethorâ igitur demonstratâ, non ita arduum est, quibus viribus, & quâ potissimum de causâ, sanguis per uterina vasa effluat, explicare.



C A P. IV.

De Structurâ Uteri & Vaginæ.

ANtequam verò modum, quo ad ciendos menses utitur *plethora*, exponam, necessarium videtur pauca de *uteri & vaginæ fabricâ* præfari: quod quidem ii qui de *catameniiis* scripserunt, tanquam à re suâ alienum prætermittunt; quamvis nihil ferè est, quod de hoc argumento cogitanti clariorem lucem afferat, quàm muliebris uteri structura, non tantùm animo perspecta, sed ad examen hoc accommodata. De hâc itaque, quantum instituto meo sufficit, breviter dicam.

^a *Hildan. c. 5. Obs. 41.*

^b *Caus. puls. 3. 5.*

^c *Tom. 3.*

^d *L. 28. Obs. 1.*

1. In foëminis *pudendum*, uti & reliquum corpus, respectu *horizontis* situm obtinet *perpendiculararem*, in cæteris animalibus *parallelum*.

2. Interna tam *uteri*, quàm *vaginæ* tunica, in quam inferuntur variè & disseminantur venæ & arteriæ, *adipe* omnino caret & *crassitie*; ita ut vasa, fibris ipsius intertexta, minùs sustinere aut munire queat: quæ quidem in cæteris ferè quibuscunque corporis partibus plurimum suffulciunt muscoli & pinguedo.

3. Vasa sanguinea, tam arteriæ quàm venæ, numero penè infinita ad has partes deferuntur; quorum tamen major copia in uterum diffunditur. Arteriarum rami, uti & venarum, ex utroque latere sibi invicem per *Anastomosin* committuntur, qui non recto cursu ad uterum feruntur, sed variè inter se *implicati* & *contorti*, *curvis* & quasi *serpentinis* ductibus perreptant. Cujus quidem texturæ ratio satis elucet & necessitas; gravidâ enim muliere, & foetu uterum magis indies distendente, comprimerentur omnino, aut dissilirent potiùs vasa sanguinea, nisi his ambagibus circumducta essent: hoc nimirum artificio formata utero sensim crescenti facilè cedunt, & ultimis graviditatis mensibus in directum magis reducuntur.

4. Aortæ truncus descendens multò *amplior* in foëminis, quàm in viris reperitur: eo utique naturæ consilio, ut non modò ad musculos excludendo foetui inservientes, sed ad *uterum* etiam, in quo fovetur & enutritur foetus, major sanguinis copia deferatur. Quæ quidem

dem vasorum multitudo facit, ut non alium quemvis, nisi per *uterum*, sibi exitum quaerant menses.

5. Venis omnibus *uterinis* desunt *valvulae*.



C A P. V.

De modo, quo Menses movet Plethora.

CUM talis sit vasorum conformatio, videamus quomodo, accedente plerhorâ, sanguis per ea expurgetur. Quod ab his propositionibus, quas demonstrant *mathematici*, clarissimè deduci potest.

Prop. I. *Augetur momentum corporis cujuscvis, seu vis ea, quâ corpus è loco suo continuò tendit, augendo vel celeritatem, vel quantitatem materiae, vel utramque.*

2. *Si momentum corporis sit majus, quàm contraria impediementi vis, id impediementum removebitur.*

3. *In percutientibus corporibus, ictuum magnitudo motui deperdito proportionalis est.*

4. *Motus deperditus est, ut resistentia.*

5. *Si corpus datâ vi in impediementum aliquod feratur, ictûs magnitudo crit, ut sinus anguli incidentiae.*

6. *In quovis fluido non tantùm est pressio deorsum, sed etiam à latere & undiquaque.*

7. *Fluidum corpora circumposita premit à latere omni illâ vi, quâ partes ejus conantur à pressione recedere.*

8. *Pressio lateralis est in ratione altitudinis, quâ fluidum incumbens assurgit.*

9. *Directio pressionum superficiei, quæ premitur, est perpendicularis.*

Priores duæ propositiones ostendunt, quare, incremente plethorâ, sanguis è canalibus suis erumpat; reliquæ, quare ex uterinis potissimum feratur.


Per se enim luculenter patet, quomodo eadem manente velocitate, augeatur *momentum* sanguinis in *plethorâ*; quia scilicet augetur *quantitas*: quòd si augeatur etiam *velocitas*, cò fortius erit *momentum*. In *plethorâ* tamen semper crescit, non modò *quantitas* sanguinis, sed & *velocitas*, nisi sanguis nimis lentus fuerit, aut viscidus: si enim ritè admistus & comminutus sit, quò magis mole creverit, eò plures secernit spiritus; quò verò spirituum copia sit uberior, eò crebrior sit, atque validior cordis contractio: ita ut si accesserit *plethora*, necessariò sanguis *velocius* circuletur, adeoque *maiore cum momento* in impedimenta quævis impingat.

Vasa verò sanguinea tanquam *impedimenta* spectanda sunt, ne sanguis extra canales feratur; & hoc sanè efficiunt, quamdiu aut æquis viribus aut maioribus sanguini circulanti reniuntur: cùm verò còusque increbuerit sanguinis momentum, ut ei oppugnando vasa minimè sufficiant, locum faciliè cedunt, ut per ipsorum tunicas sanguis erumpat. Vasa verò *uterina*, quia, uti diximus, *carne parum suffulta* sunt, siqua alia, ad cedendum sunt facillima; ea sanè

sanè reniti non posse ostendit ipsa sanguinis eruptio; qui quidem erumpere minimè posset, si ea contrà æquali momento restitissent.

Quia verò per *Prop. 3. in percutientibus corporibus, ictuum magnitudo motui deperdito proportionalis sit*, videndum est, an singularis aliqua in *uterinis vasis* fiat *motus immutatio*: quæ quidem clariùs elucebit, si ad ea, quæ de *vasorum structurâ* paulò ante diximus, attendamus. Ea nempe non recto, sed *curvo* admodum & quasi serpentino cursu per *uterum* variè funduntur: itaque cùm *motus deperditus sit ut resistentia* per *Prop. 4. si major in iis contingat resistentia, major etiam erit ictus magnitudo*; quam motui deperdito proportionalem agnoscimus. Majorem verò in *vasis* hîc *contortis* dari *resistentiam*, hoc modo demonstratur. Si in *recto* canali decurrat fluidum, datur tantùm *pressio* eaque *lateralis* per *Prop. 7. quâ scilicet latera canalıs distendit fluidum*; quia latera non opponuntur fluido in directum adeoque nec impedimento sunt. Si tamen in *curvo* canali moveatur fluidum, canalıs latera non tantùm *premit*, sed omni, quo pollet, momento in ea *impingit*: quantò verò magis, hoc impeditum obstaculo, de *motu suo deperdat*, tantò fortior erit in idem obstaculum *ictus magnitudo*. Quò verò in *curvum* magis flectantur vasa (i. e.) quò magis directioni fluidi sint opposita, eò major erit *vasorum resistentia*, & proindè *major ictuum magnitudo*: inde etiam uberior accedet fluido vis, quò faciliùs vasa possit perrumpere.

Si enim canalis cylindrici A C (uti in Fig. 1.) *axis* sit fluidi directioni semper *parallelus*, nullus erit particularum fluidi in ipsius latera impetus; adeoque & *ictus* nullus; flui-



dom verò omni illâ vi, quâ premitur, *latera* vasis *perpendiculariter* urgebit. Quòd si *quantitas* fluidi augeatur, pressio etiam & vis, quæ in canalium latera exercetur, augebitur; unde

unde orietur canalium *distensio*, & proinde laxior fibrarum textura, minorque inter se co-hærentia. At si canalis sit *inflexus* paulò, ita ut obliquè feratur sanguis à B ad C, (uti in Fig. 2.) moles sanguinis aucta non modò *latera* ipsius *distendet*, sed in partes *curvatas* cum *impetu* feretur, & fibras jam satis distentas cum *ictu* perfringeret: eoque faciliùs cùm, uti ostendit Borellus, *Vis ictûs omni pressione infinito major sit*. *Ictûs* verò *magnitudo* major erit, quò magis *incurvetur* canalis, idque in *ratione sinûs anguli incidentiæ*. Nam si sanguis (uti in Fig. 3.) à D ad C dirigatur, major erit, *ictûs magnitudo* ad latus C, quàm cùm sanguis (in Fig. 2.) à B ad C decurreret. Adeò quò magis *incurvetur* canalis, eò major erit *ictûs magnitudo*; donec ad *flexionem* (ut in Fig. 4') *perpendiculararem* perventum sit, ubi datur maxima; quia ibi *sinus anguli incidentiæ* sit maximus. Ita satis patet in *curvis* canalibus *ictûs vim* intendi.

Et hæc quidem uberiùs explicare libuit, ut perspicuè innotesceret, non minimum conferre ad menses per *uterum* evacuandos ipsius *uteri structuram*.

Etiam hoc ad cætera accedit, quòd vasa, quò magis *contorta* sint & *circumvoluta*, eò *longiora* multò fiunt: *longitudine* verò efficitur, ut plus sanguinis intra latera sua excipiant; sanguinis adcò *quantitate* auctâ, augetur & *momentum*; unde fit facilior per tunicas eruptio.

Quòd si *uteri fabricam* attentius advertamus, luculentiùs adhuc patebit ratio, quare per
uterina

uterina potissimum vasa exoneretur sanguis menstruus. Cùm enim *pudendi* muliebris *situs*, respectu horizontis, *perpendicularis* sit, idem etiam erit situs *arterialis fistulæ*, quæ à corde ad uterum sanguinem deportat: quia verò in *fluido* per *Prop. 7.* corporis cujuscvis circumpositi fiat pressio, non *deorsum* modò, sed etiam à *latere*; per *Prop. autem 8.* pressio *lateralis* sit in ratione altitudinis, quâ attollitur incumbens fluidum, universa columna sanguinis ab *aortæ descendens* trunco ad uterum protenta *uterina* vasa à *latere*, idque *perpendiculariter* per *Prop. 9.* comprimet & distendet: quòd si *pressio* hæc à *situ* arteriarum *perpendiculari* orta, cum iis quæ de canalium *ambagibus* dicta sunt conferatur, facillimè dispiciet ingenuus lector, quòd ad evacuandos menses præ omnibus vasis longè aptissima sint *uterina*. Quippe, propter *plethoram*, & *pondus* fluidi tum in arteriis tum in venis *perpendiculariter* incumbentis, intumescunt latera vasorum, ita ut fibræ à se invicem magis distrahantur: quò verò rarior sit fibrarum textura, eò faciliùs vi illatæ cedunt. Jam in *plethorâ* augetur sanguinis *momentum*, quia augetur *quantitas*, etiam &, nisi *lentor* adsit, *velocitas*; *impedimenti* vis imminuitur, quia vasis sanguinis *redundantiâ* pridem distentis, minor sit fibrarum contactus & cohærentia; ita superato impedimento, sanguis tandem erumpit.

Hinc etiam non leve exurget argumentum quare in *brutis*, licèt eadem planè in iis sit
(aliter

(aliter ac nonnulli sentiunt ^a) *vasorum conformatio*, non tamen reperiatur *fluxus uterinus*; quoniam, cùm in his *prudendum* respectu horizontis *parallelum* sit, tollitur omnis ista ad *lateralia* vasorum *pressio*, à *perpendiculari* arteriarum *situ* deducta: quæ sanè inter causas haud postrema est, cur mulieres plethoricæ per *uterum* purgentur.

Pro nobis etiam ulteriùs facit *Valvularum* in *venis uterinis* defectus: quod utcumque primâ fronte legenti parum satisfaciat, majoris esse momenti videbitur, si, quid in aliis *venis* præstent *valvulae*, sub examen revocetur. Hæ quidem, cùm flaccidæ sint, nulli prorsus usui essent, si sanguis *continuo* cursu, veluti flumen, per arterias venasque deferretur: siquidem sanguine continuo decurrente, utcumque venis infererentur *valvulae*, fluidum quamvis supra valvulam delatum in partes inferiores æquè graviter incumberet, ac si nulla prorsus intercederet valvula: si enim canalis *plenus* sit, valvula interposita pressionem fluidi non magis tollit, quàm, si vesica aquæ plena alteri itidem plenæ imponatur, membranæ interjectio efficit quò minùs aqua, quæ in vesicâ superiore est, pondere suo inferiorem premat. Sed quoniam sanguis ab arteriis, non *continuo* flumine, sed per *intervalla* quædam, prout cor contrahitur, in venas influit, utile admodum comperitur *valvularum* artificium: cùm enim nullum sanguini regressum concedant, cavent, ne major sanguinis copia *venas capillares* premat, quàm

^a *Charleton, Bayle.*

quæ inter eas *valvulamque* proximam continetur: nimirum ab *inferiore parte* valvulæ pressio tollitur, quia intercapedo illa ob cordis *diastolen*, sive circulationis moram, sanguine minùs distenditur: quòd si in cordis *diastole* sanguis in venis majoribus deorsum retro gurgitaret, *capillares venulæ* ita pondere incumbente laborarent, ut faciliùs disrumpi possent. In *venis* verò *uterinis* propter *valvularum defectum*, nihil prorsus obstat, quò minùs sanguis omnis, qui in ramis amplioribus continetur, retro versus *capillarium* angustias corruat, & tenella orificia ita premat, ut impulsu quovis promptiùs dissiliant. Et hoc quidem modo, in *arteriis situs perpendicularis inflexioque tortuosa*, in *venis valvularum defectus* multùm adjuvat, ut per *uterinas vias* evacuetur *sanguis redundans*.

A quibus verò canalibus potiùs dimanet sanguis menstruus, an ab iis qui ad *uterum*, an ab iis qui ad *vaginam* deferuntur, magna est inter *authores* controversia: quæ fanè non incommodè prætermitti, saltem salvâ utrâque sententiâ componi poterat. Etenim cùm eadem sit partium textura, eadem vasorum conformatio, longè plura tamen ad *uterum* excurrant vasa quàm ad *vaginam*, quid dubii est quin ex utrisque canalibus, uberiùs licèt ex *uterinis*, evacuentur menstrua? Quod quam per se satis pateat, hoc tamen argumento breviter illustrari potest. Ubi in *prægnantibus* erumpunt *menses*, si *abortus* fiat, ab *utero* videntur fluere; quænam enim alia vis *fæ-*

tum à *placentâ* queat divellere, nisi effusi in *utero* sanguinis fluctuatio? Si verò nullus insequatur *abortus*, cos potius à *vaginâ* demitti credimus: quia si in *utero* fiat sanguinis eruptio, periculum est, ne *abortiat* mulier. Igitur aliquando ab *utero*, aliquando à *vaginâ*, læpiùs tamen utrinque fluunt menstrua: ita tamen ut in iis quæ *pepererunt*, propter vias liberius parentes, frequentius, quàm in *virginibus*, ab *utero* emanent.

Alia etiam inter scriptores versatur quæstio, utrum à *venis*, an ab *arteriis* prodeant menses; quos ego sanè ab *arteriis evanescentibus* malim deducere. Ibi enim maxima est canalis angustia, quâ efficitur, ut sanguis in latera vehementius feriat, & ostiola recludat: quòd si in *venas* deductus fuerit, latius sibi spatium videtur comparasse, quàm ut foras egredi cogatur. Ideo siqua in canalibus oriatur obstructio, cam in *arteriis* potius quàm in *venis* poni debere rectè arbitratur, philosophiæ medicæ peritissimus, *Pitcarnius*^a. Quinimo sanguis floridus admodum & rubicundus cum sit, ab *arteriis* potius, quàm à *venis* originem trahere videtur. Sive tamen è *venis* sive ex *arteriis* fluat, ex *capillaribus* certè, non ex *majoribus* ramis propellitur: uti ex fluxu ipso, qui *guttatim* ferè peragitur, dignosci potest.

^a *Dissert. Med.* 106.



C A P. VI.

Argumenta contra Plethoram refelluntur.

HUC quidem principiis simplicibus maximè & indubitatis pervenimus; quæ tamen non magis vera sunt, quàm intellectu facilia. Quanquam verò huic fundamento innixa minimè corruere possit *Theoria*, non tamen negligenda sunt, quæ vulgò contra *plethoram* afferuntur, argumenta: quæ si refelli queant, nostræ sententiæ si non roboris aliquid adjicietur, impedimenta certè detrahentur. His igitur argumentis manifestum esse putat *Charletonus*^a, *meram plenitudinem non sufficere, ut evacuatio per uterum efficiatur.*

I. In *tabidis* & *macilentis*, consueta, & interdum profusa, reperiuntur *menstrua*; quibus tamen sanguinis copia infra mediocritatem consistit. Rem ipsam fanè agnoscimus, in *macilentis* nempe fluere menses; *plethoram* ideò non dari pernegamus; quippe multi, uti observat *Galenus*, sanguine exuberant, *gracillissimi* cum sint; etiam ipso *Charleto*no judice, ita parum in *macilentis* deficit sanguis, ut in iis præcipuè *redundet*. Ipsum igitur audiamus, *Oeconom. Animal. Exerc. 5. S. 3.*

“ Qui maximè nutriuntur, ut *obesuli*, paucosanguine præditi sunt; *macilenti* autem mag-

^a De Catameniis, p. 30.

“ nis venis, plurimoque sanguine donantur.
 “ Quare etiam hi ut plurimum animosi sunt,
 “ & omnia vitæ munera alacrius vividiusque
 “ peragunt, utpote spiritibus proportionaliter
 “ prægnantes. Ac propterea *graciles* liberalio-
 “ rem venæ-sectionem ferunt, quòd carnosâ
 “ & musculosâ eorum pars strigiosior cùm sit,
 “ majorem quoque copiam in poris suis ab-
 “ sorbeat: venæ autem etiam si exhauriantur,
 “ minore tamen istoc damno evenit, modò
 “ quantum lampadi vitæ satis sit supersit. At
 “ verò torosis & præpinguibus damnum à co-
 “ piosâ sanguinis evacuatione contingit; quia
 “ habitus eorum sanguine calidiore depauperâ-
 “ tus, ferosis humoribus repletur facilèque in
 “ cachexiam degenerat. *Ib. Sect. 4.* Notum est
 “ in animalibus *fame* enectis, & hominibus
 “ quoque, qui *tabidi* intereunt, plurimum san-
 “ guinis etiam post obitum in venis reperiri;
 “ quod prorsus impossibile esset, si sanguis
 “ corpori solùm nutriendo destinaretur. Ani-
 “ mal enim fame non periret, quamdiu sangui-
 “ nis quicquam in venis superesset; nec tabi-
 “ dorum corpora adeò emaciarentur, dum ve-
 “ næ sufficientem sanguinis copiam in se con-
 “ tinent, unde partes possint instaurari. Qui-
 “ bus adjici potest historia S. 6. quam ex *Hip-
 “ pocrate* desumit, de viro quodam, qui cùm ad
 “ extremam maciem morbo extenuatus fuisset,
 “ & indices magis magisque tabesceret, sectâ
 “ tandem per vices utriusque manûs venâ, do-
 “ nec exanguis fieret, brevi *ευσταχ* evasit.”
 Unde fit, ut qui, cùm contra sanguinis nutri-
 tionem

tionem differit, in *tabidis & macilentis plethoram* ita strenuè propugnat, idem, cùm *cattameniorum* causam agat, conetur convellere? sed ea *Charletoni* argumenta, quæ jam ex *œconomia animalis* deprompsimus, ita solida sunt & veritati congruentia, ut ne ab ipso quidem *Charleto* everti possint. Hinc *macilentæ*, uti scribit *Galenus*, missionem sanguinis copiosiore ferunt; quâ & sæpissimè in iis, postquam diu defecerint, redintegrantur menstrua. Hujusmodi plurima exempla sunt; & quotidiana ferè observatio est, in *lactantibus gracili* corpore præditis menstrua solenniter ferè celebrari: ita parum *infra mediocritatem* consistit in *macilentis* sanguis.

2. *Ipsa plenitudo nonnunquam impedimento est, quò minùs fluant menses.* Ita quidem scriptorum pars maxima unam *suppressi fluxûs* causam statuunt, *plethoram*: à quâ *suppressionem mensium* similiter induci arbitrantur, ac *Ischuria* nonnunquam oritur à nimia, quâ *vesica* distenditur, urinâ^a.

At si quis hæc accuratiùs perpendat, dissimillima prorsus inter se reperietur harum suppressionum ratio. *Vesica* enim firmâ admodum & musculosâ tunicâ munitur, ita ut si extra modum accumuletur *urina*, *vesicæ latera* nequeat perrumpere; quia non *impetu* aliquo illabitur, ideo neque *momento* aliquo in ea *impingit*. Solâ verò *pressione laterali*, quâ vi fluida omnia pollent, *latera* ita valet *distendere*, ut ea minimè se *contrahere* queant, adeòque neque *urinam*

^a River. Etmuller.

foras protrudere; h. e. tanta est *urinæ* quantitas, ut major sit, quàm quæ à vi *tunicæ musculosæ* moveri possit, adeoque actio muscoli suspenditur. Neque musculus priùs se contrahet, quàm aut *momentum* ipsius intendatur, ita ut *urinæ* ponderi præpolleat, aut ipsa, quæ vim muscoli oppugnat, *Cathetere* eliciatur *urina*. Etiam in hoc casu *Ischuriam* multùm adjuvat vesicæ *sphincter*: qui cùm sit musculus perpetim contractus, nisi quando ab *antagonistâ* & *urinæ* pondere superetur, fortiùs certè contrahetur, si nulla ab *antagonistâ* oriatur *contranitentia*: *Antagonista* verò est *detrusor urinæ*; sive ipsius vesicæ *tunica muscularis*; cujus actionem ab *urinæ copiâ* suspendi jam ostendimus. Aliter omnino se habet in *vasis uterinis plethora*: his enim non tantùm *pressio* eaque *perpendicularis*, sed & *ictus* satis validus à sanguine inducitur; & tantum abest, ut horum canalium latera musculosa sint, ut ne musculis quidem fulciantur; ita ut si permaneat *plethora*, rupturam effugere non possint, uti in præcedentibus demonstratur. Ipsa igitur *plethora*, *per se* spectata, menses nequaquam *supprimet*: potest verò sanguis redundare, licèt non fluant menses. Supponimus itaque in hoc casu nullum esse in *canalibus* vitium (si enim esset, *huic* tribui deberet *suppressio*, non *plethoræ*) adeò ut in sanguine quærenda sit suppressionis causa. Cùm verò *quantitas* sanguinis in culpâ esse nequeat, (ea enim, uti vidimus, fluxum promoveret, non supprimeret) restat, ut *qualitatum* aliqua suppressionem hanc introducat: è quibus nulla

æquè ad hanc rem instructa est, ac *visciditas*. Cum enim sanguis *lentior* sit, & particulæ ejus tenaciter inter se cohæreant, adeoque magnitudine excrescant, per ostiola vasorum *capillarum* minimè traduci potest; in quibus itaque orietur *obstructio*: obstructis porrò his meatibus, per quos facilem egressum sibi comparare assuevit sanguis, intra *majorum* canalium latera conclusus est, quæ nimis robusta sunt, quàm ut ei exitum aperire cogantur. Hoc igitur & nullo alio, quod sciam, modo efficietur menstrui fluxûs *suppressio*, etiamsi adsit *plethora*: ipsa tamen *suppressio* non *plethoræ* propriè, sed sanguinis *lentori* tribuenda est.

3. Si ideò fluèrent Menses, quod sanguis quantitate modum excedat, per alia vasa, pulmonum putà &c. potius quàm per uterina erumperent. Sed huic argumento abunde satisfactum puto, in iis quæ de *uteri* situ, & structurâ differui: unde *uterum*, præ aliis omnibus corporis foeminei visceribus, ad evacuandos menses accommodatum maximè, & quasi natum esse demonstratur. Quòd si *uterina vasa* paulò magis indurescant, & tenaciora fiant, aut intensius crescat *plethora*, sanguis per alios canales iter suum expugnabit; ita ut foeminis, quibus via per *uterum* præcluditur, per *nares* sæpe, aut *pulmones* evacuetur sanguis *plethoricus*; pariter ac in iis, qui *vino* liberiùs indulgent, frequentissimè observatur ex *naribus* quasi critica quædam sanguinis eruptio.

Afferri potest & aliud contra *plethoram* argumentum; nempe si in foeminis accumuletur *plethora*,

plethora, ut ad *fætum nutriendum* magis idoneæ sint, cur eadem in *brutis* deficiat, quæ non minùs foetus suos nutriunt, quàm mulieres? Utcunque res satis obscura sit, hoc certè ex iis quæ cap. 3, & 5 diximus, sine dubio concludi potest, quòd cùm *bruta* mensibus omnino libera sint, eundemque semper, post ætatis florem, corporis statum conservent, in iis quotidianas omnes evacuationes alimentis assumptis respondisse: nisi alia quæpiam in iis sit evacuatio menstrua, uti in *viris* observavit *Santorius*^a. Idem de foeminis, quibus *ante prægnationem* menses non fluunt, dicendum est. Cùm verò utero gerant *bruta*, quia aliquid in *fætus* usum conferunt, non fieri potest, quin *gestationis tempore*, aut nutrimentum solito plenius accipiant, aut minus solito remittant. Itaque in *brutis prægnantibus*, *canibus* præsertim, acrior solito observatur *voracitas*. Hoc enim præcipuè est pro quo contendimus, quòd *menses* in sanis mulieribus à *plethorâ* unicè proveniant: quòd si nonnullis menses defuerint, non ideò tamen defunt suppetiæ, unde satis nutrimenti in foetum impendi possit. Igitur mulieres aliquas sine mensium profluvio *concupere* posse arbitratur *Aristoteles*^b, viz. “ quibus tantum humoris colligitur, quantum iis, quæ purgantur, restare solet post purgationem; quanquam non tanta copia est, ut foras possit profluere.” In hoc quippe singulari admodum casu necesse est, ut mulieri & *ante graviditatem* eadem fuerit evacuationis addi-

^a *Med. Stat.* I. 63.

^b *Hist. Anim.* 7. 2.

tionisque proportio, & jam prægnanti evacuationis solitæ imminutio.

Atque hæc de *plethoræ* naturâ dicta sunt: quâ ritè intellectâ & perpensâ, profluvii uterini causa, quæ multos diu torfit, facillimè deducitur. Ita clarè res omnis vel etiam à tyronibus concipi potest, ita simplici modo & naturali maximè, effectus menstruorum omnes à *plethorâ* fluunt, ut fatis mirari nequeam ad aliam causam confugere posse authores. Quòd si in sequentibus ostendero, quòd *symptomata* omnia, quæ à mensium vitio oriuntur, huic de *plethorâ* doctrinæ optimè respondeant, ab eâque facilè derivari queant; quòdque ipsa demum *medendi methodus* sententiæ nostræ suffragetur, nihil est quod ulteriùs vel à scepticis desiderari possit.

Cùm verò *plethora efficiens* mensium causa statuatur, intelligat lector me semper de mulieribus *sanis*, & rectè se habentibus loqui. Menses enim proveniunt sæpe à *nimiâ vasorum imbecillitate*, ab *humorum acrimoniâ*, &c. Hæc verò cæteraque id genus similia *vitia* sunt, quæ *sano* corpori abesse supponimus.



C A P. VII.

De Periodis.

INter eos, qui menstrui fluxûs causas sibi visi sunt investigasse, nemo ferè est, qui *periodorum* rationem exponere conatur; sed
fatis

fatis habet unusquisque eas aut ad *lunæ motum*, aut ad arcanam quandam *naturæ legem* referre : etiam qui in *fermento* toti sunt, id ipsum ad *periodos* explicandas parum adhibent ; quamvis *ensem Delphicum* nacti fuerint, qui in omnes partes torqueri, ad omnia fluxûs hujusce mysteria æquè accommodari posset. Sed hoc *periodorum* negotium omnes abstrusum quiddam opinantur, commentis certè suis reddiderunt obscurissimum : licèt, si *naturâ duce*, non *hypothesi* aliquâ, ad veri investigationem utamur, nulla facilior aut magis simplex excogitari potest, quàm tota hæc de *periodis* doctrina.

Ea nempe, quæ *capite tertio* de *plethorâ* dicta sunt, adeò certa & perspicua credimus, ut nemini jam dubium sit, *perspirationem in fœminis debitâ minorem esse*. Imminutione igitur perspirationis non suppositâ modò, sed & demonstratâ, videamus quid inde depromi queat ad hoc *periodorum* intervallum luculentiùs explicandum. Cùm deficiat in muliere perspiratio, necesse est aliquid indies intra vasa coaceruari, unde paulatim crescat *plethora*. Quæcunque igitur sit quotidiani alimenti mensura, si singulis diebus accumuletur intus ipsius *pars tricesima*, (quæ perexigua quantitas videbitur, si cum eâ conferatur, quam *unius noctis* spatium, levi de causâ, impediri posse ostendit *Santorius*) intra triginta dies accumulabitur quantitas, victui quotidiano æqualis : adeóque si alimenti mensura sit lib. 2. (quæ tamen usitatâ semper ferè minor est) erit pars ipsius tricesima in sanguine singulis diebus redun-

dans $3 \ 6 \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$; & intra *menſem* ſeu dies tri-
ginta ſanguinis aucti copia erit $3 \ 192$ ſeu lib. 2.
quæ quatuor unciiſ excedit copiam ſanguinis
fluxu *menſtruo* effuſam. Igitur ſatis eſſet ſan-
guinis *plethorici*, ut lib. $1 \frac{2}{3}$, quæ vulgaris eſt *Ca-*
tameniorum menſura, ſingulis menſibus effundi
poſſet, ſi non ultra $3 \ 5 \frac{1}{3}$, quod perpuſillum eſt,
per diem *imminueretur perſpirationo*. Et hoc
quidem modo facillimè concipitur, dierum tri-
ginta ſpatio increſcere poſſe *plethoram*; quæ
quibus viribus ad *vaſa uterina* perrumpenda
ſit inſtructa, in iis, quæ ante diximus, ſatis
explicatur; quibuſtamen, perſpicuitatis gratiâ,
etiam hoc adjici poteſt, unde clariùs fortè elu-
cebit augendi in *plethorico* ſanguine *momenti*
ratio. Quantitas ſanguinis menſe quolibet e-
vacuati cùm ſit $3 \ 20$, totius maſſæ ſanguineæ
(quæ vulgò æſtimatur lib. 19, vel 20.) eſt *pars*
circiter *decima*; hâc igitur ſanguini acceſſione
factâ, ſub fine cujuſque currentis *periodi mo-*
mentum ſanguinis erit *decimâ parte* fortius,
(& hoc quidem ex ſolâ *quantitate* auctâ, ne
de *velocitate* aliquid dicam, quæ, ſi ſanguis
rectè ſe habeat, augetur etiam in *plethorâ*)
ſinguli porro in corpore canales *decimâ parte*
prementur magis, & diſtendentur: ita canales
preſſionem die uno aut altero ante fluxum *un-*
decimâ parte adauctam ſuſtinere poſſunt, (ſan-
guinem enim intra latera ſua coercent) *decimâ*
verò accedente locum cedunt; uti lancibus ad
æquilibrium perductis, ſiquid ultrâ adjicias,
præponderat. Quod tum ex iis, quæ de *cau-*
ſis plethoræ expoſita ſunt, tum è re ipſâ facilè
& evi-

& evidenter innotescit. Menstruis igitur *fluentibus*, vasa omni eo sanguine, qui *plethoram* constituit, deplentur; *cessantibus* verò, ad consuetum corporis pondus redeunt mulieres: unde iterum deficiente perspiratione necesse est ut intra idem tempus *eadem* accumulatur *redundantia*. Quòd si detur vasa sanguinea ab hujusmodi *plethorâ* *semel* disrumpi posse, sequitur omnino, si similis *menſe quolibet* redeat *plethora*, eundem itidem fluxum reverti debere: deficiente verò in foeminis perspiratione, abunde sufficit *intervallum menstruum*, ut *plethora* talis increbescere, & accumulari queat. Ita muliebrem fluxum statis & definitis temporibus redire æquè necessarium est, ac *anni tempestates*, suo quasque ordine, iisdem vicibus *quotannis* reciprocari: nec magis mirum est, profluvium hoc *menstruâ periodo*, revolvi, quàm *annuâ æstatem*. Effectus enim perpetuò idem erit sibi que constans, nisi aliqua causæ acciderit mutatio; hanc verò posse accidere tum in *mensium* tum in *annorum* recursibus, satis arguunt & incerta in hoc fluxu *periodorum* intervalla, & varia *tempestatum* vicissitudo: sed hoc causis, quæ utrinque se admiscent,tribuendum est, adeoque nihil detrahit de effectû *causæ primariæ* necessario, & constanti. Utcunque enim cuique tempestati statæ sint suæ recurrendi vices, multa tamen intercedere possunt & frequenter solent, sive *terræ* aliquo, sive *aëris* vitio, quo minùs aut debitis intervallis redeant, aut iolennem cursum absolvant: par est in *fluxu uterino* perio-

dorum ratio ; quibus licèt spatium menstruum præscripserit natura, eæ tamen ab extraneis causis sæpe turbatæ, tum ultra, tum citra fines suos consistunt.

Nequid verò defit, quo menstrui recursûs ratio meliùs intelligatur, aliarum rerum, quæ statis temporibus *periodos* suas repetunt, *phænomena* consulamus. Ex hâc classe notissima est, licèt parum vel explicata vel intellecta, *Febris intermittens*. Hujus originem à *lentore* sanguinis rectè deducit, *Theoria* ut ita dicam *medicinalis* inventor primus, *Bellini*: de quo qui dubitat, adeat exquisitissimum illius de *febribus* tractatum. Dato itaque sanguinis *lentore*, fluidorum circulantium particulæ aliquæ majores erunt, quàm ut tenuia *capillarium* vasorum ostiola transire queant ; in iis igitur adhærescent hæ particulæ, quæ indies novis suppetiis auctæ, canalium orificia ita sensim obstruent, ut tandem per ea, si modò ullus, difficilis certè pateat sanguini trajectus. Inde est, quòd *extrema frigescent*, quia sanguis ad ea non pervadit. Redundante igitur in *majoribus* ramis fluidi copiâ, cor crebriùs validiùsque contrahitur, & proinde adeo augetur sanguinis *momentum*, ut vasa rupturam effugere non possent, nisi fluidi portio per aliquos meatus foras extrudatur. Ita in *febre intermittente* post *frigus* invadit demum *calor* ; donec, accedente *sudore critico*, *paroxysmi* fiat *solutio* : quia scilicet, materiâ per poros uberrimè evacuatâ, deplentur canales, ita ut sanguis per vascula tenuiora usitato more circulari queat. Eodem verò manente

nente sanguinis *lentore*, eadem rursus fit ad vaporum orificia humoris *viscidi adhaesio*, eademque sensim crescet obstructio; ita priori prorsus similis redibit *paroxysmus*. Quòd si idem in sanguine permaneat *lentor*, quid mirum est morbum ita periodos suas ordinare, ut *eodem die*, etiam & *eâdem horâ* ingruat denuo *paroxysmus*? quidni *secundâ* vice idem redeat typus, ac in *primâ* fuit, cùm causa *paroxysmi* sit eadem? Absurdum esset, si à *lentore*, uti explicatum est, derivetur morbus, *febrem* modò hoc, modò illo intervallo exacerbescere, cùm in *lentore*, qui inducit febrem, nulla prorsus fiat mutatio. Quod si fiat, mutabitur etiam *periodus*, & morbi *typus*.

Eadem omnino est in profluvio menstruo *periodorum* ratio; si enim quantitas materiæ perspirabilis per dies singulos retenta eadem sit, eadem prorsus orietur *plethora*, à quâ ad definitum tempus continuò provocabitur fluxus uterinus. Sin intercefferit aliquid, quo minùs ad consuetum modum perveniat *plethora*, tum etiam morem suum variabit *periodus*, uti in sequentibus dicetur.

Periodicam etiam in *viris* evacuationem observat *Sanctorius*^a, “ Corpora nempe viro-
 “ rum sana, & moderatissimo victu utentia, sin-
 “ gulis mensibus fieri solito ponderosiora, unius
 “ scilicet duarumve librarum pondere; & redire
 “ ad consuetum pondus circa finem mensis, sed
 “ factâ crisi per urinam paulò copiosiore, vel
 “ turbidiore.

^a Med. Stat. t. 63.

Hinc facile patet, quòd in viris quolibet mense hæc, de quâ loquitur *Sanctorius*, *critica* fiat per urinam evacuatio, quia quolibet mense augescit pondus, seu quod idem est, humorum in corpore *plenitudo*; quæ si nulla esset, neque ulla prorsus sequeretur evacuatio: quamdiu verò data quantitas singulis mensibus accumuletur, tamdiu, exacto mense, *periodica* recurret *crisis*.

Ad hunc modum si eâdem vivendi ratione uterentur foeminæ, eandemque accumularent *plethoram*, redirent semper menstruorum *periodi*. Sed quia aliis alia est temperies, ætas, regio, & victûs consuetudo, fieri non potest, quin in diversis foeminis longè diversa sint *periodorum* intervalla. Quòd si quis varietatis hujusce causas exploret, videbit hæc omnia fluxûs reciprocantis tempora, ita inter se discrepantia, à vario *plethoræ* statu unicè pendere. Hoc quoniam à scriptoribus parum animadversum est, in causâ fuisse videtur, quòd apud illos prætermittatur omnis de *periodorum* ratione disquisitio: consilio quidem satis prudenti, cùm neque à *lunâ*, neque à *fermento*, neque ab ipso, quem pro arbitrio regit *Helmontius*, *Archæo*, commodè deduci possit varius ille, qui in *periodorum* recursibus contingit, typus. Quippe, quia in causis istis nulla queat esse diversitas aut inconstantia, erit etiam determinatus atque unicus agendi modus; ita ut, si ab his omnino excitarentur menses, in omnibus æquè, perque eadem intervalla efflorescerent. Sed ea penè infinita est *periodorum*
varietas,

varietas, quæ à nullâ, nisi perquam mutabili, causâ derivari potest; qualis quidem est *plethora*, mille modis mutari facillima; quemadmodum ostendent sequentia.

In *biliosis* enim *temperamentis*, uti diximus, paulò maturiùs fluunt menses, citiùsque periodos suas conficiunt. In hoc nimirum temperamento sanguis non uberior modò, sed fluidior tenuiorque fit; ita quò minùs inter se cohæreant partes sanguinis, cùm citiùs calorem concipiant & faciliùs rarefiant, majus spatium occupabunt, adeoque arterias latiùs distendent. Unde in *bilioso temperamento* observatur *pulsus magnus*, *corpus macilentum*, *ad iracundiam* etiam, & *ad venerem proclivitas*; quæ omnia sanguinis abundantis signa sunt: ita ut temperamentum hoc vulgari nomine rectiùs dicamus *sanguineum* (sic enim temperamenti *causa* exponitur) quàm *biliosum*, cùm major *bilis* secretio à sanguinis *abundantiâ* necessariò, tanquam *effectus*, fluat. Igitur, cum hujusmodi mulier ad *plethoram* citiùs perducta sit, patet, quare ei & ante consuetum tempus fluant menses, & breviori periodo recurrant. In his etiam citiùs terminatur fluxus, quia sanguis, tenuis cùm sit & subtilissimè comminutus, per vasa liberiùs egeritur.

Ita si *regio* paulò *calidior* sit, anno uno aut altero secundum septenarium antevertunt menstrua; ratio eadem est ac in priori casu; calore enim intensiùs rarefcit sanguis. Inde etiam fit, ut iis, quæ propiùs ad *Æquatorem* sita sint, copiosiùs fluant menses. Contrà *frigore* ad
plethoram

plethoram tardiùs affurgit mulier; itaque menses in *regionibus Borealibus* secundum septenarium sæpiùs excedunt; hinc in urbibus ad ventos *frigidos* sitis, virgines *tardiùs* pubescere scribit *Hippocrates*^a. Etiam in *Scythicis* mulieribus notat profluvium uterinum, non modò *rarius*, sed & *parcius* quoque reperiri^b.

Fœminis *gulæ deditis*, & genio liberiùs indulgentibus, fluxus sæpe ad *sextum* diem extenditur: quò enim major alimenti copia suscepta sit, eò amplior erit sanguinis redundantia: quæ cùm sit evacuationis menstruæ causa, necesse est, ut magnitudini *plethoræ* respondeat fluxus. Quibus enim corpus plenum fuerit, his plures prodeunt menses, authore *Hippocrate*^c. Ita quibus major est vasorum amplitudo, uti *macilentis*, & corpus minùs perspirabile, uti *otiosis*, copiosiùs fluunt menses^d. Idem in mollibus mulierculis, in quibus humores abundant, observat *Galenus*^e: cui etiam convenit illa *Hippocratis* sententia, *aquosis* (i. e.) perquam humidis *din* durare menses^f.

Contrà in *obesioribus*, uti notat *Hippocrates*^g, & iis quæ aut *tenui victu*, aut *exercitio multo* utuntur, citiùs terminatur fluxus; in quibus quidem omnibus minor est *plethora*: quæ enim tenui victu utuntur, sanguinem non accumulunt; quæ exercitio multo, per poros dissipant & absument. Hinc *rusticæ* mulieres, quæ laboribus assuescunt, parcius purgantur. In

^a De Aer. 7. ^b De Aer. 48. ^c Morb. Mul. I. 19. ^d Duret. in Holler. 253. ^e Morb. vulg. ^f Epid. 6. 1. ^g Morb. Mul. I. 15.

obesis verò, sanguis non intra vasa coacervatur, sed in habitum corporis diffunditur, uti *capite sexto* probatur: igitur hæ venis angustioribus præditæ sunt, & ad concipiendum ineptiores. Fluxus enim menstruus, quanquam conceptui non prorsus quidem *necessarius*, facit tamen ut *faciliùs concipiant* mulieres: quippe vias uterinas ita aperit, ut liberior fiat semini in sanguinem introitus. Hinc *Scythicas* mulieres ideo *infæcundas* esse dicit *Hippocrates*^a, quia menstruis parciùs purgantur. Deficiente igitur sanguinis quantitate, brevi peragetur fluxus; ita ut apud *Hippocratem* tanquam *obesitatis* signum habeatur, si infra *triduum* consistat purgatio^b. Eâdem de causâ *obesis* menses citiùs multò cessant, scilicet à tricesimo aut tricesimo quinto anno, uti author est *Forestus*^c. Notetur etiam in his menses prorsus *supprimi* sine noxâ; uti & in iis, quæ venam frequenter secant: quod & scriptores annotârunt, & confirmat experientia.

Pari modo in puellis *minùs sanguineis* serius erumpunt, & parciùs fluunt menses, quia tardiùs crescit *plethora*: cujus etiam defectu fit, ut foëminas ex *diuturniore morbo convalescentes* tardè admodum revisant menstrua; sanguis enim, morbo *chronico* exhaustus, pristinum statum non nisi difficillimè recolligit.

Ita in diversis foëminis discrepant *periodi*; quæ tamen in eâdem non minùs variæ sunt, prout ætas & vivendi ratio est diversa. Qua-

^a De Aer. 48. ^b Morb. Mul. I. 15. ^c Lib. 28. Obs. 3. Gal. Cur. Morb. per V. S. Forest. ib.

rum tamen *periodorum* ea est indoles, ut quò minus statæ atque definitæ, eò magis rationi consentaneæ sint, & vario *plethoræ*, unde oriuntur, genio respondeant. Quid enim magis naturale, quàm ut pro varietate ætatis varietur etiam *periodus*, cùm alia in *pubescentibus*, alia in *adultis*, alia demum in *provehentioribus* sit *plethora*? Quippe in *puellis*, menstruo sæpe longius reperitur periodi intervallum; quia, cùm plurimum sanguinis in corporis nutrimentum cedat, in vasis lentius augescit *plethora*. Cùm verò ad debitum incrementum pervenerit mulier, sanguis, nutritionis munere solutus, potest eam singulis mensibus accumulare *plethoram*, quæ uterina vasa facilè perrumpat. Ætate porrò in *senium* vergente, imminuuntur vires, & deficit paulatim sanguis; ita ut tardius sit plenitudinis augmentum, & diuturnior periodi mora: hinc sæpe anno uno aut altero ante septimum septenarium, *bimestris* observatur, aut *trimestris* *periodus*; donec gradatim imminuti menses tandem penitus intercidant. Par est à *vivendi ratione* *periodorum* discrepantia: si *labori multo* & *diætæ tenui* assuescat mulier, vel quâcunque aliâ de causâ humores minùs accumulet, longioribus intervallis celebratur fluxus; eadem si *lantiùs* victitet, aut *plethoram* quovis modo intra vasa coacervet, frequentius purgatur: uti in sequentibus clariùs patebit.

Vidimus magnam in *periodis* diversitatem; quâ tamen ita parum evertitur nostra de *plethorâ* sententia, ut vix firmiori argumento stabiliri

biliri queat. *Urinæ* excretionem tardiùs vel citiùs fieri, prout *potulentorum* copia diversa est, fatentur omnes: etiam in *pratis* non æquè ingentem quotannis diluviem, sed eam, quæ *intumescenti flumini* optimè respondeat, expectabunt: quidni etiam & menstrui fluxûs *periodos* variis *plethoræ* gradibus consentientes expectent?

C A P. VIII.

Phænomena Mensium explicantur.

Vasa uterina, *menstruis instantibus*, plethorico multùm *distendi* sanguine satis nos probavimus, &, qui *foeminas menstruales* secuerunt, testantur *Anatomici*^a: quòd si ab hac plenitudine cætera profluvii hujusce Phænomena optimè deduci possint, nihil est quod ad theoriam hanc illustrandam adjici queat.

Pro nobis igitur faciunt ea, quæ instante fluxu ingruere diximus, symptomata, *æstus scilicet* & *dolor partium vicinarum, ad lumbos præsertim* & *coxas, aliquando etiam inflammatio; Cephalalgia, crurum lassitudo, appetitûs remissio, & languor*: quæ omnia à sanguinis *plethorâ* commodè deduci possunt. In hac enim sæpè diximus *momentum* sanguinis intendi; unde *calor* erit etiam intensior: qui à circulante sanguine ita pender, ut nihil aliud sit, nisi partium sanguinis in se invicem impetus, & attritio.

^a Graaf. Highmor. &c.

Motu verò aucto, uti in *plethorâ* fit, sanguinis major est attritio; quia humorum tum *quantitas*, tum *velocitas* augetur: ita utrâque de causâ increfcet *calor*; qui si nimius fuerit, *febriculam*, quam & frequenter observant *præetici*, & *phlogosin* pariet.

Cùm porrò in *plethorâ* canalium latera ita distendantur, ut minor sit fibrarum inter se co-hærentia, orietur continui solutio, & proinde etiam *dolor*. Hinc menstruis ex *graviditate* suppressis *abesse dolorem* scribit *Hippocrates*^a; quia scilicet in vasis maternis non redundat, sed ad foetum deducitur sanguis plethoricus. *Caput* verò facilè invadit *dolor*, quia *cerebrum* uti est pars omnium mollissima, & vasis etiam sanguineis plurimùm referta, ita fibras habet humorum impulsui minùs renitentes, promptiusque solubiles. Igitur hos in *capite dolores*, circa progressum mensium, *Virginibus* potissimùm adesse notat *Hippocrates*^b. Cum dolore capitis, *vesiculas* etiam pone aures intumuisse, instante fluxu, memorat *Paulinus*^c. Memoratur etiam à *Baglivio* periodicus in ossibus *clavicularum* tumor^d. Partes denique *utero* vicinæ præ aliis magis *dolent*, quia in eâ potissimùm regione, propter vasorum multitudinem, accumulatur *plethora*: & quia *lumbi* & *coxæ* nervos habeant cum iis, qui ad *uterum* excurrunt, communes, eos consentire, & unâ quasi pati non posse, si quis neget, idem etiam nè sentire quidem dicat. Aliquid etiam mu-

^a Nat. Puer. 1. 6.^b Prædict. 2. 39.^c Med.

Septentr. p. 34.

^d Fibr. motr. p. 5.

tuo huic consensui, ligamentorum interventu, accedere potest.

Crurum lassitudo inde venit, quòd vasa uterina, cum sanguine adeò intumescant, originès nervorum, qui ab *osse sacro* ad *crura* deferuntur, comprimant; istiusmodi autem compressio spiritus intercipit, & quendam quasi *stuporem cruribus* inducit: qui ob eandem causam in *gravidis* ferè semper accidit; uti & non rarò in iis, quibus *urina* diu *supprimitur*. Igitur, obstructis mensibùs, *claudicationis* periculum esse scribit *Hippocrates*^a.

Remittitur etiam *appetitus*: quia sanguis ita ultra modum rarefcit, & *ventriculi* arterias dilatât, ut nervi admodum comprimantur: quò fit, ut spiritus in tunicam ventriculi musculosam copiosè satis influere nequeant, adeoque debita inhibeatur contractio. Contractione verò impeditâ, *appetitus*, sive à *laterum attritu*, sive ab *humore ventriculi* proveniat, necessariò languescit: neque enim nisi satis validè contrahatur *ventriculus*, aut latera contactu possunt atteri, aut humor è tunicis educi. Ita sæpè *cardiaca* & *opiata* stomachi aciem retundunt.

Languor verò invadit; quia in *plethorâ*, & nimio pondere laborat corpus, & tenera cerebri vascula itâ turgescunt, ut compressu suo omnes penè in *nervis* aditus præcludant; hinc in membra minor derivatur spirituum copia.

Ita plerumquè se habent, *instante fluxu*, mulieres: idem quoquè in *viris*, quibus menstrua

^a Nat. Puer. l. 7.

illa, de quâ diximus, obtingit evacuatio, observat *Sanctorius*^a; “ ante crisin nempe menstrualem, vel gravitatem capitis, vel corporis lassitudinem perferri, & deinde paulò copiosiori urinâ evacuatâ omnia sedari. Pari modo in foeminis, simulac defluerint *Catamenia*, pristinus reflorescit vigor.

Hæc omnia ferè à *plethorâ* oriri posse symptomata, idonei testes evincent, *Ebrii*.

Huc etiam illud referri potest, quòd in *puellis*, viz. menstrua nondum passis, *mammæ* sæpè ante fluxum *intumescunt* & *sororiant*: etiam in nonnullis foeminis, instante fluxu, *ventrem* ita inflatum fuisse novi, ut planè *Tympaniticæ* viderentur; quod unde deduci queat, nisi à *plethorâ*, non video. Neque id sanè prætereundum est, his, quæ fluxu mensium instante accidunt, symptomatis, præ cæteris obnoxias esse eas, quæ vitam agunt *otiosam*, aut *nunquam pepererunt*; in quibus faciliùs crescit *plethora*.

Pari modo diversitas *quantitatis* emissæ *plethoram* arguit; *ea quippe ad ætatis usq; florem augefcit*: quò enim propiùs ad debitam molem accedat puella, eò minus sanguinis in corporis habitum ad nutriendas partes impenditur, adeoque uberiùs in vasis coacervatur sanguis. *Florente ætate æqualis permanet*, quia nempe, cùm augmenti terminum semel attigerit corpus, in eodem prorsus statu diu viget. *Ætate rursus declinante, paulatim minuitur*; *senectâ* enim obrepente, tum minor indies fit humorum re-

^a *Med. Stat.* I. 66.

dundantia, tum vasorum fibræ rigidæ magis & duræ evadunt: ita ut neque eâ ætate accumulatur *plethora*, neque si accumulatur, propter vasorum *tenacitatem* depleri possit. Igitur *aniculas* sicciore, & sanguine minùs abundantes rectè pronuntiat *Hippocrates*^a. Hoc in loco haud alienum erit *plethoræ* originem paulò altiùs investigare, causasque exponere, quare nec ante *secundum septenarium* incipiat fluxus menstruus, nec *ultra septimum* perduret: cujus rei rationem primus tradidit vir in *Oeconomîâ Animalî* scientissimus, *Cockburnus*^b. Corpore quippe tenello adhuc & pubescente, fibræ ita *flexiles* sunt, ut pori omnes, quemadmodum *Hippocrates* loquitur, facilè pervii sint & perspirabiles; quod satis testatur ea, quæ in *junioribus* reperitur, in *sudorem* proclivitas. Ideo quicquid alimenti suscipitur, vel in partes nutriendas cedit, vel siquid superfluum sit, per poros promptè egeritur; unde nulla eâ ætate accumulatur, quæ menses provocet, *plethora*. Cùm verò augescente corpore fibræ *solidæ* magis & duræ evadant, quod circa *pubertatis* annos semper fit, necesse est, ut pori sive capillarium vasorum orificia multò quam priùs angustiora sint; ita ut, orificiis contractis minor fiat per minima vasa secretio. Secretione igitur ad hunc modum deficiente, in sanguine redundant, qui à nutriendis partibus residui sunt, humores; à quâ humorum *redundantiâ* excitantur menses. Pariter eâdem de causâ, & *pueris pubescentibus* frequenter accidit

^a *Morb. Mul.* 2. 3.

^b *Oecon. Animal.* p. 130.

narium hæmorrhagia. Quoniam verò lente & gradatim fiat hæc *fibrarum durities*, ideo pariter sensim augefcit *plethora*; ita ut cum primò incipiat, valde mediocris sit, deinde cum ætate increfcens augmenti summam paulatim attingat. Cujus quidem rei veritatem abunde confirmat experientia; in *puellis* enim jam pubescentibus copiâ satis *exiguâ* erumpunt menses, qui cum *plethoræ* respondere debeant, eâdem etiam ratione usque ad *ætatis florem* augefcunt.

Menses verò ultra *septimum septenarium* non persistunt, eò quòd uteri vala *robustiora* sint, quàm quæ à sanguinis momento perfringi queant: hoc autem *vasorum robur* inde nascitur, quòd in *senectute* non modò fibræ rigidæ magis & renitentes fiant, sed *capillarium oscula*, ex quibus fluere consuêrunt menses, continuâ tandem *cicatrice* quasi callo ita obducta sunt, (quemadmodum in *hæmorrhoidibus* sæpiùs *incisis* contingit) ut per ea nullus ultra pateat sanguini exitus. *Capillaribus* verò occlusis, *majora* vala, utcunque increbrescat *plethora*, frustra impetuntur. Quòd si ad hanc normam in *provehrioribus* subito restricti essent menses, ingruerent fanè ea, quæ in *suppressione* mensium accidere solent, symptomata. Hoc igitur ut vitari posset incommodum, sapienter instituit natura, ut quemadmodum crescente ætate paulatim augefcunt menses, eâdem declinante lentis etiam gradibus deficient. Ita ferè semper ante annum 49 non modò *copia* sensim *minuitur*, sed *rariùs* recurrunt *periodi*. Va-
fis

si igitur uterinis ad hunc modum renitentibus, supponatur primo tempore intra canales retineri menstruorum partem vicesimam sive $\frac{1}{5}$ i. quæ cum quantitas sit admodum exigua, per alias vias commodè satis evacuari potest; h. e. potest alia evacuatio ita augeri, ut mensium defectum suppleat: præsertim cum nihil frequentius accidat, quàm ut, unâ evacuatione diminutâ, altera tanquam vicaria increseat; quemadmodum ex. gr. *poris* frigore conclusis, succedit frequentissimè *alvi fluor*. Periodo igitur secundâ supponatur effusi sanguinis quantitas non ultra $\frac{1}{3}$ i. 8 assurgere; facile certè concedi potest, ut altera illa evacuatio eâdem etiam ratione augeat. Adeò mensibus sensim deficientibus, alia *secretoria*, assuetudine continuâ, ita se tandem comparabunt, ut *plethoram*, quæ mense quolibet coacervatur, excipere & deplere possint. Igitur *provehentioribus* nullum gravius symptoma accidit, quam defecerint menses. Huic sententiæ multum favet *Sanctorius*, qui in *senectute* augeri perhibet evacuationes *sensibiles*. Id etiam pro nobis facit quod perpetuâ ferè observatione comprobatum est, plerasque scilicet mulieres, simul ac mensibus destitutæ sint, habitum *pleniorum* contrahere, & *pinguescere*. Ita possunt deficere menses, cum parum interim deficiat *humorum copia*; quod si ea etiam defecerit, uti in *senili ætate* plerumque fit, alia erit ratio, cur, citra sanitatis noxam, *septimo septenario* cessent menstrua. Notandum est obiter ab hac variâ fibrarum duritie plurimum pendi-

dere diversam illam mensium, tum *erumpentium*, tum *cessantium*, tempestatem.

In *prægnantibus* penitus deficiunt menses; id verò unde fit, nisi quòd aliò, ad *fætum* scil. remittitur sanguis plethoricus? Interdum quidem in *matre* reperitur uberior ^a sanguinis copia, quàm quæ in *alimentum fætûs* infumi possit, ita ut, *gravida* licèt, non deficiant menses: itaque hæ, quibus etiam si prægnantibus fluunt, *habiliores* plerumque, & humoribus turgentes observantur. *Tertiâ* verò *periodo* elapsâ supprimuntur penitus menstrua; quia fœtu tandem incrementum, ita ut plenius alimentum postulet, minuitur *plethora*. Quòd si ad ultimos menses præstiterint, *fætus* solet esse *valetudinarius* admodum & *imbecillis*: adeò vera est illa *Hippocratis* observatio ^b, *mulieri utero gerenti si purgationes prodeant*, (i.e) *solennes aut immodicæ, impossibile esse, ut fætus sit sanus*: cujus rei rationem alibi exponit, *mensibus nempe fætûs augmentum dimitti* ^c. Ita *gravida* si *lac* ex mammis profluxerit, imbecillum est quod intus gerit, annotante *Celso* ^d, quia scilicet eas sanguinis suppetias hauriunt *mammæ*, unde debuit nutriri *fætus*.

Pari modo *lactantibus* defunt menses; quia ad *mamas* avertitur sanguis exuberans, ut in *lac*, quo alatur *fætus*, abeat: quod & notat *Hippocrates* ^e, & quomodo ad *mamas* potissimum dirigatur, satis *mechanicè* ^f exponit. I-

^a Hild. c. 5. obs. 41. Cummius Med. Sept. 37.

Morb. Mul. I. 44.

^c Morb. Mul. I. 40.

^e Morb. Mul. I. 99.

^f Nat. Puer. 21 & 22.

^b Aph. V. 60.

^d Lib. 2. cap. 7.

gitur in his, quia nulla ad vasa fit *plethora*, sine noxâ retinentur menses, ideo neque, provocari debent. Quòd si etiam *lactanti* fluant, necesse est ut illi post ea, quæ pro lacte fiunt, impendia, sanguis adhuc *redundet*: ideo præcipuè in *nutricibus macilentis*, utpote sanguine plurimùm turgentibus, reperiuntur menstrua.

Adeò omnino à *plethorâ* pendet fluxus menstruus, ut si *vasa uterina* paulò robustiora sint, aut vitio aliquo obstructa, sanguis alium sibi aditum patefaciat: ita frequenter profluvii uterini alia evacuatio est vicaria. Apud authores passim memorantur focminæ, quibus, mensstruis suppressis, sanguis statò tempore per *hæmorrhoidas*^a, per *nares*^b, per *poros cutaneos*^c, etiam per *urinam*^d, & *vomitum*^e rejectus salutis fuit: quod in *aphorismis*, *criseos* signum rectè ponit *Hippocrates*^f. Quòd si vicaria hæc reprimatur evacuatio, gravia insequuntur symptomata: uti frequens experientia satis testatur. Extra dubium est quibuscunque è canalibus prodeat, periodicum hoc à *plethorâ* excitari profluvium (est enim *salutare*) & *menstruorum* nomine insigniri debere; hæc enim non tam evacuationis *locus*, quàm *quantitas* & *tempus* denominat & distinguit: quæ tamen magis amant per *uterum*, uti diximus, expurgari, nisi aliquod in uterinis vasis sit vitium; quod semper accidit, cùm aliæ sanguini aperiantur viæ. Ita in hoc casu natura ipsa per *hæmorrhagiam*,

^a Sennert. Prax. lib. 3. Bonet. Med. Sep. 36.

^b Borrich.

Med. Sep. 37.

^c Dolæus 636.

^d Salmuth. c. 3. Obs. 36.

^e Hachstetter. Dec. 2. Cas. 6.

^f Aph. V. 32 & 33.

quæcunque ea sit, foëminas *plethorâ* laborantes levat: idem fit, si per venæsectionem *arte* fiat depletio, ubi in sano corpore tantum peccat *plethora*. Quin in iis quæ per *uterum* rite purgantur, menses semper imminuit, non raro etiam sistit, missus è brachio sanguis. Eodem modo si plethorica sit mulier, *abortum* præcavet *phlebotomia*. Mira quidem est & ad hanc rem maximè apposita, quam de mulierè quâdam *Platerus*^a narrat, historia; “ cui post
“ ablatum excectumque uterum menses dein-
“ ceps, cum purgationis tempus instaret, per
“ vicinam anum, stato tempore, & colore con-
“ venienti, effluxere. Sanitati restituta diu
“ postea vixit non aliis usa remediis, quàm quòd,
“ cum menstrua per podicem segniùs fluerent,
“ venam juxta malleolum quandoque aperiret. Satis manifestum est in muliere hâc eandem, ac ante uterum excectum, accumulata esse *plethoram*, & menstrua solenniter fluxisse: quæ quomodo, cum paulò segniùs fluerent, à *venæsectione* cieri & promoveri possent, in sequentibus ostendetur. Memorantur apud *Zacutum*^b menstrua per *pollicem* periodicè erumpentia, quæ si fortè parciùs fluerent, accessit *capitis dolor*, & *febris*.

Neque sanè ad cò mira res est menses per *pollicem* excerni, siquidem apud authores non infrequens sit *sanguinis per digitos*^c *evacuati* mentio. Cuidam, ab infantiâ usque ad annum ætatis 24, effluxit, unoquoque *plenilunio*, ex *pollice*^d

^a Observ. Med. lib. 3.

^b Prax. Hist. r. 3.

^c Mercat.

Morb. Mul. 469.

^d Philos. Transf. numero 272.

sanguis primo quidem ad 3 4, deinde post annum 16. ad lb. 15. Quo fluxu temere demum inhibito, in *hæmoptoen* conjectus est. Alteri ex *indice*^a, singulis ferè mensibus, per annos 12. usque ad lib. 4. prorupit sanguis: in quâ quidem historiâ hæc imprimis notatu digna videntur, 1. Quòd si *restricta* fuerit evacuatio, circa brachia exortus est *dolor* acerrimus. 2. Quòd quò *rariùs* rediret periodus, eò *copiosius* effluxit sanguis. 3. Quòd à *potatione* semper *increscebat* fluxus. Quæ omnia cum *mensium phænomenis* optimè consentiunt.

Hoc loco non alienum erit periodicum illud memorare, quod in *viris* etiam interdum reperitur, sanguinis profluvium. Sunt quibus statâ fit per *hæmorrhoidas*^b evacuatio, in aliis *periodica hæmoptoe*^c, in nonnullis etiam *miçtus sanguineus*^d, certis temporibus recurrens, observatur. Hujusmodi enim fluxus, pari modo atque in *fœminis*, à *plethorâ* oritur, & sanitati plurimùm prodest; quòd si in iis supprimatur solennis hæc purgatio, succedit morbus; uti quidam, cujus meminit^e *Salmuthus*, “hibito miçtu sanguinis periodico, in summam pectoris angustiam & compressionem, maximamque spirandi difficultatem incidit, eâque paucos intra dies extinctus est.” Pari modo ac *ulcera & fonticuli*, quibus diu evacuari consueverint humores, si subitò siccantur, periculo rarò vacant.

Illud etiam observatu dignum est, periodicâ

^a *Philos. Transf. num. 171.*

^b *Amat. Lusit. l. 5. 3. Barthol.*

^c *Salmuth. c. 2, 3, et 18.*

^d *Id. c. 3 47.*

^e *ibid.*

evacuatione in hujusmodi *viris* suppressâ, non modò sanitatem extinguere, sed eadem prorsus, ac quæ *fœminis* menstruo levamine destitutis accidere solent, oriri symptomata; ita ut, si suppressio diuturnior sit, evadant planè *hysterici*. In quem etiam morbum faciliè incidunt, qui vitam agunt nimis *otiosam*: à quâ quidem *plethoræ* origo in præcedentibus deducta est.

Quòd si in *viris* hujusmodi crescat *plethora*, quæ fluxum periodicum concitat; si porrò, deficiente fluxu, eadem, quæ in *fœminis* ob menses inhibitos, oriantur symptomata; quidni etiam in *muliere* menses moveat *plethora*, & morbos, qui à suppressis mensibus proveniunt, inducat?



C A P. IX.

De iis quæ aut citiùs cient, aut diutiùs retardant Menses.

EXplicatis igitur fluxûs menstrui phænomenis, erit forsan non inutilis opera rerum earum vires paulùm expendere, quarum interventu aut *maturiùs*, aut *tardiùs* moventur menses: his enim rite intellectis, si quando vitiatum fuerit hoc profluvium, istius mali non modò *causam* meliùs assequemur, sed & *curationem* feliciùs auspicabimur.

Ex iis quæ *maturiùs* cient menses, præcipua sunt,

sunt, febris, coitus, potatio largior, motus violentus, vomitus, sternutatio, iracundia, passio hysterica, solennis evacuatio inhibita, *Plantæ Emmenagogæ* dictæ: quæ omnia aut sanguini *plethoram* introducunt, aut *stimulo* quodam valà irritant.

In *febre* enim, cùm semper augeatur sanguinis *velocitas*, immò frequenter & *copia*, etiam intensius erit, quo canalium latera feriat & distendat, *momentum*: ita in hunc motum excitatus sanguis, tenera uteri vascula, modo à nobis antea exposito, facilè perrumpet. Quæ etiam cùm ætate longâ induruerint, sanguini *febriliter* æstuanti non semper resistunt; uti in muliere quâdam, cujus meminit *Bohnius*^a, evenit, quæ, ingruente *febre*, octogenaria mensibus purgata est.

Eodem modo in *variolis* haud rarò provocatur sæpius fluxus menstruus, nempe à *febre*; qui cùm proximo ante *crisin* die invadere solet, uti observant *practici*, peccantis fortè materiæ aliquid abducit, & morbum judicat. Igitur menses, si *variolis* supervenerint, rarò cohibuit, sed suo more uti permisit, practicus idem & scriptor integerrimus, *Sydenhamus*^b. Hinc *febres acutas* mensuis erumpentibus solvi docet *Hippocrates*^c. Pari modo in sceminâ plethoricâ *febrem synochum* mensibus ad septem dies fluentibus terminari scribit *Forestus*^d. Quòd si hujusmodi fluxus *criticus* turbetur, gravissima sæpè insequuntur *pectoris* aut *capi-*

^a *Circ. Anat.* p. 243.

^b *Morb. Acut. Hist.* 289.

^c *Coac.*

Præn. f. 226.

^d *Lib. 1. Obs.* 20.

tis mala; uti in tribus puellis observat Borrichius ^a.

A *coitu*, præter motum illum, quo uterina vasa cæteræque corporis partes turgent atque incalescunt, admissio femine intensius rarefcit sanguis, & velocius per canales circulatur, ita ut impedimenta quævis facilius perfringat. Igitur apud *Hippocratem*, sanguinem attenuare & calefacere perhibetur *coitus* ^b, & mensibus faciliorem exitum præsternere ^c. Hunc à virili femine sanguinis motum cieri satis ostendunt ea, quæ foeminis sub *conceptionis* tempus ingruunt, symptomata. Inde est, quòd ultimum suppressionis menstruæ remedium vulgò habeatur *coitus*: quem ideò foeminis passim commendat *Hippocrates*. Qui tamen si *immodicus* fuerit, *immodicum* etiam fluxum excitabit: uti experiuntur *prægnantes*, quæ eâ sæpe de causâ abortiunt.

A *potu largiori* quomodo sanguini inferatur *plethora*, & proinde rapidior circuitus, ex re ipsâ satis apparet.

Motu violento non tantum sanguinis calor increfcit, sed particulæ etiam magis fluidæ, & tenues fiunt. Contractio enim musculorum, quæ in *motu violento* fit, non modò serosiores sanguinis partem per poros abducit, sed id, quod intra canales circulatur, comprimendo attenuat & comminuit; ita ut auctâ velocitate fortius increbrescat fluidi *momentum*, & major vasorum *distensio*: unde facilior sanguini aperiatur

^a Aët. Hæsn. vol. 2. 195.
lib. 1. f. 7.

^b Diat. 2. 36.

^c Geni-

exitus. Ita *saltantibus* improvisò sæpe erumpunt menses.

Ad *motum violentum* referri possunt *vomitibus*, & *sternutatio*^a: in quibus quidem non modò validissimè movetur ventriculus & diaphragma, sed vicinùs etiam *uterus* ità agitur & concutitur, ut vasa, collisu hoc disrupta, sanguini locum cedant. Idem efficit corporis in *passione hysterica convulsio*; quod in virgine quâdam observat *Platerus*^b.

Affectus animi quomodo *sanguini* novos motus introducant, fortasse arduum est explicare; quòd verò introducant, certissimum. In *iracundiâ* præsertim validius contrahitur cor, increbrescit pulsus, scintillant oculi, inardescunt genæ; quæ omnia sanguinem *motu concitatio*re ferri arguunt, adeoque majore impetu in canaliculorum latera impingere: qui si violentius impingat, facilè dissiliunt vasa uterina.

Ab *evacuatione solenni inhibita* provocantur menses, quia major in sanguine accumulatur *plethora*; uti contrà, si præcesserit evacuatio nimia supprimuntur, quia tum deficit *plethora*.

Plantæ Emmenagogæ, cum *sale volatili* ut plurimum refertæ sint, sanguinis particulas incidunt atque attenuant, & in motum vividiorè exfuscitant. De harum viribus, & operandi modo in sequentibus dicetur; sufficiat hoc in loco id solùm annotare, nulla dari *Emmenagoga*, quæ non aliquo modo *momentum* sanguinis intendant: aucto verò sanguinis momento, erumpunt menses.

^a *Hildan. c. 3. obs. 58.*

^b *Obs. Med. p. 191.*

Huc etiam referatur *viçtus acris, tenuis, & copiosus*: cujus exempla passim in *Authoribus* legenda.

Alia sunt, quæ menses *maturiùs* cient; sed ea omnia ad has, quas jam percurrimus, classes reduci possunt: aut enim *vim* aliquam vasis imprimunt aut sanguini inducunt *plethoram*, uti & faciunt ea, quæ jam explicuimus: quòd si hoc modo semper agant, & hujusmodi effectus producant, verisimile est eadem esse in movendis mensibus etiam *naturæ* instrumenta.

Si quis dicat in *Febre, motu violento &c.* sanguinem *rarefcere* tantùm, & cursu velociore circumagi, *plethorâ* verò minimè laborare, meminerit ab hâc ipsâ *variore* sanguinis texturâ, respectu *vasorum*, veram exsurgere *plethoram*. Si enim sanguinis particulæ, sive comminutæ, sive quocunque modo divisæ, majus spatium occupent latera canalium æquè distendent, ac si aucta esset humorum *copia*. Ita sanguine rarefacto, erit quæ *ad vasa* dicitur *plethora*. Id etiam reponi potest, plerasque *Febres*, non secus ac menses, à *plethorâ* ortum ducere.

Contrà, ea quibus menses retardantur, sunt *Frigus immodicum, mæstitia, repentina exanimatio, evacuatio nimia, viçtus incrassans, humorum cruditas, pharmaca astringentia*: & hæc quidem omnia aut sanguinis *lentorem* augment, aut *momentum* imminuunt.

Uti enim *calore* rarefcit sanguis & relaxantur fibræ; ita *frigore* nimio constringuntur arctiùs vasa, & rigescunt. In muliebri igitur *plethorâ*, cùm fluidi quantitas redundet, vasa
frigoris

frigore constricta exitum negant; nec tamen ita sunt capacia, ut per ea liberè satis moveatur sanguis: unde necesse est, ut aliqua sanguinis pars tandem in minimis canalibus stagnet; *stagnando* autem paulatim imminuetur motus sanguinis, & orietur *visciditas*. Ita utroque nomine menstrua retardat frigus, quia tum *vasa* constringit & roborat, tum ipsi *sanguini* lentorem tarditatemque inducit: hinc minor vis fluidi ad latera rumpenda. Igitur *aëri frigido* paucitatem suppressionemque mentium tribuit *Hippocrates*, quam & in *Septentrionalibus* esse popularem refert^a. Quòd si *frigus*, *illaso utero*, cæteras corporis partes repentè corripit, fluxum si jam adsit, promovet: impeditâ enim perspiratione, major suppetit humorum copia per *uterum*, *frigore intactum*, evacuanda. Ita sæpe sub fine profluvii, foeminis, quæ *subuculas* paulò *humidiores* induunt, uberius prorumpit sanguis. In his quippe protinus recrudescent menses, etiamsi cessâsse videantur.

Cum *mæstitiâ* semper conjungitur motus sanguinis *tardior*: igitur si *timor* & *tristitia* diutiùs perseverant, *melancholiam* adesse pronuntiat *Hippocrates*^b: in *melancholicis* porrò observatur *pulsus rarus*, & *facies pallida*, ob impetum scilicet sanguinis minorem. Ex motu enim imminuto fit, ut tardiùs ad *cerebrum* perveniat sanguis, à cerebro item ut segniùs in *cor* deriventur spiritus: momento igitur languente, vasa non ita facilè perrumpet sanguis.

^a De Aëre 48.

^b Aph. 6. 23.

Par est ratio *exanimationis repentinæ*: in eâ enim dissipantur prorsus spiritus, ita ut cor viribus destitutum laboret admodum, & sanguinem vix queat protrudere: unde tardior sanguinis cursus, & debilius momentum. Ita narium *hæmorrhagia* subito terrore sæpe restringitur.

Menses, si præcesserit *evacuatio nimia*, sisti, aut saltem retardari debere, satis manifestum est: deficit enim, qui fluxum provocet, sanguis. Ita post *partum* multæ *duas* vel *tres* periodos intermittunt; quia nempe *lochiorum* fluxu penè exhausti sint humores. Pariter à *diuturniore morbo* imminuuntur menstrua, quia aut non suppetit sanguis, aut in partium nutritionem impenditur. *Balnea & æstuaria* sudorem nimium promovendo, *plethoram* ideo & menses imminuunt, & tardant. Idem de *ulceribus, & fonticulis* diuturnis annotandum est. Novi etiam mulierem, cui ex *Theæ* potu urina nimia profluxerat, mensibus vice proximâ immunem: alia à *venâ* liberiùs *sectâ* ad spatium *trimestre* non purgata est. Etiam inter *salivandum* foeminæ defecisse menstrua comperum habeo: in quâ quidem hoc singulare & notatu dignum evenit, quòd die proximo ante *salivæ* fluxum ab *utero* eruperunt menses, proruente verò à glandulis *salivâ* intercepti sunt. Ita, itinere per inferiora præcluso, statim per *nares* effluxit sanguis, & eâ quidem copiâ, ac ab *utero* remitti consueverat: deinde, *bimestris salivationis* decursu, intra vasa quietus substitit. Pari modo se habent mulieres, si aliò

tradu

traducitur humorum copia; igitur in *hydrope* menses sisti monet *Hippocrates*^a; paucioresque fieri & tandem deficere, si in *utero* crescat *aqua intercus*^b.

Mensibus etiam officiunt *viētus incrassans*, & *humorum cruditas*: quia, cū chylus viscidior sit, sanguis ferè semper in *capillaribus* stagnat, difficiliùs certè & parciùs à sanguine separantur spiritus; unde imbecillior circulatio, & vis minor. Ita in iis sæpe supprimuntur menses, quæ *lactis* usui nimium indulgent; aut *cretacea* comedunt, uti pravissimum est *virginei morbi* ingenium. Idem efficit *vita otiosa*, & nimia *frigida potatio*; unde ab *aquis crudis* & *frigidis* menses vitari admodum & imminui, uti etiam & *lac*, testatur *Hippocrates*^c. A quibus etiam imprudenter potis non tantum *mensium suppressionem*, sed & *mortem* aliquando sequi narrat *Forestus*^d.

Pharmaca denique *Astringentia* in causâ sunt, cur tardiùs fluant menses, quia & uterina vasa corroborant, & sanguinem magis viscidum & cohærentem efficiunt: ortæ ab his suppressionis menstruæ historiam satis notabilem refert *Actuarius*^e. Quomodo verò ab *astringentibus* hujusmodi oriatur effectus, dicitur postea, cū de menstrui fluxûs vitiis, eorumque remediis, tractaturi sumus doctrinam.

Hoc etiam de iis, quæ menses aut *maturiùs* aut *tardiùs* cient, annotari debet, quòd si paulò diutiùs aut violentiùs increbuerit eorum

^a *Morb. Mul.* 1. 2.

^b *Morb. Mul.* 1. 85.

^c *De Aq.*

^d *Lib.* 28. ob. 3.

^e *De Prævid. Urin.* 2. 12.

usus, *causæ* fiunt, quas authores vocant, *evidentes* purgationis menstruæ tum *penitus suppressæ*, tum *immodicè profluentis*.



C A P. X.

De Symptomatis quæ à suppressis Mensibus oriuntur.

CUM non minùs atrocia quàm contraria mensium occurrant vitia, *fluxus* nempe *immodicus*, *nimiaq; retentio*, cùm porrò ab horum alterutro ferè semper derivetur omnis illa muliebrium morborum *Ilias*, (eos enim enasci, cùm aut *plura* aut *pauciora* sint menstrua, docet *Hippocrates*^a) non abs re erit rationem exponere, quâ fit, ut à *mensibus vitiatis* tot tantaque oriantur symptomata. Quia verò longè frequentissimum est malum, & inter *virgines* penè *epidemicum*, *mensium imminutio*, ab eâ disquisitionem ordiamur: siquidem nullus ferè in *puellis* reperitur morbus, qui non hanc aut comitem, aut causam agnoscat.

Imminutionis varii sunt gradus; aut enim *parciùs*, aut *tardiùs*, aut etiam *difficiliùs*, aut, quod frequenter fit, non omnino fluunt menses: *suppressos* verò atrocissima omnium sequuntur symptomata: quos quæ provocare denuo possunt *pharmaca*, eadem etiam quocunque modo imminutis profunt: ita ut si *suppressio* mensium

^a Aph. 5. 57.

pleniùs explicetur, cæteræ *imminutionis* species facillimè & intelligi, & curari queant.

Obstructis igitur mensibus, non tam certa aliqua & *diagnostica*, uti cæteris affectibus, superveniunt symptomata, quàm universi ferè, quibus humanum corpus laborat, morbi. Et primò quidem, *suppressione* adhuc *recente*, ingravescunt præcipuè ea, quæ *instante fluxu* sæpius ingruere diximus, symptomata, *dolor & æstus partium vicinarum, cephalalgia, appetitûs remissio, & languor*: quæ quomodo *plethoræ* respondeant, suprà ostensum est. Hæc deinde longum malorum agmen subsequitur, *uteri inflammatio*, aliquando etiam *gangræna, articularum pulsatio, dorsi & articulorum dolor, frigoris calorisque vicissitudo, venarum varices, tumores in cruribus præsertim, & pedibus, & hypochondriis; totius corporis gravitas & imbecillitas, tormina inflationesque ventris colicæ haud absimiles, flatus etiam & murmura, vomitus, ad præcordia anxietas, tussis, dyspnœa, asthma, tabes, cordis palpitatio, & syncope; in capite dolor acerrimus, ad sinciput præsertim & occiput, oculorum gravitas, vertigo, nonnunquam apoplexia & insania, pallor, fluor albus, passiones hystericæ, globus præsertim quasi in gutture sursum reptans, urina aliquando stillans, aliquando suppressa, alvus dura, sanguinis per aliena loca eruptio. Hæc ferè à suppressione menstruâ oriuntur symptomata, in aliis alia: quæ tamen omnia non inconcinnè à *plethorâ* deduci possunt.*

Cùm verò horum alia à solâ sanguinis quan-

titate auctâ, alia rursus à *qualitate* etiam vitiatâ oriantur, videndum est quales potissimum affectus inferat aucta quantitas, sive *plethora*. Quoniam autem *plethora per se* spectata menses, uti *capite sexto* ostensum est, nequeat suppressere, sequitur, ut in *vasis* quærenda sit suppressionis causa: omnis quippe suppressio, *morbosa* saltem, vel à *vasorum*, vel à *sanguinis* vitio derivatur. *Vasis* igitur *uterinis* ita constrictis, ut nullus sanguini pateat egressus, propter eam quam explicuimus humorum *redundantiam*, *momentum* sanguinis intenditur, quia nempe non augetur modò *quantitas*, sed & *velocitas*; quæ semper, nisi adsit *lentor*, est in *ratione copiae*. Quò enim uberior sit sanguinis *quantitas*, eò major erit spirituum secretio: ab his verò cùm pendeat cordis ad sanguinem circulandum vis, validior frequentiorque fiet contractio; unde *velocior* etiam per vasa sanguinis circuitus. Cùm itaque tum *moles*, tum *momentum* sanguinis increseat, orietur etiam *calor* humorum intensior, & canalium validior *distensio*, & proinde quicquid à *nimiâ distensione* proficiscitur: cuiusmodi sunt ea, quæ *instante fluxu* sæpius ingruere solent symptomata; quibus adjici possunt *vasorum tumor*, & *pulsatio*: & hæc quidem præ cæteris patiuntur eæ, quibus suppressionis causa fuerit *vasorum tenacitas*. Ideo signum *diagnosticon* habetur à *vasorum* vitio suppressionem provenisse, si adsit *dolor* circa *uterum* *tensivus*, *venarum tumor*, *faciei color floridus*: quod etiam certius erit, si *fortius* increbrescat *pulsus*. Erit enim in *plethora*,

thorâ, quæ *qualitatem* sanguinis nondum vitiat, *pulsus validus, plenus, creber*: *validus* quidem, quia cùm uberior sit sanguinis copia, largior etiam erit spirituum secretio: ita cor spiritibus magis instructum, fortiusq; se contrahens, majori impetu sanguinem in arterias protrudet; qui ideo vehementi ictu in arteriarum latera impinget, & *pulsus validiorem* excitabit. Cùm porò in *plethorâ* amplior sanguinis moles in canalibus continetur, amplius etiam spatium occupabit, & arteriarum tunicas magis extrorsum trudet, sive *pulsus* ad digitum sentietur *plenior*. *Crebriorem* etiam *pulsus* inferet *plethora*, quia tum copiosius in cordis *ventriculos* influit sanguis, ita ut cor stimulo quodam in contractionem citius suscitetur; tum uberiùs etiam in fibras cordis musculares derivantur spiritus; ita ut cor motum suum exercere possit frequentius. Unde in arteriis *pulsus crebrior*.

Ad hunc modum tum *ictu* tum *tempore* incitator fiet *pulsus*, donec ad augmenti *summam* pervenerit *plethora*: est enim certus quidam plenitudinis gradus, ultra quem, illæ sâ *qualitate* sanguinis, augeri nequeat *quantitas*. Hoc à plenitudine periculum optimè intellexit Hippocrates: *Athletas* enim, quorum habitus ad *summum* bonæ valetudinis *gradum* pervenit, in eo diu manere & consistere non posse asserit; quippe si quid ulteriùs adjicitur, periculo non vacat^a. Itaque hanc *bonam habitudinem* citò *solvendam* esse monet. *Plethora* enim diu nequit incrementum, quin comitem sibi adsciscat san-

^a Aph. I. 3.

guinis *lentorem*. Quippe cùm, instante fluxu menstruo, ea, quam priùs exposuimus, sit vasorum *distensio*, quia scilicet *quantitas*, & proinde etiam *momentum* sanguinis *decimâ* ferè parte augetur; si menses ad *duas periodos* substituerint, moles sanguinea *quintâ* ferè parte solito uberior erit, nisi aliæ evacuationes auctæ fuerint; adeoque eâdem ratione increfcet ea, quâ latera vasorum à fluido circulante urgentur, *pressio*: quam à *vasis* citra virium noxam sustineri posse nemo credet, qui, quàm graviter ea sub *primæ periodi* incursum laborent, meminerit. Et hic quidem à *plethorâ lentor* tribus modis deducitur. 1. Enim ab ipsâ *copiâ* oriri potest, quæ ita supra modum intra vasa turgescit, ut ea, utcunque distenta, satis amplum sanguini circulando spatium præbere nequeant, nisi penitus diffiliant fibræ; ita ut, cùm uberior sit, quàm pro vasorum capacitate, fluidi moles, majorem patiaturs renitentiam sanguis redundans. Quò fit ut particulæ ipsius, tum à canalium tunicis, tum à præcedenti liquido, cui continuo affricantur, quasi retropulsæ & retardatæ, in angustius spatium coeant, seu *tenaciùs* inter se coalescant: quæ etiam, quia mole nimium excrescunt, in *capillaribus* sensim stagnabunt; unde iterum circuitu per hæc minima vasa aliquatenus impedito, major erit in cæteris canalibus globulorum inter se invicem renitentia, & proinde strictior cohærentia, sive *lentor*. 2. *Lentorem* inducet *motus cordis* in *plethorâ* tandem *imminutus*. Cùm enim ultra determinatum quendam gradum intumescant

tumescant vasa sanguinea, nervos circumpositos non in cerebro modò, sed & in ipso corde, ita fortiter constringent, ut parcius fluat in fibras cordis spirituum copia, unde *motus cordis debilior*. Itaque sanguis, quò minore cum impetu protruditur, eò faciliùs à quâcunque re-nitentiâ retardatur, adeoque promptiùs ad *lentorem* perducitur. 3. Sanguinis etiam *lentorem* promovet *partium tenuiorum absumptio*. Cùm enim vasa distendat admodum sanguis plethoricus, ea contrà reciprocata quâdam actione in sanguinem nituntur; ita ut ipsius particulæ à tunicis vasorum reperiussæ à pressione recedere conentur: quò fit, ut tum per vasorum *poros*, tum per ductus *secretorios* exprimatur quicquid fuerit sanguinis *tenue & aquosum*: ita particulis fluidioribus continuò extrusis, necesse est, ut sanguinis reliqui *compages* sit *arctior* multò, & *constrictior*. Igitur si non omnino prodeant menses, eos præ morbo aut *crassos*, aut *viscosos*, aut *glutinosos* fieri docet *Hippocrates*^a. Adeò ut, licet hæc quæ sequuntur symptomata à *plethorâ* proficisci queant, magnâ tamen ex parte *plethoræ cum lentore conjunctæ* ortum debent accedente saltem *lentore* in deterius eunt: qui tamen *lentor* cùm à *plethorâ* proveniat, minimè obstat, quò minùs symptomatum, quæ *suppressis à vasorum vitio* mensibus superveniunt, causa agnoscatur *plethora*. Atque hoc animo tenebit lector, ut eadem sæpius iterandi tædio parcatur.

^a *Morb. Mal.* I. 10.

Cùm autem *plethoræ* accesserit *lentos*, evanescit illa, quæ suppressioni à *vasis* ortæ propria est, *pulsus vehementia*: quippe ita vim pristinam remittit *pulsus*, ut jam tandem *imbecillis*, *rarus*, atque *inaequalis* fiat. *Lentore* enim inducto, propter compagem sanguinis strictiorem parciore fit spirituum secretio: spiritibus verò minùs copiosè influentibus, & corde adeò debiliùs contracto, *imbecillior* erit sanguinis in arterias projectio. Unde etiam *pulsus imbecillis*. Ad hoc illud etiam accedit, *pondus* nempe sanguinis in *plethorâ* auctum: ita, cùm major moles movenda sit, impetu debiliore sanguinem extrudet cor. Increfcet adhuc *pulsus imbecillitas*, eò quòd, cùm major sit sanguinis viscosi quantitas, major erit particularum inter se nifus & affrictus, earumque difficilior à se invicem divulsio: unde minor sanguinis, propter majorem resistantiam, *velocitas*, & *pulsus* proinde *imbecillior*. *Velocitate* porrò *imminutâ*, ad nervorum origines *tardiùs* deducitur, qui in spiritus abire debet, sanguis: itaque ii, qui jam in nervis hospitantur, spiritus minùs protrufi, fegniùs in cordis fibras influunt; unde longioribus intervallis iteratur cordis contractio, & *ravior* fit *pulsus*. Etiam *inaequalis* erit *pulsus*, tum *ictus* tum *intervalli* respectu; quia, cùm novus continuò ferè in sanguinem *lentescentem* traducatur *chylus*, fieri nequit, ut æqualis sit sanguinis totius temperatio, eademque particularum omnium cohærentia: molis igitur sanguineæ cùm pars alia sit tenuior, alia rursus vilcidior, pro varietate

texturæ,

texturæ, quâ gaudet sanguis ad nervorum oscula allabens, varia erit spirituum secretorum copia, à sanguine scil. laxiore major, à constrictiore minor: ita spiritibus *inequaliter* ad cor derivatis, *inequalis* etiam erit cordis *contractio*, non quoad *tempus* modò, sed & *impetum*. Itidem *pulsus inaequalem* efficiet sanguinis, qui in cordis ventriculos influit, *crasis inaequalis*: *lentum* enim sanguinem, utpote compactum magis & renitentem, tardius & debiliùs projicit cordis *systole*; *tenuem* verò, minore resistantiâ præditum, eadem vis citiùs & validiùs extrudit.

Eodem modo se habet *pulsus*, si suppressionis origo ab alterâ quam attulimus causâ provenierit, *sanguinis* scilicet *qualitate* vitiatâ; ea enim, quanquam variis modis inquinari potest, nullis tamen ita vitiosa fiet, ut menses valeat restringere, nisi simul adsit *lentor*. Igitur in hoc casu, tanquam *unicum* sanguinis vitium, habendus est *lentor*: à quo *suppressionem* inferri posse superiora satis evincunt. Ita quemadmodum *plethora* sanguini tandem *lentorem* inducit, sic etiam *lentor plethora* parit: obstructis quippe crasso sanguine arteriis *capillaribus*, intra reliqua vasa coacervatur ea, quæ singulis mensibus effundi debuit, sanguinis portio. Ita quâcunque de causâ supprimantur menses, exurget tandem *plethora*, quæ quomodo inferat ea, quæ à suppressis mensibus sequi solent, symptomata, paulò jam distinctiùs explicandum est.

Redundante igitur in *uteri vasis* sanguinis copiâ,

copiâ, cùm aliqua ejus pars firmiùs hæreat, & abripi per tenuia capillaria non possit; *arteriolæ*, in quibus hæc inchoatur obstructio, magis magisque sensim extrorsum trudentur ab eo, qui continuò allabitur, sanguine: qui, succedente ob partium nisum calore, calorem pariter concipiet, & *inflammationem* pariet: quæ frequentius fit, quando in *ipso fluxu* subitò restricti sunt menses. Perdurante *inflammatione*, si partes solidæ ab humoribus corrosæ & laceratæ fuerint, insequitur *Ulcus*: nonnunquam etiam, si accesserit corruptio, *gangræna*: exempla suppeditabit *Hildanus*^a.

Arteriæ vehementiùs *pulsant*, quia suppressis mensibus ita redundat sanguis, ut tum ob *copiam* quidem canalium tunicas latiùs *distendat*, tum verò ob auctum *momentum* feriat validiùs. Igitur hæc *arteriarum pulsatio* in iis præcipuè observatur, quibus, *vâsorum vitio*, recenter suppressi sunt menses. Cùm enim semel *lentorem* contraxerit sanguis, ita ut minùs velociter circuletur, cessat ea in *arteriis pulsatio*, ob momentum sanguinis debilius, quam minimè interim deficiat *plenitudo*. *Lentescente* quippe sanguine, parciùs separantur spiritus; unde corde motum suum admodum debiliter peragente, fluidum impetu languidior in arteriarum tunicas defertur: ideo ea sensim labascit *pulsatio*.

Spina dorsî frequenter *dolet*, quoniam *medulla spinalis*, uti est sensu acutissimo prædita,

^a Cent. 2. obs. 62, 63, 64.

ita *pressione* eâ, quæ ab arteriis distentis oritur, facilè affici solet. Ideo *Variolarum* imminetium signum *diagnosticon* habetur *Spinæ dolor*: quem quidem in *variolis* non secus ac in suppressis mensibus, excitat nimia vasorum *plenitudo*. Orietur etiam inveterascente morbo ad *Articulos dolor*, propter exquisitum *Periostei* sensum: quo fit, ut, cùm sanguis *copiâ & lentore* simul peccans, vasa, quæ *Periosteo* intercedente ossibus inferuntur, supra modum distendat, tenuis illa membrana multùm distrahatur, quæ tamen ad *Articulos* potissimùm distrahetur, quia circa *ossium extremitates* vasorum longè uberior copia *Periosteum* pertransit.

Frigoris calorisque vicissitudo ex iis, quæ de *Febre intermittente*, capite octavo, diximus, satis commodè deduci potest: hæc enim *vicissitudo* nihil aliud est, quàm *Febricula*, gradu licèt multò remissiore, *intermittens*. Hinc suppressis mensibus *Quartanam* accessisse narrat *Forestus*^a. Atque hæc quidem *frigoris calorisque* per vices accessio haud futile signum est, quòd sanguis in iis, quibus supprimuntur menses, jam tum incipiat *lentescere*. Itaque in *tertiis* mensibus si mulieri non prodierint, *febrem erraticam*, & *horrorem* accedere scribit *Hippocrates*^b.

Venarum in *pedibus cruribusq;* *Varices* non tantùm à sanguinis *exuberantiâ*, sed regressu in *Venam Cavam* aliquatenus tardato oriuntur. Accumulatâ enim *plethorâ*, distenditur adeò atque intumescit *uterus*, ut necessario *ramos Ili-*

^a 3 34.

^b *Morb. Mul.* I. 4.

cos multum comprimat; comprimendo verò sanguinis per eos refluxum moretur. Ita circuitu in *cruribus* admodum languente, intumescunt *venæ*; in quibus quoniam sint *valvularum* interjectu, distinctæ quasi *cellulæ*, non *æqualiter* turgescunt latera, sed tumores quosdam, ut ita dicam, *geniculatos*, quos *varices* appellant, efformabunt; in iis scilicet, quæ à duabus *valvulis* comprehensa sunt, *intervallis*. Quò autem magis à corde dissitæ sint venæ, eò turgidiùs eminent *varices*: quia, cùm major sit fluidi incumbentis *altitudo*, major etiam erit ad *extremitates* canalium *pressio*. Accedente *lentore* intensiùs adhuc intumescunt *varices*: quia, languente sanguinis *velocitate*, tardior multò sit per *venas iliacas* recursus.

Quòd si paulò diutiùs fiat ista à *plethorâ* distensio, laterum fibræ sanguinis imperu dimotæ & sejunctæ ita fatiscent, ut per ipsarum rimas humores facilè exudent; ita aditu in vasorum interstitia semel patefacto, perenne fiet stillicidium; unde sensim increscet *tumor*. Qui ad *inferiora* potissimum, uti *pedes*, *crura*, & *hypocondria*, nascetur; quia cùm difficilior & tardior sit in his *infimis* canalibus sanguinis ad cor recursus, & gravior incumbentis fluidi moles, uti jam ostensum est, ibi major erit in latera vasorum nisus, & proinde facilior in interstitia illa fluidi eruptio. Hinc paucis quibus supprimuntur menstrua, hujusmodi *tumores* absunt: in quibusdam etiam *rheumatismi*, & *podagræ* speciem præ se ferunt, quâ quidem mulieres prorsus immunes esse scribit Hippo-

crates^a, nisi defecerint menses. Hos à *plethorâ tumores* proficisci ideo quoq; haud absurdè contendas, quòd *humidi temperamenti* mulieres, quibus diutiùs durant menstrua, suppresso profluvio, *citiùs* intumescunt: quale *Hippocrates* temperamentum *occidentalium*^b, quas vocat, foeminarum esse proprium observat; siquidem illi ista plaga ita *frigida & aquosa* videatur, ut incolis & *suppressionem mensium*, & proinde *tumores* inducat. Atque hi quidem *tumores*, ut plurimum *laxi* sunt, non rarò tamen in abdomine *duri*, instar *nodi* aut *tuberculi* cujusdam, observantur; in quibus id satis singulare est, quòd non jugiter excrescant, sed modò turgeant, modò penitùs subsidant, ita ut hi ad *hysterica symptomata* reducendi sint *tumores*, de quibus in sequentibus dicetur. Talia circa inguen *tubercula*, retentis mensibus, observat *Hippocrates*^c. Quòd si longiùs perseveràrit suppressio, *lentore* accedente, ita sensim languescit circuitus, ut, motu per vasa minima imminuto, sanguinis particulæ tenaciùs inter se cohærentes, *obstructiones* in cæteris canalibus, *lymphaticis* præsertim, qui omnium sunt tenerrimi, facilè pariant. Ita humorum *visciditas*, fibrarum *laxitati* conjuncta, *hydropem* inferet, qualem in suppressis mensibus describit *Forestus*^d. Frequenter etiam in ipso *utero* succrescit *Aqua intercus*, quam & sæpe notat *Hippocrates*^e: qui quidem morbus *virgines* potissimùm afficit, eodem annotante *Hip-*

^a Aph. 6. 29. ^b De Aer. 12. ^c Nat. Puer. 7. ^d 19. 34.
^e Morb. Mul. 1. 2.

pocrate^a, quia in iis faciliùs supprimuntur menses, uti postea dicetur. Pariter si aliæ evacuationes, uti *hæmorrhoidum*, *urinæ*, *diaphoreticos*, &c. suppressæ fuerint, propter *plethoram* in corpore coacervatam, frequentissimè succedit *hydrops*: etiam nostræ de *plethorâ* sententiæ ulteriùs adhuc favet quotidiana illa de *gulosis* & *bibacibus* observatio, quòd in *hydropem* præ cæteris multò procliviores sint.

Hæc quæ à canalibus nimium oppletis oriuntur mala, *Ventriculo* imprimis & *Intestinis* nocitura facilè sentiet, quisquis vasorum, ad eas partes reptantium, multitudinem penè infinitam perpendat. Quippe, ob humores plethoricos, in ipsis vasorum tunicis quædam quasi *Inflatio* sentitur: quæ cùm spirituum per *nervos* influxum, uti dictum est, intercipiat, languescit admodum *motus* ille ventriculi & intestinorum *Peristalticus*, quo in tenuem *chylum* rediguntur alimenta. Ita ut his *chyloso* instrumentis, ob spirituum inopiam, minùs vividè se moventibus, non tantùm *tardiùs*, sed *imperfectiùs* etiam comminuatur *chylus*: unde etiam majore copiâ intra *primas vias* accumulatur, & quendam *plenitudinis* sensum inducit. Adhuc *crudior* erit & *viscidior* chylus, si adsit *lentor* sanguinis; cùm enim in *lentore* motus sanguinis sit imbecillior, & cohærentia multò tenacior, non modò minor spirituum in *musculos* derivatio, sed minor etiam erit in *glandulis ventriculi*, & *intestinorum* liquidi secretio: ita ut alimenta liquido eo, quo hume-

^a *Morb. Mul.* 1. 87.

scere & molliori solebant, defraudata, minùs rite dissolvi queant; inde longior in intestinis *chyli* mora, & compages crassior. Igitur ferè semper mensium suppressorum comes esse solet *alvi pigrities*: tum quia, *motu* intestinatorum *imminuto*, minùs detrusæ sint fæces, tum quia præ *siccitate* per se tardiùs exire queant. Hinc alia elucet ratio, cur plethorico sanguini necessariò tandem accedat *lentor*; quia scilicet *chylus*, ob motum stomachi & intestinatorum in *plethorâ* imminutum minùs, comminuitur, adeoque magis crassescens cum sanguine circulatur. Vera quippe est *veterum* sententia, id quod in *primâ* concoctione crudum est, in *secundâ* aut *tertiâ* nunquam digeri. Et hunc quidem *chyli lentorem* suppressioni menstruæ brevi succedere satis manifestum est, quod mulierum quibus suppressi sunt menses prima ferè semper sit de *Ventriculo* læso querimonia. Hinc sanguis crassior factus minutissima, quæ per *faciem* excurrunt, vasa nequit pervadere; unde *genæ pallidæ*, & *decolores*.

Chylus autem, si diutiùs æquo in his pomœriis moretur, ea vitia contrahet, quæ liquoribus *stagnantibus* ferè semper adsunt, cujusmodi sunt *Putredo*, & *Acor*: cùm verò sine quodam partium *motu putrescere* nequeat *chylus*, quicquid *aëris* in eo continetur, fortiùs quoque agitabitur: qui si *intus* sit conclusus, *flatus* & *murmura* excitabit: si *foras* eliminatus, *ruetum*. Multifariam autem oriuntur ventriculi & intestinatorum *tormina*, tum quia canalium fibras *intus* vehementer admodum distrahic sanguis

sanguis plethoricus, tum quia *extrà* chylus jam in *Acidum* mutatus pungit, vellicatque: utrâvis enim de causâ inferetur *Dolor*: qui si intensior sit, stimulo suo musculosam *ventriculi* tunicam laceffet, eâque adeò violentiùs contractâ, *Vomitum* provocabit.

In *corpore* sentitur *gravitas*, quia solenni mensium evacuatione inhibîtâ, tum reverà crescit corporis *pondus*, tum imminuuntur etiam *vires*: quæ quodocunque deficiunt, corpus, etiamsi reverà *levius* sit, *sentienti* tamen *gravius* videtur. Si enim dimidias ei, qui pondus sustinere debet, vires detraxeris, idem est ac si duplum imposueris. Suppressis verò mensibus sequitur virium *imbecillitas*, quia vasa sanguinea & in cerebro & in cæteris quibuscunque corporis partibus ita supra modum intumescunt, ut nervos, quibus adjacent, premant admodum & constringant; adeò ut tum minor liquidi nervosi fiat secretio; tum minor etiam, pro ratione liquidi secreti, in membra derivatio. Itaq; spiritibus ad hunc modum interceptis, oriuntur *vires imbecilles*. Ita suppressis mensibus sequuntur *duo illa*, quæ apud *authores* statuuntur *plethoræ genera*; crescente enim indies *ad vasa plethorâ*, tandem succedit etiam, quæ *ad vires* dicitur.

Cùm ad hunc modum canales inferciat sanguis redundans, *glandulæ*, utpote ex *vasculis* tenuissimis convolutæ, & carne parum suffultæ, siquæ aliæ corporis partes, labem satis promptè excipient: inter quas nullæ quidem promptiùs, quàm eæ, quæ ad internam *tracheæ* tunicam infe-

inferuntur; quod ex *perspiratione impeditâ*, si-
ve ut vulgò loquimur, *suscepto frigore*, quoti-
die experimur. Perspiratione quippe impeditâ,
glandulæ tracheales ideo tument, quia obstru-
ctis poris cutaneis, major ad cæteras glandulas
derivatur sanguinis copia; unde major quanti-
tas materiæ per ipsas fecernitur; ita *tracheales*
hâc majori humorum copiâ oppletæ turgescunt,
atque infarciuntur. Viscidus igitur humor cum
tracheæ glandulis semel inhæserit, nerveas
propagines, quibus circum undique vestiuntur
glandulæ, ita premit & vellicat, ut necessariò
musculi, quibus *nervi* inserviunt, in contra-
ctionem excitentur: musculis verò *tracheæ*
contractis, per *os* exprimitur *aër*, seu quod i-
dem est, fit *tussis*. Quam quidem, cum *dysp-
næam* comitem non habeat, ab his *glandulis*
potiùs, quàm à *pulmonibus* proficisci credimus;
quippe si in *pulmones*, inciderit materia redun-
dans, *tussim* excitare posse vix videtur, nisi &
simul inferat *spirandi molestiam*: quæ sanè in
suppressis mensibus perquam familiaris est. San-
guine enim in vasis *pulmonum* capillaribus re-
stitante, *vesiculæ bronchiales*, quæ arteriis u-
bique interjectæ sunt, tum pondere nimio la-
borant, & quendam *gravitatis* seu *anxietatis*
sensum excitant, tum in spatium angustius com-
pressæ, ad *aërem* per vices intromittendum ex-
pellendumq; ineptiores fiunt: ita ut, sanguine
magis indies stagnante, non nisi difficulter admo-
dum peragatur *respiratio*. Ita à potu largiori
dyspnæam inferri scribit *Hippocrates*^a. Quin

^a *Præd. 2. 5.*

graviùs adhuc lædetur respiratio, si *thoracis musculi*, uti plerumque fit, vel ita peccante materiâ oppleti sint, vel spiritibus, sive ob *plethoram* nimiam sanguinis, sive *lentorem*, destituti, ut munere suo minùs rite defungi queant, & *costas* nec validè fatis fursum *elevant*, nec deorsum *premant*: unde parcior aëris ex *vesiculis* expressio, & gravior in spirando *pulmonum* labor. Etiam aliquando ab inflatis *utero* & *hypochondriis*, oritur, aut saltem augetur *dyspnœa*; quia, *diaphragmate* fursum intra *thoracem* protruso, ita coarctatur *pectoris* cavitas, ut debitæ *pulmonum* expansioni desit spatium; unde spirandi difficultas: cui malo maximè obnoxii sunt ii, quibus *thorax* angustior est, uti experiuntur *gibbosi*. Quòd si hoc *pulmonibus* diutiùs incumbat malum, succrescet, quod gradu tantùm à *dyspnœâ* discriminatur, *asthma*.

Et hæc quidem in *pulmonibus* orientur symptomata, etiam si adhuc *intra* canales sanguineos coerceantur humores plethorici: qui si tandem *extra* vasa profluant, & in *folliculis bronchialibus* sive potius in *interstitiis* eorum sedem figant, eos multùm undique distendent; unde paulatim increscet *vomica*: quod quidem vocabulum, si *vomicam* à *phthisi pulmonari* distinctam esse volumus, humoribus *intra pulmones* quidem effusis convenit, *vesiculâ* tamen sive *cysti* propriâ adhuc contentis; ita, quia nullum cum *bronchiis* commercium habeat, aut profundius saltem delitescat *vomica*, nulla etiam per *tussim* fiet *puris* excretio. Nec in *interstitiis* solùm, sed & in *glandulis*, quibus plurimùm

plurimum scatet interna *bronchiorum* tunica, accrescere potest *vomica*: cæ quippe *glandulae*, quanquam in sano corpore oculis vix percipi queant, accedente morbo distendi admodum possunt, & *grandescere*: quod in reliquis *glandulis*, *pericardii* putà, *pleuræ*, *peritonæi*, &c. quæ extra morbum aciem oculorum fugiunt, frequenter observamus. Hujusmodi sanè *vesiculas* non semel vidi, nunquam tamen æquè conspicuas reperi, ac in foeminâ quâdam, quæ *tabe*, menses suppressos insecutâ, interiit. Hujus in sinistro latere universus *pulmo* materiâ purulentâ ita differtus est, ut ad *scirrhum* penè accederet: immisso cultro exiit *pus*, non circumquâque diffluens, sed *distinctis vesiculis*, plurimum quidem *turgentibus*, non *ruptis* tamen, inclusum: quâ de re ut certior fierem, *vesiculas* quasdam aquâ tepidâ ita elui, ut omnî tandem *pure* exhausto, oculis integræ atque indivulsæ exhiberentur. Quòd si demum hæ *vesiculæ* inflammatae & disruptæ fuerint, facto *ulcere*, succedit *tabes*. Cujus quidem causa frequentissima apud authores statuitur, aut evacuationis solennis suppressio^a, aut plenior alimenti ingurgitatio: utrinque scilicet ea, quam volumus, inducitur *plethora*. *Muliebrium* verò *phthiseum* usitatissimam originem agnoscit *Mortonus*^b, menses obstructos; quas quidem, quando ab hoc fonte derivantur, *Lethales* pronuntiat *Hippocrates*^c.

Nec sua meliùs *cordi* constat, suppressis men-

^a Willis *Pharm. Rat.* 82.
2. 13. *Morb. Mul.* I. 6.

^b *Phthisiol.* 3. 9.

^c *Præd.*

sibus, *contractionis remissionisq;* norma: accumulatis enim intra valvâ pene ad rupturam usque humoribus, sanguis, qui universum ferè *aortæ* truncum obsidet, liquido, quod à *corde* protruditur, validiùs multò renititur, quàm cùm minor esset in canalibus plenitudo: sanguinis enim *renitentia* est, ut *particularum copia*. Ita liquidum, hoc impeditum obstaculo, quò minùs liberè foras profluat, majore quàm consueverat copiâ intra *cor* 'is *ventriculos* turgescit, & cor adeò nimio *pondere* laborat admodum, & pene *suffocatur*: spiritus interim in fibris motricibus compressi, & quasi *stimulo* quodam excitati, vires suas vividiùs exercent, ut sanguinem forti satis impetu foras protrudant. Corde autem vehementiùs contracto, ad *sternum* altiùs insurgit *conus*, & in *costas* ictu quodam impingit, qui proinde dicitur *palpitatio*. Ob hanc sanguinis in arteriis *renitentiam*, necesse est, ut vehementiore impetu contrahatur *cor*, quia vis ea, quâ sanguinem projicere conatur, percussa quasi & reverberata in ipsum denuo recidit; ita ut impetus, qui in sanguinem per *arterias* propellendum fieri consuevit, in *cordis fibras* exerceatur: unde cordis violentior concussio, & altior ad *costas* insultus. Ad hunc modum si uberiùs increverit *plethora*, singulis arteriarum pulsibus *palpitabit* etiam *cor*. Adhuc molestior fiet *palpitatio*, si *plethoræ* sanguinis *lentor* accesserit; quia globulis sanguineis arctiùs inter seco hærentibus, major erit ea, quam in *aortæ* trunco fieri diximus, *renitentia*. Igitur mor-

bis iis, in quibus *lentior* reperitur sanguis, ut *rheumatismo*, *passioni hystericae*, *chlorosi* etiam & *cachexia*^a, comes ferè assidua adest *palpitatio*.

Ulteriùs porrò indies crescente *plethorâ*, cor nimiae sanguinis copiae succumbit; deficient quippe quæ tanto ponderi movendo pares sint, vires. Motu adeò cordis suspenso, *intermittit pulsus*; & quia cursus sanguinis in præsens sistitur, nulla fit in cerebro spirituum secretio, unde *animi deliquium*, sive *syncope*. Potest etiam prohiberi contractio cordis à *pressione*, quæ in *cerebro* à vasis plethoricis oritur, quæque spirituum iter per *nervos* intercipit. Ad hoc vasa cordis *coronaria*, cùm plurimùm distenta sint, nervos etiam vicinos comprimunt: unde influxu spirituum præcluso, otiantur fibræ, & nulla fit è corde sanguinis projectio.

Capitis dolorem quomodo inferat *plethora*, alibi ostendimus; ideo suppressis mensibus necessarium esse dicit *Celsus*^b, ut in *capite* fiant *dolores acerbissimi*. Hi quidem *gravedinosi* erunt, propter solam, quâ canales quaquaversum urget *plethora*, *pressionem*, præcipuè si affuerit *lentor*; *pulsantes* etiam, quia cùm in *arteriis* uberius coacervatur sanguis, & impetu vehementiore propellitur, validior erit in latera humorum *ictus*, & major fibrarum *distractio*: unde *dolor cum pulsu* excitabitur. Ad *sinciput* tamen & *occiput* sentiri solent *dolores*, quia *dura mater*, in quâ præcipua est *doloris* sedes, *suturæ parietali* & *lamdoidali* firmè conne-

^a Willis Phar. Rat. 263.

^b 2. 7.

ctitur; ita vasa, quæ per eam disseminantur, & *intus* plurimum distracta sunt, & *extrà* ossibus compressa: in his igitur canalibus plenitudine admodum turgentibus, & ad solidum impactis, acrior erit *doloris sensus*. Multa etiam *duræ matris* vasa, per tenues utriusq; *suturæ* rimas, in *integumenta capitis* funduntur: adcò ut ab his fortè, propter *tunicas* exuberante sanguine dimotas, & *foramina* quæ pertranseunt angustiora, haud exigua *doloris* pars oriatur. Itaque ii, quibus *suturarum* juncturæ arctè nimis inter se coaluerint, *cephalalgia* ut plurimum graviter laborant. Ab hujusmodi *dolore*, si vehementior fuerit, satis patet, quomodo contumaces inferantur *vigiliæ*.

Hic quidem *capitis* in suppressione mensium *dolor*, utcunque familiaris sit, non ab occultâ aliquâ cum *utero sympathiâ*, sed ab ipsius *cerebri structurâ* oritur: quod cum sit viscus omnium *tenerrimum*, injurias minùs, quàm reliquæ partes, sustinere potest. Hoc etiam de *capite* & *pulmone* annotari debet, quòd in iis multò faciliùs atque altiùs, quàm in reliquo corpore, suscipitur ea, quæ à *mensibus suppressis* oritur, labes; hæ quippe partes omnium sunt mollissimæ, & humorum incurfui minimè renituntur. Itaque in omni ferè morbo graviùs plectuntur. Præcipuè verò, si in *ipso fluxu* restricti sunt menses, sequi frequenter solet *capitis dolor*, & *hæmoptoe*.

Cerebro autem semel affecto, in mali consortium ob viciniam facilè trahuntur *oculi*, & simili pondere ob canales nimium refertos *laborant*,

borant, nonnunquam etiam *intumescunt*: quemadmodum & eos *gravari* cernimus, simul ac in cerebro languescant spiritus, seu quod idem est, obrepat *somnus*. Ulterius adhuc serpente malo, *oculi* ita affecti sunt, ut *vertiginem* inducant: cujus quidem morbi rationem primus exposuit *Bellini*. In eâ enim quæcunque oculis obversantur, utcunque quiescentia & immota sint, *rotari* tamen, & *circumagi* videntur. Quippe cùm motus rerum externarum non aliâ ratione ab oculis percipi soleat, quàm per mutationem loci, in quem veniunt *species* intra oculum perductæ, sive imagines in *retinâ* depictæ; quocunque modo *specierum distantia* mutetur, *objectum moveri* videbitur. *Mutari* autem potest *distantia* vel quia objectum reverà moveatur, vel quia oculus moveatur immoto objecto, vel denique quia *nervi optici* filamenta loco suo dimota sint. *Nervo* enim *optico* sive *retinâ* dimotâ, *radii* ab objectis emissi non in easdem oculi partes incidunt, sed pro vario *retinæ* motu diversas; ita ut, dum *imagines* in *retinâ* locum mutant, *objecta* tanquam locum perpetuò mutantia videantur. Cùm itaque *arteriæ*, ad oculi fundum disseminatæ, sanguine plethorico supra modum turgescant, *retina* seu *nervi optici* expansio, *pulsantibus*, quibus contigua est, *arteriis*, loco suo dimovebitur, adeoque imago *radiantis*, in ipsam incidens, locum quoque immutabit: unde ipsum quoque moveri videbitur *objectum*, seu, quod idem est, ingruet *vertigo*.

Distentis ad hunc modum *cerebri vasis*, facile concipitur, quomodo tandem succedat *apoplexia*, morbus *vertigini* multum affinis. Hujus quidem plurimæ causæ apud authores statuuntur; quas tamen accuratissimus de hoc morbo scriptor *Wepferus*^a ad duas classes redigit, eas scilicet, *quæ vel arteriolas obstruere possunt*, vel *spirituum per nervos effluxum intercipere*. Suppressis igitur mensibus ita paulatim increfcit *plethora*, ut *lentorem*, qualem modò descripsimus, inducat: qui si tenax nimium & compactus fuerit, ad minima cerebri vasa adhærescit sanguis. Canalibus igitur semel oppletis, augescit indies allabente lento sanguine obstructio, donec in eam tandem molem excreverit, ut *arteriolarum* orificia penitus occludat: unde nulla ex arteriis fiet in *nervos* liquidi trajectio, adeoque nullus in corpore relinquetur *sensus*. Ita brevi succedet *mors*. Si tamen haud ita invaluerit obstructio, ut omnes in nervis aditus præcludat, sed aliquid adhuc liquidi nervosi per tubulos derivari sinat, liquidum illud, utcunque imbecillius sit, quàm ut cæteris *musculis* movendis sufficiat, *cor* tamen & *pectus* fatis vividè movebit: *cor* enim, uti & ex iis plurimi qui *respirationis muneri* inserviunt *musculi*, *antagonistis* destitutum est, ideoque minore multò spirituum copiâ in contractiones cietur, quia tollitur illa, quæ ab *antagonistis* oritur, *contranitentia*. Ita ut *arteriolis obstructis*, potest *sensus* omnis extinguì, etiam *fibrarum* omnium, nisi in *corde* &

^a *Apopl.* p. 173.

thorace, motus, in quo quidem consistit Apoplexiæ natura. Potest etiam inferri apoplexia, etiamsi absit sanguinis lentor, ob interceptum nempe spirituum per nervos effluxum: qui quomodo ab arteriis ultra modum dilatatis impediri potest, antea jam ostensum est. Eodem modo nervos comprimet spiritusque intercludet, sanguis extra vasa in cerebro effusus; quod non rarò in plethoricis accidere solet. Igitur sanguineo temperamento præditos, & poculis liberiùs usos, apoplexiâ frequentius corripì observamus.

Cùm *insania sit delirium sine febre*, quicquid poterit inferre *delirium*, excitabit etiam *insaniam*. *Delirium* verò à motu spirituum vario & perturbato oritur, unde *species in cerebro*, nullo ordine cohærentes, fulcitantur. Spirituum verò perturbatio succedet, cùm motus ipsorum nimium rapidus sit, quod in *Plethorâ* facilè accidit, quia augetur moles sanguinis, & cordis impetus; unde vehementior *globulorum* in canalibus attritio: quæ cùm in *cerebro* etiam fiat, & nervos nimis violentè premat, *tremores* nervorum confusi erunt, adeoque & *species* minùs distinctæ. Ita ab evacuatione quâcunque solenni inhibita^a sæpe sequitur *insania*, præsertim si *æstas* fuerit *sicca*, aut præcesserit *potus calidior*, à quibus omnibus inducitur *plethora*; itaque etiam *evacuantibus* curatur. Exemplum ad hanc rem satis appositum præbet *Forestus*, qui *venæsectione* mulierem, à suppressis mensibus *insanientem*, salutem

^a Willis Path. Cereb. 445 & 493.

restituit^a. Ita certum est illud *Hippocratis* ef-
fatum, *insanis si varices vel hæmorrhoides*
supervenerint, insanix crisin fieri^b; idem eti-
am de *mensibus erumpentibus* dicendum.

Fluor albus, cùm ex uterinis glandulis fe-
ratur, facilè erumpit, si glandularum orificia
paulò laxiùs dehiscant: quæ quidem nihil prom-
ptiùs possit diducere, quàm humorum *pleni-
tudo*. Igitur quoties menses denuo dimanent,
semper subsistit *fluor*; quia minuitur ad glan-
dulas *plethora*: quibus quidem induciis digno-
scitur, utrùm morbus hic *idiopathicus* sit, an
symptomaticus. Ita restrictis mensibus, à san-
guinis redundantia oritur *fluor albus*; quod
non modò evincit ratio, sed & experientia
confirmat: eæ quippe, quæ in suppressione
menstruâ huic malo maximè obnoxia reperi-
untur, habitûs sunt admodum *plethorici*. Id
etiam advertendum est, mulieres, quibus copiâ
majore manaverit *fluor albus*, cæteris symp-
tomatis, quæ à mensibus inhibitis sequi solent,
minùs conflictari. In nonnullis etiam mensi-
um *prodromus*, & quasi *vicarius* reperitur
fluor albus.

Passionis hystericæ pleraque symptomata
cùm sint *Spasmodica*, uti accuratissimè com-
monstravit Cl. *Willisius*, quale illud certè est,
quod à suppressis *mensibus* oriri diximus, *glo-
bi* scilicet in *Gutturè*, quasi *ascensus*, videamus
quomodo à *plethorâ* deduci queat convulsio.
Hujus quidem *duas* causas agnoscit *Hippocra-
tes*^c, *repletionem* nempe, & *inanitionem*; quas

^a Lib. 10. obs. 24.

^b Aph. 6. 21.

^c Aph. 6. 39.

si attentius scrutemur, morbi istius rationem melius explicabimus, quàm si subtiles recentiorum *hypotheses* consulamus. Quippe ad hunc modum illustrari potest ea, quæ hujus loci est, ex *repletione convulsio*: quæ cùm sit contractio inflatioque musculi *involuntaria*, orietur, quoties in muscolum derivatur major liquidi copia, quàm quæ imperante *voluntate* impediri possit: ita duobus *antagonistis* ad *æquilibrium* perductis, si alteri plus liquidi adjeceris, is in statu contractionis continuo permanebit, donec in istum, qui in opposito latere est, æqualem liquidi copiam deduxeris. Hujusmodi quidem major solito in *muscolum* liquidi influxus fiet, cùm sanguinis crasis ita inæqualis sit, ut *antagonistæ* vasa lentis humoribus quodammodo obstruantur: quo fit, ut in fibras alterius hujusce musculi major insuat liquidi copia. Liquido igitur in vasis supra modum redundante, potest esse ita valida musculi contractio, quæ ab imperio voluntatis tolli nequeat; quòd si *lentor* adsit, adhuc magis intra fibras motrices detinebitur liquidum, adeoque fortior fiet contractio. Ita si ad hunc modum infletur *tracheæ* & *æsophagi* tunica musculosa, inferetur sensus quasi *globi* cujusdam ad *fauces* ascendentis: simul etiam ingruet *suffocationis* metus, quòd *laryngis* musculi, eodem modo intumescantis aëri introitum minùs liberum concedant. Atque huic malo maximè sunt obnoxia, quibus aut *incertis periodis* redeunt, aut *guttatim* fluunt menses. Pariter à *plethorâ* deduci possunt cætera *passionis hystericæ* symptoma-

ta;

ta; quæ non modò à *suppressis mensibus* sequi solent, sed etiam à *fontanellis & ulceribus* occlusis sæpe excitantur: idem quoque in *viris*, quibus periodica aliqua evacuatio restricta est, *cap. 8.* annotavimus.

Urinæ stillicidium, quod in suppressione menstruâ sæpe fieri notat *Hippocrates*^a, a *plethorâ* facilè deducitur. Vasa enim sanguinea, quæ *vesicæ* inferuntur, cùm plurimùm distenta sint, nervos ita comprimunt, ut parcius & difficilior multò fiat in fibras motrices spirituum derivatio: unde muscoli ad *urinam* foras trudendam minor vis. Post aliquam verò moram spiritibus copiâ fatis ubere congestis, eo *momento* in *urinam* nitetur *musculus*, ut parvulam quandam illius portiunculam necessariò propellat: hoc verò impetu exhaustis iterum spiritibus motum suum suspendere cogetur, donec novæ influant spirituum suppetiæ: ita, superato sensim per *vices* obice, urinam *guttatim* demittit *vesica*. Quòd si vasa intensius intumuerint, ita ut spiritus prorsus intercipient, etiam prorsus *supprimetur urina*; quia non suppetit aliqua idonea vis, quæ eam ex *vesicâ* protrudat. Fiet etiam *urinæ suppressio*, si *vesicæ sphincter*, *spasmo* correptus, exitum præcludat: vel si adeò *lentus* fuerit sanguis, ut nulla inde fieri possit in subtilissimis *renum* canalibus feri secretio.

Suppressis mensibus *sanguis per aliena loca erumpens*, fatis ostendit eruptionem à *plethorâ* suscitari. Intra vasa enim quietus subsisteret,

^a Nat. Puer. 7.

nisi copiâ ita redundaret, ut amplius sibi spatium posceret, quàm quod largiri possit vasorum capacitas. Aucto igitur *momento*, ita ut canalium impedimenta superet, effluit sanguis. Hæc per *aliena loca* eruptio in *virginibus* magis, quàm in iis *quæ pepererunt* familiaris est, uti observat *Hippocrates*^a; in *virginibus* enim angusta admodum & constricta sunt *uteri* vasa, ita ut citiùs per ea inhibeatur solennis mensium purgatio: adeóq; ex *aliis* canalibus, quâ data est porta, effluat sanguis redundans. In iis verò, quæ *pepererunt*, *os uteri*^b, uti loquitur *Hippocrates*, sanguini exeunti magis patet, h. e. ipso interprete, *vasa*, quia *lochiorum* fluxu multùm *ampliari* & *dehiscere* soleant, mensibus, quandocunque erupturi sunt, liberiores præbent exitum: itaque id etiam adjicit, eas minùs frequenter suppressione menstruâ laborare; suppressionem verò, si quando inciderit, faciliùs ferre, tum quia *partûs doloribus* assueverint, tum quia *vasa uteri* multò *ampliora* habeant, quàm *virgines*^c. Quòd si in *virginibus* per alia etiam loca sanguinis exitus præclusus sit, oritur *febris alba*, sive *chlorosis*; quæ nihil aliud est quàm symptomatum, quæ jam descripsimus, *congeries*.

Ex his pleraque symptomata ab aliis rebus, quæ *plethoram ad vasa* inferunt, sæpe oriuntur, uti exercitio nimis violento, potu aut calore immodico, præsertim verò evacuatione aliquâ inhibita^d: quidni eadem etiam, *suppressis mensibus*, *plethoræ* tribuantur?

^a Morb. Mul. I. 9. ^b Ibid. I. I. ^c Ibid. ^d Willis Bellin passim.

Plurima ex his, quæ exposuimus symptomata à suppressis mensibus ingruere notat accuratissimus *historiæ medicæ* scriptor, *Hippocrates*; quæ etiam à plenitudine oriri passim docet^a, uti & ipsum mensium profluvium. Satis singularis est ea, quam de *Phaethusâ* & *Nymasiâ* narrat, historia; quibus, post diuturnam mensium suppressionem, corpus tandem virile factum est, ita ut *hirsutæ* admodum, & *barbatæ* evaderent^b. Ea enim, mensibus inhibitis, succrevit sanguinis *redundantia*, quæ in vasis minimè contineri potuit; *poris* igitur cutaneis humorum impetu sensim patefactis, in *capillos* migravit, quod erat liquidi superfluum. Nonnunquam etiam in *lac* convertitur, quod in *virgine* suppressionis menstruæ signum statuit *Hippocrates*^c.

His symptomatis foeminæ omnes haud æquè sunt obnoxia; in his *caput*, in illis *pulmo*, in aliis denique *venter* potissimum afficitur: quippe ea est *fluidorum* omnium indoles, ut ad eas partes decumbat humor redundans, quibus minor suppetit ad renitendum vis: unde in iis liberius materiæ affluenti hospitium. Hæc quidem partium imbecillitas in diversis foeminis perinde varia est, ac sunt animi mores; nec duas fortè reperias, quibus, in suppressione menstruâ, sibi invicem accuratè respondent symptomata. Quæ tamen symptomatum varietas huic morbo ita parum propria & peculiaris est, ut ei cum cæteris ferè omnibus, *febre* præsertim, sit communis.

^a Nat. puer. §. 7. Morb. Virg. 2. Morb. Mul. I. 2. lib. 6. ^c Aph. 5. 39.

^b Epid.



C A P. XI.

*De Methodo in suppressis Mensibus
Therapeuticâ.*

Percursis jam suppressorum mensium symptomatis, & ad theoriæ nostræ normam explicatis, non alienum erit rem paulò ulteriùs persequi *medendique* rationem expendere, nequid desit, quod ad *plethoram* illustrandam afferri queat. Ea quippe *medendi* unica est *intentio*, ut instauretur denuo, quæ menses refuscitet, *plethora*.

Antequam verò *methodum therapeuticam* aggrediar, notandum est non semper esse in suppressis mensibus *medicinæ* locum, cùm omnis suppressio non sit *morbosa*; ideo neque provocandi sunt, quia fluere non debent, menses. Ita in *gravidis* & *lactantibus* citra sanitatis noxam deficiunt; aliquando etiam in *obesis* & *athleticis*; in his enim per *poros* egeritur, in iis in *pinguedinem* migrat humidi redundantia. Pariter si per *aliena loca* erumpat sanguis, saluti esse solet fluxus vicarius: qui ideo, si nullo gravi symptomate comitatus fuerit, vix temperari, nedum restringi debet. Denique si sanguis *deficiat*, si *evacuatio nimia*, si *morbis chronicus*, aut *inedia longa* præcesserit, neutiquam ciendi sunt menses, donec resectæ fuerint vires. Hujusmodi quippe fœ-

minis

minis ita parùm nocet suppressio, ut morbum potius accerferet, si intempestivè excitaretur fluxus.

Cùm itaque omnis suppressio *morbosa* vel à *canalium*, vel à *sanguinis* vitio derivetur, duplex etiam erit curandi intentio; altera ad *canales recludendos*, altera ad *emendandum sanguinem* dirigenda.

I. Suppressionis, quæ à *canalium vitio* oritur, signa in prioribus ostensa sunt: quod quidem vitium facilè in canalibus succrescit, si aut præ *siccitate naturali* nimis indurescant, aut *frigore* subito sint constricti, ita ut fibræ arctiùs jam inter se cohærentes renitentiâ suâ sanguinis momentum exsuperent. Si igitur, *qualitate* sanguinis illæsâ, obfirmati sint *canales*, curatione adhibitâ, oportet aut *impedimentum vasorum* imminui, aut *vim sanguinis* intendi.

I. Igitur ut vasorum impedimentum tollatur, *relaxandæ* sunt *fibræ*. Ad hunc finem tepidè adhibentur *externa* remedia, qualia sunt *suffitus, balnea, fomenta*, ex herbis *emollientibus, & penetrantibus* conflata. Particulæ ex plantis, sive *aquâ* sive *igne* elicite, & intra *uterum* susceptæ, calore adjuvante & quasi urgente, ita in vasorum poros se insinuant, ut fibras à se invicem separent & diducant; contactu autem fibrarum inhibito, vasorum latera laxiùs explicantur, & fluido impingenti debiliùs resistunt: ita vi *impedimenti* debilitatâ, iter suum per vasa expugnat sanguis. *Externis* hisce remediis plurimùm usus est *Hippocrates*: quæ certè locum habent, non modò cum

cùm à *vasis* supra modum rigentibus, sed etiam cùm ab ipso *sanguine* inducta sit suppressio: quippe, si relaxatis canalibus *impedimentum* minuatur, idem est, ac si auctum fuerit sanguinis *momentum*. Igitur, suppressis mensibus, *fomenta* purgationi esse præmittenda monet *Hippocrates*^a.

2. Ne à *canalibus constrictis* inhibeatùtur menses, *vis sanguinis* augenda est. Huic verò intentioni cùm eadem satisfaciat medendi norma, ac quæ in altero suppressionis genere adhibetur, *methodum Therapeuticam* lector ex sequentibus deducat.

Suppressio hæc, quæ à *vasorum vitio* oritur, minùs quidem frequenter accidit, curatu tamen est facillima: ea quippe, dum recens adhuc fuerit suppressio, *externis* remediis plerumq; cedunt: nonnunquam etiam, *æstivo* præsertim tempore, *per se* aperiuntur. Quod si diutiùs perstiterit vasorum durities, *plethora* indies accrescens sanguini tandem vitium inducit; unde altera, eaque multò frequentior, suppressorum mensium causa in prioribus deducta est.

II. Cùm igitur à sanguinis vitio, sive *lentore*, ortum ducat suppressio, eò dirigenda est omnis medendi intentio, ut, sublatâ partium cohærentiâ, is iterum sanguini concilietur impetus, qui uterina vasa perfringat. Quod ut assequerentur medici, his potissimum usi sunt instrumentis, *venæsectione*, *adhibitis ad crura cucurbitis* & *frictionibus*, *catharsi*, *vomitu*, remediis denique, quæ, tanquam essent ad movendos menses *specificæ*, appellantur *Emmenagoga*.

I. Itaque ad tollendam suppressionem, *venam*, si nihil impediat, *secari* luadet *Hippocrates*^a: quod etiam unâ ferè voce præcipiunt, qui eum insecuti sunt, scriptores; dissidentes interim, quo potissimum *tempore*, & quo *loco* emitti debeat sanguis. Alii quippe venæsectionem *præmittunt*, alii contrà non nisi post *purgantia* & *emmenagoga*, tribus vel quatuor ante periodum diebus, administrant; atque hi quidem in *brachio*, illi autem in *talo* instituendam esse censent. Utra potior sit sententia, ut meliùs intelligi queat, quærendum est, quomodo *intentioni therapeuticæ* respondeat *venæsectio*, seu quod idem est, *momentum* sanguinis instauret. *Momentum* igitur sanguinis, cum consistat in ratione *copiæ* & *velocitatis* compositâ, *venâ sectâ* fit imbecillius, nisi eâdem proportionem increseat *velocitas*, quâ diminuitur *copia*: quòd si major sit *velocitatis auctæ*, quàm *diminutæ copiæ* ratio, *momentum* increbrescit validiùs. Perforatâ venâ, sanguinis *velocitatem* augeri probat, qui primus *phlebotomiam* cum iudicio aliquo illustravit, *Bellini*^b; quia scilicet portione sanguinis evacuatâ, imminuitur multum illius *impedimenti*, quo præcedens sanguis sanguini continuò affluenti resistens moram injicit; remoto itaque obstaculo, ita ut minor sit particularum inter se nîsus, *citatiùs* per vasa deferetur sanguis. Ad quem verò gradum *velocitatem* perducatur *venæsectio*, seu utrùm sanguinis *momentum* intendatur an imminuat, ex variâ partium cohærentiâ col-

^a *Morb. Virg.* 2.

^b *Sang. Miss.* p. 89. 94.

ligendum esse monet scriptor idem accuratissimus^a. Quandocunque enim à Venâ sectâ sequitur intima sanguinis *dimotio*, seu quando ita rarefcit sanguinis compages, ut à contactu mutuo divellantur particulæ, ea increfcit *velocitas*, quæ sanguinis *momentum* possit intendere; quia tum minor fit in ipso sanguine partium resistentia, tum uberiùs in cor traducantur spiritus: ita sanguinis *crasi dimotâ*, & arterias extrorsum magis trudente, excitabitur *pulsus*. At si nulla fuerit sanguinis *dimotio*, imminutâ copiâ languescet sanguinis *momentum*, & quia non ita amplum spatium, ac prius, occupet sanguis, *minor* erit etiam in arteriis *pulsus*. Hæc ferè de variâ *momenti* post *venæsectionem* immutandi ratione differit vir scientissimus; in eo unicè lectori minùs satisfaciens, quòd id argumentum citiùs quàm par erat dimiserit, nihilque planè suggesserit, quod tanquam signum haberi possit, qualis demum sit illa sanguinis *crasis*, quæ à *venâ sectâ* facilè distrahitur, qualis iterum ea quæ dimoveri nequit. Hoc enim minùs perspecto, medenti parum constat, quonam modo sanguinis impetum immutatura sit *venæsectio*; cujus remedii quandocunque anceps sit fortuna, ab eo prorsus in suppressis mensibus abstinendum est, nisi fortè ad *symptomatum* vehementiam levandam institutum sit. Si enim copiâ detractâ *lentior* fuerit sanguinis compages, non modò minor erit spirituum secretio, adeóque cordis impetus imbecillior, sed & increfcet etiam ea,

^a P. 101, 112.

quæ *capillaria* jamdudum obsidet, *obstructio*. Itaque *principio* morbi cum sanguis admodum *lentescat*, non videtur in usum trahenda *venæsectio*, nisi id etiam certo aliquo indicio innotescat, tolli posse sanguinis cohærentiam, seu intendi impetum : quòd si hoc innotuerit, nec tum quidem ad menses ciendos peritè satis adhibetur *venæsectio*, si aliâ quâvis medendi methodo augeri queat *velocitas*, etiamsi nihil de *quantitate* detrahatur ; diminuitur enim, quæ *momentum* faciliùs adhuc excitare posset, *plethora*. Ad hoc id etiam accedit, quòd tam *subitæ* evacuationis nulla videatur necessitas, quia medicinæ moram concedat morbus. Neque hoc fanè prætermitti debet, quòd in iis, quibus suppressi sunt menses, ita ferè *vi-res* imminutæ sint, ut sanguinis missionem, à quâ adeò expedita inducitur humorum mutatio, minùs sustinere queant. Neque etiam foeminis remedium hoc facilè persuadeas, quibus, dum sanæ sunt, *venam* circa mensium tempus aperire religio est ; est enim apud eas certum quoddam in medicinâ *axioma*, & ab omni retro antiquitate derivatum, mensibus, si jam erupturi sint, officere *phlebotomiam*. Quanquam verò à *venæsectione*, si remediis præmissa fuerit, tam incertum plerumque sit levamen, quia non certò secuturum est impetûs incrementum : nonnunquam tamen sanguis ea de se præbet indicia, quibus si quis diligentius studuerit, *venam* haud inauspicatò poterit secare. Talis indicii exemplum sit, *pulsus plenus*, & *imbecillis* : qui, morbo nondum

dum inveterato, aliquando obſervatur. Itaq; ad hunc modum conſtituto *pulſu*, *venæſectio*, ſi adhibita ſit, ſanguinis *momentum* intendet. Quippe cùm ea ſit arteriarum *plenitudo*, ut in ſpatium amplius excurrant *tunicæ*, ſignum eſt non ita validam eſſe humorum *coherenti- am*; ſi enim denſa admodum & conſtricta fuerit compages, in molem anguſtiorẽ coirent particulæ, nec arteriarum latera ita extenderent. Ita cùm fluida ſatis ſit ſanguinis compages, turgent ob *plethoram* arteriæ: at quia ſanguinis *copia* ſeu quantitas materiæ movendæ augetur, vis autem cordis *contractilis* ſive propellens non augetur, ſed fortè diminuitur, ob *plethoram*, neceſſe eſt ut, cùm major quantitas materiæ æquali vel minore vi ſit movenda, minor ſit ſanguinis *velocitas*; adeoque ſi imminuatur quantitas movenda, eadem adhibitâ vi, vel etiam auctâ, (quod poſt *venæſectionem*, ſi inſignis fuerit *plethoræ* gradus, fieri neceſſe eſt) augebitur *velocitas*: unde vehementior cordis impetus, & *pulſus fortior*. Ita in hoc caſu ſanguis miſſus *pulſus imbecillitatem* tollit: ad quam quidem multum facit *tonus* arteriarum remiſſior; unde, tunicis ſanguini affluentibus minùs renitentibus, deficit *ictus magnitudo*. Detumeſcente verò in vaſis poſt ſanguinis miſſionem *plethorâ*, imminuitur ea, quâ nervi ob arterias nimis turgentes coarctati ſunt, *preſſio*: ita, ſpiritibus copioſius ad cor deductis, revivifcit ſanguinis impetus, & vaſorum tonus; unde digitum *fortius* ferit *pulſus*.

Vidimus jam, quid de hâc methodo sentiendum sit, quæ suppressorum mensium curationem à *phlebotomiâ* auspicatur: meliùs fortè arridebit ea, quæ non nisi post *purgantia* & *emmenagoga* venam aperit. Ex iis quippe, quæ de augendi in *missione sanguinis* momenti causâ differuimus, satis pater, præmissis *purgantibus* & *emmenagogis*, venæsectionem feliciùs esse cessuram: in his enim cùm ea sit operandi ratio, ut humores viscidos dissolvent & attenuent, uti ex sequentibus patebit, sanguis jam antè comminutus laxiùsq; cohærescens, copiâ detractâ faciliùs dimovetur, & fortius momentum concipit. Igitur *triduo* ante consuetum periodi tempus secatur *vena*, ut tum præcipuè novus sanguini accrescat impetus, cùm augmenti summam attigerit *plethora*.

Quo verò in loco instituenda sit *venæsectio*, magna est inter authores controversia; potior tamen videtur *Galen*^a sententia, qui venam in *talo* incidi juber. Facto enim orificio, non modò in incisam venam, sed in alias omnes, quæ ab eodem *trunco* proveniunt, uberior sanguinis copia derivatur, uti fusè satis demonstravit *Bellini*; quia nempe ad eas partes, ubi aperitur vena, minor quàm in reliquo corpore sit resistentia. Igitur si è *talo* mittatur sanguis, copiosior erit in vasa *uterina*, quæ à *venâ cavâ*, pariter ac *saphæna*, ducunt originem, sanguinis derivatio: adeóq; cùm fluido largiùs influente major sit vasorum distensio, facilius aperietur sanguini men-

^a Curat. per V. S. cap. II. 19.

struo egressus. Ita *hirudinibus* ad *hæmorrhoidas* adhibitis, mirum & promptum effectum se vidisse testatur *Mayernus*^a. Pariter cùm citra *lentorem* sanguis exuberans, *vasorum vitio*, restrictus fuerit, sectâ *Saphenâ* tum intensius rarefcent humores, tum ad uterum copiosius confluent: ita utrâque de causâ increfcet sanguinis ad *uterina* vasa momentum, perque ea *mensēs* demittet. Hinc haud difficulter colligi potest, quid de *Lindani* doctrinâ, apud *Etmullerum*^b ita decantatâ, sentiendum sit “qui tempora distinguit, in quibus vena secanda sit: ubi scilicet menses *instant*, nondum tamen fluunt, venam secandam suadet in *brachio*; ubi verò jam fluunt aut casu subito restringuntur, tunc *Saphenam* aperiendam monet. In *pede* verò nunquam secandam esse venam censet, nisi menstruatio actu fluat, aut ipse fluxus suppressus fuerit.” Hujusce doctrinæ rationem ita explicat *Etmullerus*, “Quòd nempe instantibus mensibus, dum turgescit & rarefcent sanguis, tum in eo omnis est naturæ conatus, ut deorsum versùs deducat sanguinem: itaque viæ si sint exiles, non statim aperiri possunt, quia potiùs distentæ sanguinis fluxum quodammodo sistant. Quando itaque per *Saphenam* apertam inferiùs sanguinis promovetur impetus, plus ad uterum ducis, & ita malum auges; sin apertâ *brachii* venâ, sursum nonnihil revellitur, liberantur viæ ab oppressione, & sanguis faciliùs fluit. Nunquam certè *Saphenæ* sectio menses pro-

^a *Morb. Intern. cap. 22.*

^b *Tom. I. 544.*

“ vocabit, nisi aut actu fluentes ex frigore,
 “ aut pavore fuerint restricti.” Quale sit hoc
 argumentandi genus, per se satis patet; sup-
 ponitur quippe sanguinem ita *turgidum* & *ra-
 rum* esse, ut per vasa satis expeditè effluere pos-
 set, nisi *deorsum versùs ducto sanguine* ipsa
 obesset *plenitudo*: quod certè ita parum me-
 dicæ philosophiæ congruit, ut ne communis
 quidem sensus ferret, vasa, quò magis sangui-
 ne *distenta* sint, eò minùs esse ad cedendum
 facilia. Quòd si menses & *jam fluentes* pro-
 moveat, & in fluxu *suppressos* revocet *Saphæ-
 næ* sectio, quidni etiam & *extra fluxum* restri-
 ctos queat deducere? unde fit ut in altero ca-
 su *momentum* sanguinis *instauret*, in altero
 cùm æquè fortiter sanguinem ad *uterum* ducat,
imminuat? Sectâ *brachii* venâ cùm nonnihil
fursum revellitur, *liberantur quidem ab op-
 pressionem viæ* uterinæ, sed impetu ob *pletho-
 ram* imminutam languente, haud ita facilè dis-
 siliunt vasa, quia minùs sunt distenta. Sed huic
 ipsius de *plenitudine* sententiæ *Riverii*^a ob-
 servationem multùm favere ait *Etmullerus*:
 “ In muliere quâdam, quoties secabatur vena
 “ malleoli, menstrua cohibita sunt; dum verò
 “ ex venâ brachii missus est sanguis, ea largi-
 “ us profluebant.” Cujus rei ratio, quia vul-
 garibus medicorum placitis adversari videbatur,
 ita à medicis *Monspeliensibus* explicata est,
 “ nempe cùm mulier illa plethorica esset, &
 “ suppressionem mensium pateretur, à nimia
 “ sanguinis copiâ uteri vasa ita distendente,
 “ ut comprimi sufficienter non valerent, at-

“ tracto sanguine ad ea vasa per venarum in-
“ feriorum apertionem augebatur obstructio.
“ Quando verò misso sanguine à venis superi-
“ oribus, retractio fiebat à vasis uteri, eorum-
“ que plenitudo & distensio minuebatur, tunc
“ illa faciliùs sese contrahebant ad expulsio-
“ nem naturalem & ordinariam, quæ per ute-
“ rum solet fieri.” Jamdudum credo lectori
suboluit, minùs adverti solere discrimen illud
inter *plethoram solitariam*, & eam quæ cum
lentore sanguinis conjungitur: ab *ea* quippe
menses suppressi non posse ostensum est, adeo-
que nec *Saphenæ* sectionem, quæ ad *uterina*
vasa *plethoram* auget, mensium eruptioni office-
re; in *hâc* verò quia fit ad uterum *obstructio*,
h. e. quia in vasis capillaribus lentus sanguis
subsistit, deductis uberius per *Saphenæ* aper-
tionem ad *uterum* humoribus, & effluente pau-
lò impetuosius sanguine, major fit ad vasorum
oscula viscida adhæsió; quod tamen à sectâ
Saphenâ periculum non *plethoræ*, sed *lento-*
ri potiùstribuendum est. Igitur in *hâc* solùm
plethorâ, quæ cum *lentore* conjuncta est, lo-
cum habet *Lindani* cautio. Hujusmodi *ple-*
thorâ laborabat mulier illa, cujus jam ex *Ri-*
verio deprompta est historia. Itaque ea me-
dicis rectè visa est *indicatio*, “ ut largâ phle-
“ botomiâ in brachio celebratâ imminueretur
“ *plethora* (seu si magis propriè loqui volu-
mus, ut *detractâ copiâ* sanguinis *velocitas* &
momentum augesceret) “ postea verò apertis
“ venis inferioribus sanguis ad inferiora retra-
“ heretur, præcipuè circa tempus, quo priùs
“ laborans

“ laborans purgari consueverat: ita quippe sanguis tum primâ *venæsectione*, tum *Emmenagogis*^a, quæ adhibita sunt, comminutus magis & divisus, per vasa capillaria facilè excerni poterat, si sub eruptionis tempus novum impetum à *Saphenâ* sectâ acceperit. Ratio verò, cur præstet venam in *brachio* priùs, & deinde in *malleolis* aperire, hæc esse videtur: diminutâ quippe per venam in *brachio* sectam sanguinis copiâ, augetur *velocitas*; postea verò apertâ *Saphenâ*, sanguis ad inferiora se præcipitat, & auget eam, quæ ad vasa uterina continuò increfcit, *pletthoram*; unde auctâ *pletthorâ* & *velocitate*, augetur etiam ad ipsorum latera sanguinis *momentum*:

Huic argumento longiùs immoratus sum, ut legenti innotescat, quàm lubrica & dubii plena sint præcepta in medicinâ *generalia*, nisi fluidorum indolem, & varietates eas, in quas sanguinis temperies improvisò sæpe transit, accuratè perspexerit *practicus*.

2. *Frictionum & cucurbitarum*, quæ ad *crura* adhibentur, eadem est ratio, ac institutæ in talo *phlebotomiæ*: Hæ quippe humores partim intra vasa *atterendo*, partim per poros cutaneos *educendo*, ut *velociùs* circuletur sanguis; *derivando* autem deorsum versùs, ut in uterina vasa *validiùs* impingat, efficiunt. Itaque mensibus jam erupturis, in usum vocari solent. De *scarificatione* nihil dico, cùm ea, quantum ad hanc rem attinet, tanquam *venæsectionis* species habenda sit. Etiam menses

^a Ibid.

deducunt *cruribus* inusta *cauteria*: propter *stimulum* enim & *dolorem*, majorem sanguinis affluxum versùs inferiora trahunt.

3. Quo meliùs redintegretur sanguinis impetus, instituenda est *purgatio*; quam ideo in suppressis mensibus necessariam esse scribit *Hippocrates*^a. Cùm verò *purgantium* alia in *primis viis*, alia etiam in ipso *sanguine* vires suas exerceant, videndum est, quid commodi ad sanguinem corrigendum alterutrinque redundare queat. Ea quidem, quorum actio intra *primas vias* circumscripta est, solâ *stimuli* virtute alvum subducunt; *stimulo* enim intestina ita vellicant, & in contractiones cient, ut uberius, quicquid in *Peyerii glandulis* hæret, exprimatur; unde, fæcibus effluente muco solutis, descendit alvus. Ita *catbartici stimulus*, cùm *lympham* ex glandulis copiosius evocet, facit, ut sanguis majore paulò copiâ ad intestina confluat: *Lymphâ* quippe per glandulas liberiùs effusâ, minor est ad eas partes renitentia. Sanguinis adeò renitentiâ imminutâ, increfcit aliquatenus *velocitas*. Ex hac *purgantium* classe sunt *manna*, *cassia*, *electuarius lenitivum*, cæterâque, quæ alvum *leniter* movent. Quorum tamen ferè omnis virtus in eo consistit, ut *primas vias* excrementorum onere liberent; ea quippe, quam *derivatione* istâ sanguini inducunt, mutatio ita perpufilla est, ut sensum omnem pene effugiat.

Ut igitur humorum vitio succurratur, adhibenda sunt *purgantia*, quæ non modò *stimulo*

^a *Aph. V. 36. Nat. Mul. 20.*


pollent, sed intra circulationis ambitum sese ingerunt, sanguinisque *crasin* immutant. Et hanc quidem fortioribus *catharticis* inesse vim satis manifestum est. Quippe cum in *salibus* potissimum consistere videatur medicamentorum omnium energia, *purgantia* certè, quæ *sale acri* imprimis & vivido abundant, humores vehementius agitabunt. Eorum igitur *sales*, in canales deducti, sanguinem lentum ita solvunt & distrahunt, ut minor sit particularum inter se contactus: unde uberior spirituum secretio. Ideo post fortiora *purgantia* *pulsus* semper increbrescit. Ita duplici de causâ ad menses ciendos prodest *purgatio*, tum quia *velocitatis* impetum intendit, tum quia sanguinis *compagem* ita *attenuat*, ut uterina vasa latius distendat. Hujusce familiæ sunt *cathartica* ex *aloe*, *jalappâ*, *scammonio*, *elaterio*, &c. conflata. Quibus si adjecta sit aliqua *Mercurii* præparatio, fortiùs adhuc excitabitur sanguinis impetus: nihil enim aut *lentorem* efficacius tollit, aut *vasa obstructa* citius *recludit*, quàm *Mercurius*; uti, cum de remediorum viribus dicturi sumus, plenius explicabitur. Nequa verò sit *purgantium* suspicio, id obiter notandum est, mulieres, quibus suppressa sunt menstrua, utcunque imbecilles fuerint, *catharsin* satis validam sustinere posse: præsertim si, operatione peractâ, exhibeatur *paregoricum*.

4. Alii *vomitum* in suppressis mensibus suadent: qui quidem, si *ventriculi* gratiâ instituat, plurimum prodest; *chylosin* enim restituit, & *lentori*, si non vim ejus imminuit, suppe-

tias certè præcîdit: fin ad morbi *causam* dirigatur, huic intentioni rariùs respondet. Ut-
cunque enim inter operandum sanguinis *momentum* augeat, & viscera omnia vehementi-
ùs succutiat *emeticum*, crassâ materiâ ita op-
pleti sunt *capillares uterini*, ut quocunque
impetu instructus sit sanguis, per eos nequeat
sibi viam aperire, donec attenuatis humoribus
tollatur *arteriolarum* obstructio. Ita si ad ex-
pellendos menses uti volumus *emeticis*, tum
præcipuè adhibenda sunt, cùm sanguis, vitio
licèt omni immunis, præ *vasorum duritie* ne-
queat excerni: in hoc enim casu, sanguinis im-
petus, *emeticis* excitatus, vasorum renitentiam
faciliùs pervincet.

5. Ut ad medendi scopum feliciùs perveni-
ri queat, perpetuo in usû sunt *emmenagoga*;
quæ quibus viribus sanguinis impetum instau-
rent, mox paulò distinctiùs erit differendi locus.

Investigatâ ad hunc modum tum *symptoma-
tum*, tum *remediorum* naturâ, & ad rationem
aliqualem exactâ, non fortè alienum erit sup-
pressorum mensium *historias* quasdam adjice-
re: quo pleniùs innotescat hanc de mensibus
theoriam non domi esse fictam & concinna-
tam, sed *experientiæ*, unde deducta est, con-
sentire. In quibus etsi multa fortè desiderari
possint, id lectori spondeo in meque recipio,
nusquam iis deesse, quæ *historiam* imprimis
commendare debet, *fidem*.



Historia I.

Oct. 26. 1700.

PUella quædam, octodecim annos nata, & mensium adhuc experts, de acri circa lumbos, genua, & malleolos dolore querebatur. Laborabat etiam dyspnœâ, nausêâ, & torminibus ventriculi. Deambulatione quamvis lenissimâ palpitabat cor. Color faciei floridus. Pulsus debilis, & tardus. Hæc ferè à sex mensibus graviter invaluerant symptomata; quæ quoniam à sanguine *lentescente*, uti *pulsus* admonuit, proficisci existimabam, hanc morbi *indicationem* esse arbitratus sum, ut *attenuaretur sanguinis compages*: ita enim velocitate auctâ, momento latis valido instrui posse videbatur sanguis, quo uterina vasa perumperet. Hoc igitur ut efficerem, methodo sequenti usus sum. Et primo quidem *catharticum* adhibui, quod humorum cohærentiam tolleret, & faciliorem per *vasa capillaria* transitum sanguini conciliaret.

R. Calomelan. \mathfrak{D} i.

Resin. Jalap. gr. 5.

Tartar. Vit. gr. 4. M. F. Pulv. Cap.

manè in Conserv. Ros. unde *dejectiones* tantùm binæ: à quibus tamen aliquod doloris levamen sensit.

Neque ideo de hâc *pulveris*, quem præscripsimus, efficacîâ dubitet quispiam, quòd parciùs

ciùs mota fuerit *alvus*: quippe ex *dejectionum* numero malè judicantur *cathartorum* vires, uti in *mercurialibus* præsertim sæpius comperi: quæ utcunque alvum aliquando minùs subducant, non tamen medici consilium fallunt. Ea enim præcipua est, in hujusmodi saltem casu, *purgandi intentio*, ut sanguinis particulæ artè minùs inter se cohæreant: id verò à purgantibus effici posse superiora satis evincunt, licèt haud ita copiosa fiat per *alvum* evacuatio. Cùm autem *alvus* à *catharticeis* subducitur, non modò quia *velocitate* auctâ major sit in glandulis humorum secretio, sed etiam quia *stimulo* irritantur intestinorum tunicæ; si stimulus iste quovis modo imminuatur, *alvus* minùs solvetur. Stimulus verò potest deficere, cùm *catharticum* omne intra *vasa lactea* traducitur: ita, cùm in ipso sanguine vires suas exercent *purgantia*, propter auctam velocitatem, copiosior solito erit in glandulis quibuscunque secretio; in *intestinalibus* tamen, quàm in cæteris, ob defectum stimuli, nequaquam uberior. Quòd si pauculæ *cathartici* particulæ in intestinis restitent, eæ stimulo suo vasa irritabunt, ut largior fiat ex glandulis intestinalibus, quàm ex reliquis, liquidi profusio: quod tamen eadem ratione per intestina minùs profluet, quâ imminuitur *stimulus*. Si verò parciùs purgatur *alvus*, reliquas secretiones augeat *catharticum*: quod cùm faciat, sanguinem æquè attenuat & expurgat, ac si secessum crebriùs moveret. Cujus rei argumentum esse potest, quòd ab his *purgantibus*, si alvum minùs subduxerint,

duxerint, rarissimè sequitur noxa. Atque hinc fortè haud ineptè deduci potest varia illa in diversis corporibus *cathartorum* efficacia, quæ hos uberius, illos rursus parcius, per *inferiora* purgant: in iis scilicet, quibus patentiora sunt *lacteorum* oscula, sive id a naturâ sive vitio aliquo provenerit, ita ut medicamentum omne in sanguinem facilè transmittant, alvus minùs movetur: in iis verò, quibus arctius coalescunt aut obstruuntur *lactea*, ita ut pars *cathartici* maxima in *intestinis* subsistat, stimulus ad tunicas validior est, & proinde crebrior alvi dejectio.

Ut verò efficacius tolleretur sanguinis *lentor*, atque invalesceret *momentum*, hæc, quæ viribus idoneis pollere docet experientia, præscripta sunt remedia.

℞. *Conserv. Absynth. Rom.* ℥ 3.

Æthiop. Min. ℥ 1.

Chalyb. cum Sulph. pp. ℥ 8.

Rad. Gentian. } *pulver. a a* ℥ 2.

Curcum. }

Syr. Garyoph. q. s. M. F. Elect. Cap. q. n. m.
ter in die hor. Med. Superb. Cochl. 5. *infusi* seq.

℞. *Limatur. Chalyb.* ℥ 18. *Infund. in cerevisiæ*
tenuis lib. 3. per triduum. Deinde add.

Rad. Gentian. incis. ℥ 8.

Rub. Tinctor.

Curcum. *a a* ℥ 2.

Summitat. Absynth. Vulg.

Centaur. min. *a a* M. 1.

Bacc. Junip. ℥ 8.

Sem. Cardamom. min.

Cubeb.

Cubeb. $\overline{a}a$ 3 1. *M.* Fiat *infus.* per diem. In colaturæ quolibet haustu cap. gt. 20. *mixtur.* seq.


R. Spir. Sal. Armon.

Elix. pp. $\overline{a}a$ 3 2.

Venæsectionem consultò omisi, tum quia evacuationem ita *celerem* puella, cùm esset imbecilla, ægrè pati poterat, tum quia *venâ sectâ* sanguinis *impetum* diminutum potiùs, quàm auctum iri verebar.

Oct. 28. *Temp. Pom.* De ventriculo minùs quæsta est. Pulsus fortior. Vires etiam multùm instauratæ.

Oct. 30. Eruperunt menses, coloris optimi. Dolor ad lumbos, & malleolos statim evanuit. Ad octo dies perstitit fluxus; eo durante, præscriptis interdictum est: quibus tamen post alteram hebdomadem repetitis, proximâ periodo rite denuo fluxerunt menses, & puella sanitati restituta est.



Historia II.

Octob. 31. 1700.

Mulier, annos ferè triginta natæ, menses à *biennio* defecerant. Quibus restrictis, ingruerat tussis arida, dyspnœa vehemens, cordis palpitatio, capitis dolor, vertigo, appetitûs remissio, ventriculi cruditas, & inflatio, aliquando vomitus, virium imbecillitas, sudores nocturni, frigoris calorisque vicissitudo, tremor; nonnunquam per Nares eru-

pit sanguis. Pulsus admodum imbecillis.

Indicationes curatoriae videbantur tres.

1. *Ut restitueretur ventriculi concoctio.*
2. *Ut sanguinis impetus fieret intensior.*
3. *Ut vasa uterina relaxarentur.* In iis enim, æquè ac in sanguine, vitium esse indicabat *narium hæmorrhagia.*

Ut doloribus & virium imbecillitati occurrerem, usus sum sequenti *cardiaco.*

R. Spir. Sal. Armon.

Tinct. Croc.

Laud. Liq. a a 3 i. M. Cap. gt. 30
sæpius in quovis vehiculo.

His dolor plurimùm sedatus est, & resectæ vires.

Nov. 2. Cepit *catharticum* in *priori historia* præscriptum; unde *sexies* descendit alvus, & remisit *dyspnœa.*

Nov. 3. Usa est *electuario* & infusione in *hist. 1.* descriptis: non neglectâ interim *mixturâ cardiacâ*, quæ non modò *dolori* profuit, sed sanguinis etiam *impetum* instauravit. Ignorant certè, quid efficere possint *opiata*, qui ea *horâ decubitûs* pro *somno* tantùm conciliando adhibent, quasi nihil emolumenti præstaret, nisi *stuporem* induceret, *papaver.* Quod si dosibus minoribus, & pro morbi ratione sæpius iteratis exhiberetur *opium*, remedio ita leni atque efficaci adjutus sanguis, iis sensim instrueretur viribus, quæ ab aliis fortè *attenuantibus* frustra poterant sperari: quam quidem methodum non modò periculo omni vacare, sed rarò infeliciter adhiberi expertus sum. *Opio*
enim

enim assumpto sanguinem comminui admodum,
& rarefcere ostendent fequentia.

Ut verò vafa faciliùs dehifcerent, *fomento*
emollita eft regio uterina.

℞ *Rad. Althæ. Lil. Alb. $\overline{a}a$ ʒ ii.*

Sem. Lin. Fænugræc. $\overline{a}a$ ʒ iii.

Fl. Chamæmel. Aneth. $\overline{a}a$ P. I. Majoran. M. i.

Bulliant ex Vin. C. Aq. part. æq.

Liquor fit pro fomentatione bis in die tepidè
applicandâ.

Nov. 8. *Pulsus* paulò validior; in *sympto-*
matis nulla ferè mutatio.

Nov. 15. Nihil novi, nifi quòd redire videre-
tur *appetitus*, & evanefceret *nocturnus fudor*.

Nov. 22. Profluxit ex utero humor *subal-*
bidus, qui post *quinque dies* tandem fubftitit.
Humorem hunc, utcunque albefcentem, men-
fium nomine infigniri debere arbitror, tum
quia ad folenne ferè tempus duravit, nullif-
que adhibitis remediis fponde defuit fluxus,
tum quia factâ hâc evacuatione omnia in me-
lius mutata funt *fympptomata*: quæ, fi *fluor*
Albus fuiffet, potiùs exacerbefcerent De
menfibus etiam *pallidis* frequens eft apud Au-
thores mentio.

Dec. 1. *Sympptomata*, etfi multò mitiora,
nondum tamen fublata funt. Præfcriptum eft
Catharticum, quod erat hujufmodi.

℞ *Pil. Ruff. ʒß.*

Resin. Jalap. gr. 3.

Ol. Saffafr. gt. i.

Bals. Peruv. q. f. M. F. Pil. Mediocr.

Rediit etiam ad *Electuarii*, *infusi*, & *mix-*

turæ usum; quibus rite assumptis, *pulsus* fortius increbuit, & refocillatæ sunt *vires*.

Dec. 19. Deducti sunt menses colore satis rubicundo, qui ad *triduum* fluxerunt. His erumpentibus ita sublevata sunt symptomata, ut solum de exigua quâdam spirandi molestiâ, & capitis dolore quereretur. Infusione verò repetitâ, post exactum mensem, rediit cum *Catameniiis* sanitas.



Historia III.

Virgo quædam Lotrix, temperamenti sanguinei, Annos 24 nata, dum Menses fluerent, inter lavandum, frigus suscepit: crura etiam frigidâ perluebat. Ita ante tempus consuetum subito restricti menses, anni integri decursu penitus substiterunt, citra tamen insigne aliquod sanitatis dispendium: quod inde proficisci puto, quoniam laboribus & exercitiis multum assueverit. Anno autem elapso, hæc tandem ingruiebant symptomata, corporis gravitas & imbecillitas, ventriculi concoctio læsa, membrorum pene omnium dolor, tussis, dyspnœa, pallor: intumesciebant etiam crura; in tibiâ adeò durus excrevit tumor, ut nullis *cataplasmatibus* & *emplastris* molliri, aut suppurari potuerit. Pulsus languidus, & fegnis.

Indicationes curatoria eadem prorsus, ac in *historiâ secundâ*.

Ad

Ad tumorem autem leniendum, instituta est
Oct. 20. 1702. in brachio *venæsectio*: quæ ta-
men voto parum respondit. Igitur ut tumo-
ri, & mensium suppressioni simul prospicerem,
Oct. 22. adhibui *pilulas purgantes*.

℞ *Pil. Coch. maj.* ʒ℥.

Calomel. ʒi.

Resin. Jalap. gr. 6.

Syr. è Chalyb. q. s. M. F. Pil.

Eo die alvus ne semel quidem mota est; mane
autem postero, *bis* largâ satis copiâ dejecit.

Oct. 23. Adhuc parum levaminis persensit.
Itaque ut sanguinis *momentum* excitaretur, data
est sequens *infusio*.

℞ *Limatur. Chalyb.* ʒi℥.

Rad. Zedoar. ʒi.

Fol. Absinth.

Centaur. Min. a a M. i. Infund. te-
pidè in cerevisiæ tenuis lib. 3. per biduum. Co-
laturæ add.

Tinct. Croc. ʒ2. Cap. haustum ter in die.

Usa est etiam *fomento* in *hist.* 2 descripto.

Oct. 28. Levata est paululùm virium imbe-
cillitas: cætera nihil remisere symptomata.
Repetito autem *Cathartico*, mitescebat tumor.

Nov. 6. Cum viribus increvit pulsus. Ita-
que sanguine ad hunc modum vividius cir-
cumactò, ut in vasa uterina impetu fortiore
impingeret, adeoque menses provocaret, secta
est *Saphæna*.

Nov. 11. Menses, quamvis haud ita ubere
copiâ, fluxere. Rediit virgini color floridus,
evanuitque cum cæteris symptomatis tumor.



Historia IV.

Dec. 2.

Mulier boni habitûs, cui, per annos quatuor aut ultra, *bimestri periodo* redierant menses, de sanitate amissâ graviter querebatur. Eam quippe vexabat fitis continua, frequens oscitatio, dyspnœa, ad interiora frigoris sensus, ventriculi aliquando & intestinorum tormina, capitis dolor acerrimus, lassitudo & languor, ad dorsum, genua, & brachia dolor satis vehemens, tumor verò nullus; cordis palpitatio, quæ cum isto circa articulos dolore à *sex mensibus* increverat. Pulsus tardus, debilis, & inæqualis. Venâ sectâ exiit sanguis pallidus admodum, & aquosus.

Intentio igitur medendi præcipua ea esse visa est, ut canalibus reclusis & expurgatis, sua sanguini restitueretur crasis, & usitatis periodis excitaretur fluxus menstruus. Deinde etiam *Symptomatis levandis* aliqua impendi debuit cura.

Ut canales à lentis humoribus liberarentur, adhibita est purgatio.

℞ *Pil. Stomach. cum Gum.*

Succin. a a ̄ 1.

Calomelan. gr. 16.

Resin. Jalap. gr. 5.

Castor. gr. 2.

Syr. è. Spin. Cerv. q. s. M. F. Pil. 5.

intra quatrimum ad quatuor vices repetend.

Ad

Ad sanguinem porrò excitandum, ita ut velociùs circulari, rectiùsque commisceri posset, præscripsi sequentia.

℞ *Conserv. Fumar.* ℥ 2.

Æthiop. Miner. ℥ 1.

Syr. è Bacc. Samb. q. s. M. F. Elect.

de quo cap. q. n. c. bis in die superbib. *Cochl.* 5. *Tinct.* seq.

℞. *Tinctur. Chalyb. Lower. lib. 2.* cui add.

Tinctur. Castor. ℥ 1.

Symptomatis relevandis sic prospexi. Ad dolores scilicet sedandos dedi *Paregoricum*

℞. *Aq. Paralys.*

Cinnamom. Hordeat. a a ℥ 3.

Diacodii. ℥ 4.

Laud. Liq. gt. 100. Cap. Coch. 6.

hor. decub. etiam & interdiu, quoties atrociùs sævierit dolor.

Pro viribus reficiendis cap. sæpiùs *Sal. Volat. Oleos. gt. 30 in Vin. Canarin. & Aq. part. equal.*

Ingruente *Oscitatione* cap. 40. vel. 50. *Tinct. Castor.*

Ut pacaretur denique *capitis dolor*, *vesicatorium* largum *nuchæ* applicatum est.

Cùm *ventriculi* tormina graviùs invalescerent, hujusmodi potum usurpavit.

℞. *Rad. Gentian. incis.* ℥ 1.

Fl. Chamæmel.

Summit. Marrhub.


Centaur. Min.

Absinth. Vulg. a a M. 1.

Sabin. M. s. Coq. in Aq. Font.

lib. 4. ad consumpt. lib. 1. colatura fit pro potu communi.

Morbi historiam, quia rure vixit mulier, per singulos dies haud ita accuratè persecutus sum. His tamen usâ remediis, plurimùm sublevata est, & vires ita recuperavit, ut post dierum 45 intervallum redirent menses; quibus rite fluentibus, remiserunt symptomata. Iteratis denuo *electuario* & *infusione*, fluxus intra dies triginta quinque redintegratus est, qui quidem ægrotæ multùm profuit. Eâdem mendi methodo adhibitâ, idem fuit proximæ periodi intervallum. Deinde ut integrâ valetudine frueretur, ad *aquas Astropenses* amandata est: quorum usu tandem ad consuetas periodos reducti menses, mulierem ægritudine omni liberabant.



Historia V.

Feb. 28. 1702.

Mulier quadragenaria, & paulò quàm par erat habitior, novem abhinc mensibus, tussi fortè laborans, venam secuit: *Setâ venâ* menses, quibus ea semper parciùs purgata est, ad *duas*, quæ infecutæ sunt, *periodos* penitus substituerunt. Postea verò statis temporibus regressi, imminutâ admodum copiâ, effluerunt. Ita cùm minor solito esset evacuatio menstrua, adversâ valetudine usâ est, præsertim à *tribus* proximè elapsis mensibus. Symptomata, cùm curæ meæ se commisit, ita se

se habebant. Sæviit in universo corpore dōlor acerrimus, tumore quodam comitatus: remittente dolore, ita tenera erat cutis, ut tactum refugeret. Maximè verò quæsta est de abdomine: in intestinis quippe sensit tormina quasi colica, in ventriculo gravitatem, inflationem, & nauseam; ita ut pituitosa sæpius evoemeret. Ad coxendicem fixus quidam decubuit dolor. Virium ea fuit imbecillitas, ut à motu quamvis lenissimo abhorreret. In hypochondriis sæpius exorta sunt tubercula, per vices rursus evanescentia. Urinæ, uti & coloris, nullum vitium. Pulsus piger, & debilis. Hebdomade proximè prægressâ, accessit menstrua periodus; guttis verò pauculis demissis, substitit fluxus.

Hujusce morbi *duplex* potissimùm fuit *indicatio*.

I. Nempe, ut sedarentur, quibus graviter conflictata est mulier, symptomata.

II. Ut, pacatâ quodammodo symptomatum ferociâ, ad legitimam normam redigeretur fluxus menstruus.

Primæ igitur intentioni ut satisfacerem, quia præcipuè affecta est *regio epigastrica*, *emplastrum* suasi, quod humores resolveret, & doloris vehementiam sopiret.

℞. *Emplastr. Hyster.*

de Galban. ā ā q. s.

Opii, Camphoræ ā ā ʒ 2. M.F. Emplastr.
largum abdomini applicand.

Adjeci *opium* & *camphoram*, ut in vasa abdominis penitus se ingereret *emplastri* virtus; horum

horum quippe particulæ, cùm tenues admodum & subtiles sint, penetrandi vi maximâ pollent. Hæc *emplastris* suis admiscuit, vir in *pharmacis concinnandis* non felix minùs quàm elegans *Batéus*, cùm humores vellet discutere^a: cujus quidem methodi, uti eo primùm authore usum aggressus sum, ita miram sæpius comperi efficaciam.

Hoc igitur *emplastro* sub noctem adhibito, post aliquot horas vehementer incalescebat mulier, & humorum quandam quasi inter se luctam sibi visa est sentire: postero verò mane, prorsus evanuit in abdomine dolor, & dissipata sunt tubercula. Cujus rei ratio explicatu parum difficilis est. *Ingredientium* quippe, *camphoræ* præsertim & *opii*, particulæ, tenuitate suâ intra vasorum poros se insinuant; ibique lentis humoribus, quorum vitio oriuntur dolores & tubercula, commixtæ, eos ita incidunt & exagitant, ut sanguinis globuli non ultrà ad oscula arteriolarum hæreant, sed jam in minima divisi, vel in *venas* trajici queant, vel *perspiratione* foras extrudi. Ita penetrans reperitur *opii* & *camphoræ* vis, ut nullum ferè sit (si *cantharidas* excipias) remedium, quod, *externè* adhibitum, *cutim* promptius pertransit, & viam sibi in sanguinem aperit: adeò parum se ostendit ignava illa & frigida qualitas, quam iis plerique solent affingere.

Mart. 1. Ut ventriculi & intestinorum aliqua haberetur cura, data est in *Aq. Bathon.* lib. 2. *Sal. Epsom.* 31. quæ saburram in *primis vi-*

^a Vide *Emplastr. Camphor. & Podagr.*

is hærescentem per alvum abduxit. Noctu somnus longior solito, & pacatior.

Mart. 2. Visa est sibi aliquantò vividior; & de membrorum doloribus minùs querebatur.

Igitur cùm *secundæ*, quam retulimus, *intentioni* locus esse videretur, præscripta sunt ea, quæ sanguinis impetum ita fuscitare poterant, ut usitata per *uterum* efflueret sanguinis mensura.

℞. *Æthiop.* Min. ℥ 1. Cap. 3 in *Syr.* *Viol.* bis in die superb. Coch 6. *Decoct.* seq.

℞. *Cortic. Peruv.*

Rad. Gentian. $\overline{a}a$ ℥ 5.

Sem. Cardamom.

Cubeb. $\overline{a}a$ ℥ 2.

Bacc. Juniper. ℥ 1. Coq. in Aq. Font. lib. 3. ad consumpt. lib. 1. add. sub finem decoctionis *Vin. Alb.* lib. 1. Colaturæ add.

Tinct. Castor.

Mart. Mynsichtb. $\overline{a}a$ ℥ 1.

Mart. 4. Meliùs se habuit, quanquam aliquando ad breve tempus recrudesceret *dolor*. Horâ decubitûs, quoniam somnus ultimis noctibus parcior fuerat, assumptum est *hypnoticum*.

℞. *Tinct. Croc.*

Laud. Liq. Sydenh. $\overline{a}a$ ℥ 1. Cepit gt. 40. ex *Ther. Venet.* quas & singulis noctibus repetiit. Unde semper placidus successit somnus, & mane virium refectio.

Mart. 6. Pulsus multò validior. Adhuc subinde rediit ventriculi nausea, interdum etiam & vomitus. Igitur ad humores ex *pri-*
mis

mis viis educendos, iterum adhibitæ sunt *aquæ purgantes*.

Mart. 7. Indies auctæ sunt vires, & pulsus fortior increbuit. Hausto *decocto* multum incaluit. Doloris nulla vestigia. Ventriculi inflatio nulla: quanquam sæpe adhuc per vices rediret *nausea*. Ab ambulatione vix ulla ferè lassitudo.

Mart. 8. Repetitæ sunt *aquæ purgantes*, non modò ut *sordibus* liberentur *primæ viæ* sed ut *tenuior* fiat sanguinis compages. His tamen cùm *nausea* & vomitus parum cesserint, *Mart. 9.* ad *emetica* confugi; quibus antea, dum vires admodum languescerent, abstinentum duxi. Adhibitis igitur *Sal. Vitriol. 32.* multum crassæ & viscidæ materiæ excrevit ventriculus; quâ ita foras ejectâ, nullam fere molestiam sensit.

Mart. 11. Igitur ut *utrique indicationi* ulterius prospectum sit, præscripsi, uti in *historiâ 3, catharticum*, quod & *primas vias*, & ipsum *sanguinem* purgaret, Unde *sexies* descendit alvus, & ventriculus ita deterfus est, ut, quicquid alimenti susceperit, retinere posset.

Mart. 13. Vires ferè in totum instauratæ sunt. Pulsus quotidie validior. Ad *coxas* aliquando accessit subitus quidam doloris insultus, qui tamen brevi evanuit.

Mart. 15. Repetitum est *catharticum*, deinde etiam *pulvis*, & *decoctum*.

Ap. 2. Nulla, nisi de gravitate quâdam circa ventriculum, querimonia.

Ap. 10. Menses majore copiâ, quàm ab annis

nis quatuor aut quinque consueverant, fluxerunt: quibus ad *quatriduum* demissis, subscidit omnis illa ventriculi gravitas.



Historia VI.

Oct. 20. 1702.

MUlieri annos 25. natæ & viro nuptæ, menses per annum ferè minore copiâ fluxerant; à tribus verò, quæ proximè antegressæ sunt, periodis penitus substituerant: unde venarum omnium tumor, dorsi & capitis dolor acerrimus, ventriculi nausea, & appetitûs languor, globi quasi in gutture ascensus, virium maxima debilitas, dyspnœa vehemens; de quo quidem symptomate acerbius, quàm de cæteris, quæsta est. Color haud multùm vitiat; erat enim mulier temperamenti sanguinei. Pulsus plenus, & debilis. Aniculæ, quæ juxta habitabant, omnes uno ore clamitant eam *utero* gestare: quod ut minùs crederem, his potissimùm argumentis inductus sum.

1. Quia *cibi fastidium* perpetuò ad tertium mensem, & ultra indies increbuit; quod tamen gravidæ sub *initium* magis infestare solet, *tertio* verò mense paulatim evanescere.

2. Quia *capitis dolor* continuus, & gravis *spirandi* molestia, in deterius ibant; quæ quidem symptomata, cùm ultra modum exacerbescant, menstruæ suppressioni potiùs, quàm *graviditati* congruere videntur.

3. Quia in ventre nec *motum* ullum, nec *tumorem* persensit; quorum tamen alteruter saltem, si in utero sit infans, elapso *tertio* mense percipi solet.

Igitur in curandis symptomatis, quæ à *morbosâ* mensium suppressione oriri arbitratus sum, id unicè agendum videbatur, ut suus sanguini restitueretur *impetus*.

Quoniam verò *venæsectionem* indicabat *pulsus plenitudo*, sanguis ad $\frac{3}{4}$ 12 missus est.

Feb. 21. \mathcal{R} . *Mercur. dulc.* \mathfrak{D} 1.

Resin. Scammon. gr. 6. *M.*

Unde *decies* subducta est alvus, & nausæa minus laborabat ventriculus.

Diebus à purgatione liberis, usa est pilulis sequentibus.

\mathcal{R} . *Chalyb. cum Sulph. pp.* $\frac{3}{4}$ 2.

Rad. Gentian.

Aristoloch. Rotund. a a $\frac{3}{4}$ 15.

Castor.

Pulv. Ari. comp. a a $\frac{3}{4}$ 1.

Extract. Absinth. q. s. M. F. Pil. medicocr. cap. 4. bis in die, superb. haustum cerevisiæ tenuis, in cujus lib. 3. incoq.

Limatur. Chalyb. $\frac{3}{4}$ 1.

Rad. Rub. Tinctur.

Curcum. a a $\frac{3}{4}$ 3.

Bacc. Juniper. $\frac{3}{4}$ 15.

Sabin. M. 1. In quolibet haustu cap. *Tinctur. Croc. gt.* 15.

Febr. 28. Nulla ferè in symptomatis mutatio. Pulsus tamen multò fortior. Repetitum est

est itaque *catharticum*, unde ad duos aut tres dies plurimum levata est.

Mart. 6. Cùm vix quicquam levaminis sentiret, *tertiò* adhibita est *purgatio*.

Mart. 12. Mitescebat aliquantulum *capitis dolor*, & *dyspnæa*.

Post *infusionem* repetitam, *Apr. 8.* menses, quanquam exiguâ nimis copiâ, fluxerunt: quibus erumpentibus, evanuit ea, quam hætenus secum tacitè foverat, graviditatis suspicio.

Restitutis mensibus, rediit simul valetudo; nisi quòd ad motum & laborem, si paulò diuturnior fuerit, rediret subinde *dyspnæa*.



C A P. XII.

De symptomatis, quæ à mensium fluxu immodico oriuntur.

ALterum uterini fluxûs vitium est, *nimia sanguinis profusio*; quæ duobus modis accidere solet, cùm vel statis periodis nimis copiosè erumpat sanguis, vel periodi frequenter nimis recurrant. Hic quidem morbus inter mulieres haud æquè familiaris est, ac *suppressio*; paucioribus etiam stipatur *symptomatis*: quæ tamen uti *numero* deficiunt, ita vehementiâ suâ invalescunt, ut gravius multò sit à mensibus ultra modum *fluentibus*, quàm *retentis* periculum. Sanguinis enim *defectus* difficiliùs refarcitur, quàm detrahitur *copia*; uti &
obesis

obesis corporis habitudo faciliùs deteri solet, quàm apponi *macilentis*. *Solidæ* quippe partes, si paulò laxiùs distendantur, diminutâ fluidi copiâ, tonum satis promptè recolligunt: sin præ fluidi inopiâ arctiùs semel coalescant, quomodocunque humida & mollientia adhibueris, meatus obthurati non nisi ægrè admodum recluduntur.

Mensibus adeò immodicè profluentibus insequi solent, *virium imbecillitas, cordis anxietas, syncope, extremorum frigus, pallor, convulsio, suffocatio*; quæ quidem, *recente* adhuc morbo, sese exerunt symptomata: *inveterascente* profluvio etiam hæc tandem accrescunt, *tumores, cachexia, hydrops, fluor albus, febris hectica, atrophia*. Atque hic quidem morbus uti suppressioni menstruæ est contrarius, ita ea, quæ foeminis infert, symptomata contrariam prorsus agnoscunt causam, sanguinis scilicet *inopiam*.

Sanguine enim liberè nimis profuso, multum istius liquidi unâ effluit, quod in spirituum animalium suppetias cedere debuit: unde promptuario exhausto, parciùs in nervos traducuntur spiritus; quibus adeò imminutis, languescunt, quæ à spirituum copiâ derivantur, *vires*. Atque hæc quidem decrescunt in *ratione* sanguinis diminuti *triplicatâ*: cùm enim ad motum muscularem requiratur *liquidi nervosi, fibrarum muscularium*, & ipsius demum *sanguinis* unita actio, satis patet musculorum vires sive animalis *robur* esse in proportionem horum trium *compositâ*: quæ cùm à massâ sanguineâ

guineâ ita pendeant, ut ei semper proportionalis sit ipsorum quantitas, erunt *vires* in ratione sanguinis *triplicatâ*; uti demonstravit *D. Cheyneus*^a. Si igitur mensium fluxu immodico profundatur pars sanguinis *dimidia*, virium $\frac{2}{3}$ deperdet mulier. Hinc & ratio elucet diversi istius effectûs, qui dissimiles inter se evacuationes sequi solet: ab *ingentibus* scilicet & subitis, propter sanguinem exhaustum, labefactantur admodum *vires*; eædem satis constant, si *lentè* & *gradatim* peragatur evacuatio, uti in *Diaphoresi*, *Diuresi* &c. fit.

Deficiente ad hunc modum satis ubere spirituum copiâ, *cor*, siqua alia corporis pars, propter assidua in propellendo sanguine virium dispendia, brevi deficiet: spiritibus enim destitutum, minorem multò sanguinis molem foras pellit; qui ideo in *ventriculis* ejus diutius subsistens, laboris quendam & *anxietatis* sensum ad *præcordia* inducit. Quòd si exhaustis spiritibus ita tandem deficiat *cordis* robur, ut sanguinis ponderi prorsus impar sit, suspendetur contractio, & cessante sanguinis motu succedet *animi deliquium*; donec *cor* iis spirituum supplementis instructum fuerit, ut sanguinis momento præpollens, *circuitum* denuo integrare valeat.

Vacillante porrò *cordis* motu, debilius erit sanguinis *momentum*: tum quia mensibus profluentibus detrahitur *copia*, tum quia, corde vim suam imbecilliùs exerente, minuitur etiam *velocitas*. Igitur cùm languescat admodum

^a De Hæticâ.

sanguinis jam in arterias protrusi *momentum*, haud ita facilè pervincet eam, quæ ab arteriarum tunicis, & præcedente sanguine continuò oritur, renitentiam. Saltem cùm ad minutiora vasa devenerit sanguis, motu adeò languido feretur, ut tenaciùs inter se cohæreant particulæ: quàm quæ per *capillarium* orificia satis expeditè traduci queant: ita ad *extremities* vasorum aut subsistet penitus, aut segniter admodum perlabetur sanguis: cujus impetu ad hunc modum fracto & debilitato, in *extremis* orietur *frigus*, in *facie pallor*. Potest etiam non à *lentore* modò, sed ex ipso sanguinis *defectu* derivari *extremorum frigus*; *calor* quippe partis cujuscunque, est ut *causa*, quæ ipsum producit: ea verò *causa* nihil aliud est, nisi ipse *sanguis* calidus ad partes perveniens: ideoque, si ex defectu sanguinis *extrema* corporis aut parciùs aut non omnino irrigantur, necesse est, ut in iis sentiatur *frigus*. Eodem modo & *pallor in facie*, ob copiam sanguinis deficientem, orietur; certum enim est *puellas*, quò magis sanguine rite circumactò abundant, eò intensiùs *rubescere*.

Convulsio, uti mensibus suppressis à *repletione* proficiscitur, ita iisdem immodicè profluentibus, ab *inanitione*, quæ apud *Hippocratem* est altera *convulsionis* causa, deduci potest. Si enim in musculum quemvis derivetur liquidi copia minor, quàm in oppositum, orietur musculi oppositi contractio, uti ex iis, quæ de *convulsione* paulò ante diximus, patebit. Ita si musculos *laryngis* & *æsophagi* corripit

spasmus,

Spasmus, suffocationem quandam patietur foemina: quam tum maximè in mulieribus reperiri scribit *Hippocrates*^a, cum menses supra modum profluxerint. Idem quoque hanc, quæ immodicis^b mensibus supervenit, *convulsionem periculosam* pronuntiat: quia, cum hoc semel accesserit symptoma, signum est plus sanguinis effluxisse, quàm quod vires corporis citra noxam pati queant: ita ut solidarum partium tono vehementer labefactato, vix ulla salutis spes superfit.

Hæc quidem, quibus hætenus immorati sumus, symptomata, non tantum à mensibus immodicis sequi solent, sed à quocunque ferè *nimio* sanguinis^c, sive id naturâ, sive arte fiat, profluvio.

Imminuta verò evacuatione nimia sanguinis copia *qualitatem* etiam vitiabit, inferetque *cachexiam*. Quippe tum demum rite temperatur sanguis, & sua corpori constat *sanitas*, cum legitima fiat humorum omnium, qui discerni debent, *secretio*: ea verò debitè peragi non potest, nisi intra certos limites constiterit *velocitas*. Datis quippe vasorum *orificiis*, in ratione *velocitatis* est secretio. Cum itaque profusis mensibus, propter spirituum inopiam, cordis contractio, adeoque fluidi circulantis *velocitas*, remittatur admodum & languescat, minùs debita erit particularum *secretio*; ita multi intra vasa retinentur, quos eliminari oportuit, humores; *crasique* naturalem amittit

^a *Morb. Mul.* I. 16. ^b *Aph.* 5. 56. ^c *Vid. Willis. & Bel- lin. passim.*

sanguis. Hanc sanguinis *cachexiam* multum promovet *chylus* in *primis viis* minus rite elaboratus: spiritibus enim imminutis, defunt *ventriculo & intestinis* vires, ita ut alimentum non satis validè comminuere queant: quod cum imperfectiùs conteritur, in sanguinis naturam difficiliùs migrat.

Nec *cachexia* solum à *chylo* minus comminuto, sed *lentor* etiam succedet: qui tamen, quamvis nullum in *chylo* fuerit vitium, à velocitate sanguinis imminutâ orietur. Cum enim segniùs moveatur sanguis, deficit illa particularum attritio, quæ cohærentiam prohibet: ita, cum minor sit globulorum in se invicem actio, facilius erit unio, & compages densior. Sanguine adeò ad *lentorem* perducto, & canalium fibris propter spirituum defectum debilitatis & penè flaccescentibus, orientur *tumores* simili prorsus modo, ac in *suppressione menstrua* explicatum est: quia, cum eadem utrobique sit causa, eundem etiam effectum potest producere: aliquando etiam succedet *hydrops*. Quanquam *hydrops* quidem mensium *suppressorum* comes frequentior sit, *redundantium* verò *hectica*.

Hectica rationem nuper exposuit vir^a in *theoriâ medicâ* versatissimus, ejusque symptomata à canalibus *secretoriis* supra modum *dilatatis* haud absurdè deduxit: hanc igitur *hectica* causam nos non discutiemus denuo, sed pro certâ atque concessâ habebimus; ostensuri tantum, quomodo à mensibus immodicis

^a *Theory of Fevers.*

hujusmodi succedat *canalium distensio*. Et ea quidem duobus potissimum modis efficitur. 1. Mensibus nimium profluentibus, uti deficit quod in corpore detineri debet *fluidum*, ita *solidæ* etiam partes sensim abolefcunt: pabulo enim suo defraudatæ, à mole pristinâ multum recedunt contractioresque fiunt, ita ut canales, quos undiquaque ambiunt, minus jam premere & constringere queant: remoto igitur hoc ad latera canalium obstaculo, sanguis intus decurrens fortiore impetu in fibras arietat, quas proinde facilius distrahit; unde major *vasorum amplitudo*. 2. Vasa laxius explicari patitur *tonus* fibrarum *labefactus*. Sanguine enim evacuatione nimiam exhausto, deficiunt tandem spiritus, qui fibras canalium *contractiles* vividè satis animent, ut motum *tonicum* exercean, & debitâ vi in sanguinem circumstantem reciprocè nitantur: viribus adeò fibrarum imminutis, sanguini impingenti cum imbecillius resistent canales, ipsius momento cedunt, & spatium *amplius* largiuntur. Sequetur etiam *hectica*, si, immutatâ *canalium* amplitudine, minuatur certâ ratione sanguinis *copia*; *humorum* enim respectu nimis *spatiosi* sunt *canales*: unde eadem oriuntur symptomata, ac si, cum nulla esset in *sanguine* molis mutatio, revera ampliaretur *vasorum* capacitas. Quippe si, sanguinis quantitate dimidio imminutâ, eadem ac olim fuerint vasorum orificia, idem est, ac si consueta sanguinis quantitas in vasis circuletur, vasa verò dimidio ampliora fiant. Cum verò spiritus, quibus fibrarum

tonus conservatur, eâdem proportione ac sanguis deficient, erit *toni diminutio* in ratione fluidi imminuti *duplicatâ*. Ita, cùm utraque concurrat causa, *canalium* nempe *laxitas*, *sanguinisque imminutio*, graviùs invalescet, in eâdem scilicet ratione, *febris hectica*.

Ad hunc modum nascetur *hectica*, si canalium omnium, *cutaneorum* præsertim, labascat *tonus*; si vasa *secretoria* in particulari aliquo viscere *tonum* amiserint, *hecticæ* producendæ licèt impar sit ista meatuum ampliatio, id efficiet tamen, ut per eos fiat uberior liquidi secretio: quæ datâ sanguinis *velocitate*, est in ratione *orificii*. Ita si *uteri tonus* vacillet, *glandularum*, quæ internæ ipsius tunicæ interferuntur, adeò dehiscunt oscula, ut lympham suam in *uterum* copiosius effundant: eâ verò continuò foras stillante, orietur morbus ille, qui appellatur *fluor albus*: quo semper ferè laborant eæ, quas mensium fluxus nimius exhaust.

Succedit tandem *atrophia*, quia tum deficit, qui in corporis nutrimentum cedat, *sanguis*, tum *chylus* propter ventriculi imbecillitatem minùs rite comminutus est, tum denique quia ita debilitatur sanguinis *momentum*, ut non ictu satis valido succum *nutritium* in solidarum partium poros impellere atque adigere queat: ita impetu sanguinis infractò, coalescunt penitus & occluduntur, qui nutrimentum excipere solent, meatus. *Nutritio* quippe nihil aliud est, quàm succi alicujus *appositio*, sive perpetua in fibrarum poros alimenti successio.

Hoc

Hoc nimio mensium profluvio non æquè laborant omnes: *Virginibus* enim, uti frequentius multò restricti sunt, ita rariùs immodicè fluunt menses: in iis nempe, propter valà *constrictiora*, non ita facilis sanguini patet exitus, ac in *puerperium* expertis.



C A P. XIII.

*De methodo in fluxu mensium immodico
Therapeuticâ.*

HUjusce morbi curatio pro ratione causarum diversa est; *duplici* enim modo provocatur fluxus immodicus, nempe vel *vasorum*, vel *sanguinis* vitio. *Vasa* quippe in vitio sunt, cùm flaccescunt nimium, & dehiscunt, h. e. cum ipsorum *fibræ* ita laxè inter se cohærent, ut sanguinis *momento* cedant: *sanguis* verò, cùm ita *redundans*, aut *tenuis* sit, aut rapidè circumactus, ut intra vasa uberius feratur.

Id verò semper advertendum est, fluxûs immodici *judicium* fieri debere, collatione habitâ ad priores circuitus, ad incommoda, ad victum præcedentem, ad sanguinis statum: *nimios* verò esse menses præ cæteris signis indicat *virium imbecillitas*, ita ut virium regulâ unicè metienda sit fluxûs redundantia. Quippe, quibus *diu substiterint*, vel ipsi menses, vel evacuationes aliæ solennes, in iis longiùs citra noxam durat fluxus; ideo *critica eruptio*,

quamvis diuturnior sit, nunquam subito sistenda est. Pariter *mollibus* foeminis & *aquosis*, *otiosis* etiam & *viçtui indulgentibus*, diutiùs fluunt menstrua; quia in his omnibus uberior sit, quæ fluxum temperat, *plethora*. Igitur eas, quibus *sanguis aquosus*, & *habitus succulentus* fuerit, fluxui nimio magis obnoxias esse rectè pronuntiat *Etmullerus*^a.

I. Itaque *vasis flaccescentibus*, in eo præcipuè enitendum esse videtur, ut redintegretur, quocunque modo labefactus fuerit, *tonus*: qui quidem facilè restitui solet, si *externè* adhibeantur remedia, quæ fibras roborant, & constringunt. Hæc facilè ex *astringentium* familiâ depromi possunt, quorum sanè ratio, si operandi modum spectes, ita videtur explicanda. Scilicet cùm *astringentium* ea sit vis, ut humoribus *coagulum* quoddam inducant, quemadmodum mox probaturi sumus, particulæ *stypticæ*, sanguini effluenti commixtæ intimiùsque unitæ, quasi *gluten* effingunt, quo coalescant, & compingantur vasorum *lacunæ*. Præter hanc *coagulandi* vim, alia etiam in *externis* remediis virtus concipi potest, quæ vasa dehiscencia restringat, *stimulis* nempe *astringentium*; qui cùm acriter fibras pungat & vellicet, *vasa* adeò irritantur, ut se validiùs contrahant, & motum quem vocant *tonicum* recolligant. Ita *urticæ* succus *naribus* admotus, *stimuli* virtute; *spiritus vitrioli*, tum *stimulando*, tum *coagulando*, hæmorrhagiam sistere videtur. Possunt etiam in usum vocari

^a Tom. I. 552.

interna remedia ; quæ tamen ad fluxum nimium, tum cùm à *sanguinis* vitio oritur, quasi jure quodam pertinere videntur.

Quòd si *vasorum tonus* ultra modum debilitatus fuerit, cohibito fluxu, *internè* adhibenda sunt remedia, quæ fibras roborant ; ne proximâ fortè periodo, cùm *sanguinis* plethorici *momentum* increverit, *vasa* adhuc imbecillia plus sanguinis, quàm par est, emitti finant. Fibras itaque maximè roborant *analeptica*, sive ea quæ nutrimentum corpori largiùs sufficiunt, & *solidarum* partium *robur* instaurant.

II. Cùm à *sanguinis* vitio ortum traxerint menses immodici, *curatio* exposcit *duo* medicamentorum genera, vel *revellentia* scilicet, vel *astringentia*.

I. Quippe *revellentia*, cùm ad partes, quæ instituitur *revulsio*, humores uberius trahant, efficiunt, ut sanguis minore impetu ad *uterum*, unde *derivatur*, profluat : ita momento fluidi debilitato, *vasa* minùs jam distenta in statum *contractilem* redeunt, & sanguinem intra latera sua coercent. Ita mensium fluxum cohibere facta in *brachio revulsio*, sive per *venæsectionem* ea fiat, sive per *frictiones*, sive per *cucurbitas* ; quas & *mammis* admoveri suadet *Hippocrates*^a. Ita si *revulsione* quâdam *naturali* excitetur sanguinis *vomit*^b, mulier profusis mensibus liberatur^b : quia sanguine tum imminuto, tum uberius sursum ducto, *vasa uterina* minùs premuntur. Hæc tamen *naturæ* methodus non ea esse videtur, quam *ar* s

^a *Aph* 5. 50. *Epid.* 2. 6.

^b *Aph.* 5. 32.

imitari debeat; *emetica* enim, cùm *abdomen* vehementer succutiant, menses promovent potius, quam restringunt. Idem de *fortioribus purgantibus*, quæ sanguinem agitant & rarefaciunt, dicendum est: possunt tamen adhiberi *mitiora*, ut subductâ alvo, aliqua, qualiscunq; ea sit, ab *utero* fiat humorum *revulsio*: quæ ideo *practici* astringentibus semper ferè præmittunt. Hisce *revellentibus* sæpe compescitur fluxus menstruus: cùm ex eo ortum duxerit, quòd sanguis, aut *redundans* fuerit, aut nimis *rapidè circumactus*.

His *revulsionum* generibus rejectis, *diaphoretica* suadet *Etmullerus*, quæ serum copiosum unà cum acrioribus salibus per cutim eliminant^a: quod tamen medendi consilium rationi parum congruere videtur. Quamvis enim copiam sanguinis imminuant *diaphoretica*, ipsius tamen compagem ita solvunt & attenuant, ut augeatur plurimùm, quæ ad vasa est, *plethora*: ita sub ipso fluxu si adhibeantur *diaphoretica*, periculum est, ne uberius prorumpant menses.

2. Ad compescendum fluxum adhibentur *astringentia*: quæ cùm *coagulum* & *lentorem* humoribus inducant, sanguinis impetum ita imminuunt & infringunt, ut *vasorum impedimentum* nequeat pervincere, uti in sequentibus fusius ostendetur. Ad fluxum sistendum aliquid fortè conferre potest & *stimulus* ille, quo pollent *astringentia*; etiam cùm *internè* adhibeantur: qui cùm fibras vasorum vellicet, ea stringere quodammodo & contrahere posse


videretur: licèt fatendum sit non magni æstimandam esse hanc, quæ à *stimulo* derivatur, *astringentium internorum* virtutem.

Astringentibus annumeranda sunt *glutinantia*, inter quæ præcipuum locum obtinent *balsamica*; quippe hæc etiam, gradu licèt remissiore, sanguinem incrassant, partiumque *crasin* compactiorem reddunt: ideo non modò sanguinis momentum imminuunt, sed & vasis dehiscientibus *gluten* quoddam affingunt. Quia verò imbecillioris efficacix sint *balsamica*, iis non nisi *post astringentia* videtur esse in *praxi* locus.

Quò verò fluxus faciliùs fissi queat, adhibenda sunt non *interna* modò, sed & *externa* etiam, quæ jam in altero fluxûs genere descripsimus, *astringentia*; tardiùs quippe succedit curatio, si dum *sanguini* temperando opera impenditur, *vasorum* conglutinatio negligatur.

Cohibito fluxu, canalibusque satis obfirmatis, si, uti plerumque fit, defecerint *vires*, ad ea confugiendum est remedia, quæ sanguinem instaurant, spirituumque copiam sufficiunt: & ea quidem non ex *officinâ* modò, sed etiam ex *culinâ* depromenda sunt. Et hîc demum locum habent ea, quæ etiam *suppressis* mensibus profunt, remedia: quod libentiùs noto, quia hoc minùs habito *temporum* discrimine, multos fortè fefellerit *materia medica*, quæ, uti ab authoribus ordinatur, in utroque mensium vitio ferè eadem est^a.

^a Blasii Mat. Med. p. 563.



Historia I.

Feb. I. 1702.

Mulier quædam post partum fluxu mensium immodico correpta est, qui ad sex annos perstitit: ultimo biennio quotidie ferè profluxit sanguis, interdum in grumos, ovi magnitudinem æquantes, concretus. Siti & summâ virium imbecillitate laborabat, nonnunquam & febricitabat. Dolor in abdomine & regione uterînâ vehemens, & continuus. Cordis anxietas, aliquando etiam syncope invasit. Pulsus digito vix percipiendus.

Intentio curatoria videbatur, ut fluxu cohibito, reficerentur, quæ admodum languescebant, *vires*.

In fluxu igitur coercendo, cùm *revellentibus* abstinendum duxerim, quia eorum usum prohibere videbantur vires supra modum imbecilles, *astringentibus* unicè confisus sum: atque ea quidem tam *internè*, quàm *externè* adhibenda curavi.

℞. *Cortic. Granat.* ʒss.

Rad. Tormentill. ʒi.

Fl. Ros. Rubr.

Balaustior. $\overline{a}a$ M. i. Coq. in *Aq. Ferrar.* lib. 3. ad Consumpt. lib. i. Colatura sit pro *fomentatione*, bis in die parti affectæ tepidè applicand.

Pro potu communi utebatur *decocto albo*, in cujus lib. 2. incoctæ sunt *cinnamomi* ʒ2.

Internè

Internè adhibita est *tinctura* illa *antiphthisica*, quam tantopere commendat *Etmullerus*^a, ex *saccharo saturni*, & *martis vitriolo* cum *sp. vin.* conflata. Hujus *tinct.* gr. 20. in *aq. plantag.* cepit sæpius in die.

Urgente dolore, vel vigiliis, sumpsit *laud. liq.* gr. 20.

Feb. 3. Substitit fluxus; qui ne postea fortè redire posset, indies adhuc usque ad *Feb. 6.* repetebatur *fomentatio*.

Restricto autem ad hunc modum profluvio, *doloris & imbecillitatis* habenda videbatur cura. Desumpsi igitur ex medicinâ *Dieteticâ* juscula & cibos boni nutrimenti, ex *pharmaceuticâ* mixturam sequentem.

℞. *Tinct. Croc.*

Laudan. Liq. Sydenh. $\overline{a}a$ 3 2.

Camphor. in Spir. Vin. 3℔. *dissolut.* 3 1. *M.* Cap. gr. 30. sexies in die in *Aq. Cinnam. Fort.* & *Hord.* $\overline{a}a$ p. æq. unde plurimum refectæ sunt vires, & remisit dolor.

Feb. 8. Ex *labiis pudendi* quasi sacculus quidam membranofus prominuit: qui tamen versus uterum ita firmiter adhæsit, ut ex *vaginâ* extrahi nequiret. Graviter insuper foetebat. Et primâ quidem fronte interna *vaginæ* tunica *procidisse* videbatur: *placentæ* quippe reliquias esse minùs suspicabar, quòd mulier se à sex annis puerperam esse negârat, Cùm verò foetoris dolorisque ratione habitâ, incideret mihi aliqua de *placentâ* suspicio, rem paulò altiùs investigandam duxi; mulieremque percunctatus sum, num post ultimum illud puerperium

^a *Schrædar. dilucidat.* p. 253.

abortum

abortum fecerit: Illa se circiter abhinc *bien-*
nio gravidam fuisse aiebat, & terrore exani-
matam, dum noctu per compita domum rever-
teretur, in viâ *abortiisse*; reversam verò non
usam esse obstetrice, quæ, utrùm aliquid in
utero relictum fuerit necne, inspiceret. Ab eo
etiam tempore *doloris* origo ducta est.

Morbo igitur sub examen hoc vocato, ea
visa est *indicatio*, ut *uteri & muscutorum ab-*
dominalium ita instauraretur vis, quæ *placen-*
tæ reliquias foras expelleret. Ad quem finem
quia plurimùm conduceret præscripta *mix-*
tura, illius gt. 40. indies sæpe assumptæ sunt:
Quo remedio ita spiritus refectioni sunt, ut

Feb. 10. Aliqua *placentæ* portiuncula foras
excluderetur, non graveolens modò, sed pla-
nè putrida.

Feb. 11. Exclusa est & altera foetore simili
portio. Deinde nulla substantiæ istius mem-
branaceæ intra *vaginam* vestigia: etiam omnis
illico sopitus est dolor.

Feb. 13. Vires ita redierunt, ut lecto, cui
per mensem ferè affixa fuerat, jam per horas
aliquot abesse posset. Nulla nisi de virium im-
becillitate, & appetitûs remissione querimonia.
Usa est indies *mixturâ*, unde semper se pluri-
mùm levare sensit.

Feb. 17. Rediit fluxus: quem, quoniam
mediocrem valde & nullo gravi symptomate
stipatum esse conspexerim, nolui compescere;
videbatur enim evacuatio mensium *naturalis*,
& ordinaria: quæ itaque *quatrIduo* termina-
ta est.

Feb.

Feb. 23. Ut viribus ulteriùs prospectum sit, præscripta sunt sequentia.

R. *Tinctur. Cortic. Peruv. (in Vin. Alb.)*
lib. i. ℞.

Tinct. Croc.

Spec. Diamb. a a 3℞. M. Cap.
Coch 6. ter. in die.

Feb. 25. Appetitus ad se rediit. Nihil nisi virium robur sanitati defuit; quod etiam, *decocto* ad duas vices repetito, intra mensem feliciter instauratum est.



Historia II.

Sept. 10. 1701.

Mulier pleni habitûs, & mensibus paulò copiosius purgari solita, ab exercitio immodico in fluxum nimium incidit; ita ut primò quidem ad *sex*, deinde ad *duodecim* dies largâ copiâ demitterentur menses. Hoc malo cum per æstatem omnem laborâisset, vires admodum dejectæ sunt: invasit sæpe syncope, & spasmus; intumescebant pedes. Facies penè hippocratica. Sanguis tenuis valdè, non guttatim, sed continuo quasi flumine profluxit. Cum eam primò inviserem, quatrIduo jam perstiterat fluxus.

Postulabat igitur morbi *indicatio*, ut quamprimum cohiberetur profluvium. Hoc ut effici posset, adhibita est, uti in *histor. i*, *fomentatio*.

Horâ decubitûs, usa est *hypnotico* sequenti.
℞. *Tro-*

℞. *Trochisc. Gordon.* ʒ℥.

Laudan. Londin. gr. 2.

Mucilag. Gum. Arab. q. s. M. F. Pil.
exiguæ. Cap. 3. quibus assumptis, fatis placidè
dormiebat.

Sept. 11. Mensibus etiamnum profluentibus,
præscriptum est hujusmodi *electuarium*.

℞. *Conserv. Ros. Rubr.* ʒ℥.

Bol. Armen.

Croc. Mart. Astring. ā ā ʒ℥.

Mastich.

Terr. Japan. ā ā ʒ 2.

Spec. Diatriwn Santal. ʒ 4.

Syr. è Symphyt. q. s. M. F. Elect.

Cap. q. n. m. 4tâ quâque hor. superb. Coch. 5.
Fulap. seq.

℞. *Aq. Sperm. Ranar.*

Plantagin.

Cinnam. Hord. ā ā lib. ℥.

Syr. è Corall. q. s. M. F. Fulap.

Cap. etiam ter in die *Spir. Vitriol. gt.* 40. in
quovis *vehiculo*.

Repet. Foment. & Pilul. præscript.

Sept. 13. Manavit adhuc, sed non nisi gutta-
tim, fluxus: qui tamen remediis rite assumtis,
Sept. 15. omnino cessit.

Igitur in eo jam omnis medendi cura versa-
ri debuit, ut firmarentur vasa, & prohibere-
tur illa sanguinis raritas. *Primæ* intentioni ut
satisficeret, quotidie repetita est *fomentatio*; *se-*
cundæ par esse videbatur *glutinantium*, & *bal-*
samicorum usus. Postpositis itaque *astringen-*
tibus, instituta est sequens methodus.

℞. *De-*

℞. *Decoct. Alb.* ℔. 2.

Aq. Cinnam. Hord. ℥ iii.

Sacch. Alb. q. s. M. Cap. ℥ 4. quater in die.

℞. *Balsam. Capiv.*

Polychrest. a a ℥ 2. Cap. gt. 25. horâ decubitûs in *Conserv. Ros. Rubr.*

His adhibitis remediis, post trium ferè hebdomadum intervallum, *Oct.* 5, redierunt menses: & ad *sex* quidem dies demissi sunt. Repetitis verò iis quæ ultimò præscripta sunt, periodo proximâ, *quatrividuo* terminatus est fluxus: qui, eundem intra terminum etiamnum subsistens, mulieri sanitatem restituit.

Historia III.

Maii 21. 1703.

Mulier, annos 36 natæ, post abortum ad tres periodos per dies *quatuordecim* manârunt menses; deinde per trimestre ferè spatium, *quotidie* eruperunt. Quo profluvio ita labefactatæ sunt vires, ut vix stare, nedum ambulare potuerit. Spiritum ita graviter duxit, ut penè in suffocationis periculum incidere. Invasit aliquando syncope, aliquando hysterica passio: ita ut per horam unam aut alteram quasi animæ expers jaceret. Pallor & macies, qualis in phthificis. Pulsus debilis, frequenter etiam intermittens.

Indicatio *Curatoria* primò ad fluxum compe-
scendum, deinde ad vires instaurandas respi-
cere visa est.

Usa est igitur *fomento*, in *histor.* 1. descrip-
to : cujus quidem vim semper ferè efficacissi-
mam comperi.

Internè adhibitæ sunt, in decocto tormen-
tillæ spir. sal. dulc. gt. 20. quater in die.

Maii 25. Fluxus paulò imminutus, quoti-
die licèt recrudescebat.

In potùs communis locum suffecta est se-
quens *emulsio*.

℞. *Amygdal. Dulc. excortic.* ʒi.

Sem. 4 *Frig. Maj. a a* ʒ2. quibus in
mortario contusis affund. *Aq. Hord.* lib. 2. co-
laturæ add.

Sal. Prunell. ʒ2.

Syr. Althæ. q. s. M.

Maii 30. Substitit fluxus; postero tamen
vespere, denuo erupit.

Ufù verò præscriptorum continuò ita tem-
peratum est profluvium, ut à *Jun.* 3 ad 9 pe-
nitus sisteretur; deinde, post mensem exactum,
ad solennes periodos rediret. Cohibito igitur
fluxu, & canalibus satis obfirmatis, *alterius*
indicationis ad hunc modum habita est ratio.

℞. *Cortic. Peruv.* ʒi.

Ra. Zedoar. ʒss.

Cochinell. ʒ2. Digerantur cum *Vin.*
Alb. lib. 2 tepidè per triduum. Liquoris fil-
trati cap. ter in die ʒ2. In quolibet haustu in-
stillentur

Tinct.

Tinct. Serpentar. Virgin. gt. 20.

Noctu, quia frequenter *insomnis* fuerit, nonnunquam etiam & *hysterica*, usa est *pilulis pargoricis*.

R. Galban. col. 31.

Spec. Diamb.

Castor.

Camphor. a a 35.

Laudan. Londin. 31. M. F. Pil. 20.

Cap. 2. ante decubitum, superb. *Tinct. præscript. Coch. 4.*

Diæta sit ex cibis ad *nutriendum* maximè idoneis.

Jul. 19. Venter, qui hætenus malè se habuit, multùm resectus est. Vires etiam aliquatenus roboratæ. Incunte *Augusto*, mulier, methodi præscriptæ usu, integrè convaluit.

C A P. XIV.

De remediorum viribus, & operatione.

ILLUSTRATÂ jam variis ratiociniis plethorâ, & per omnem *phænomenorum* seriem deductâ, *remediorum*, quæ *internè* adhibita mensibus vitiatis mederi solent, *vires*, tanquam ultimum theoriæ nostræ argumentum, expendamus: his quippe rite investigatis, facilè patebit, *Emmenagoga*, sive ea quæ menses suppressos cient, *plethoram* ad vasa *intendere*;

eandem verò ab *astringentibus*, five ab iis quæ fluentes sistunt, *imminui*.

Hæc quidem remedia, tanquam *utero specifica*, à plerisque prædicantur; cùm solummodo humorum *crasin* ita immutant, ut provariâ sanguinis texturâ aut provocetur, aut sistatur per *uterinas vias* profluvium: ita ut hæc *sensibilis operatio* nihil aliud sit, nisi alterius cujusdam, quæ in *sanguine* peragitur, operationis effectus necessarius: qui quidem non tam peculiari alicui *remediorum* efficaciam, quàm ipsius *uteri fabricæ* debetur. Hoc fanè à scriptoribus parum animadversum est, qui, cùm de remediorum viribus differant, pro actione *internâ* operationem *sensibilem* substituant; ita apud eos alia *diuretica*, alia *diaphoretica*, alia *emmenagoga* appellantur, cùm tamen de *agendi modo* nihil inde innotescat: quæ quidem medicamentorum operatio non modò non est *primaria*, sed fallax etiam, & incerta. Ex. gr. si exhibeatur *diaphoreticum*, nemo ignorat id pro voto minimè cessurum, nisi aperiantur *pore*: iis enim occlusis, quamcunque in *sanguine* virtutem exerat remedium, ad *sudorem* provocandum est prorsus inefficax. Sive tamen *sudor* succedat, necne, eodem modo in *sanguinem* agit *diaphoreticum*; sanguinem enim ad certos quosdam gradus attenuat & *resolvit*, ut ejus tenuior pars per poros cutaneos, nisi præcludatur via, elabi possit: ipsa tamen *diaphoresis* non est actio medicamenti *primaria*, sed ab humoribus ita attenuatis, nisi *pore* prohibeant, necessariò fluit; si enim *pore* oc-

clusi

clusi fuerint, ita *sanguinem* rarefacit *diaphoreticum*, ut *ardorem*, nonnunquam & *febrem* inducat. Ita ut propria medicamenti virtus non in humorum *diaphoresi*, sed *resolutione* consistat. Par est in *emmenagogis* ratio; ea quippe perpetuâ & immutabili quâdam agendi normâ *plethoram* exsuscitant, ut per *uterina vasa* erumpat sanguis. Potest verò talis esse ad *uterum* obstructio, sive canalium, sive sanguinis vitio, quæ à nullis *emmenagogis* pervinci queat; cùm tamen *emmenagogi* eadem sit, ac si *mensēs* cieret, in molem sanguineam operatio. Ita ejusdem remedii varia esse potest *sensibilis operatio*, uti rectè argumentatur Cl. Cockburnus, vis verò, quam in *humores* exercet, unica sibi que perpetuò constans.

Hinc est, quòd illa de remediorum viribus disquisitio inter *medicinæ desiderata* poni soleat; cùm si simplex & *primaria* accuratè observetur *operatio*, explicationem non ita difficilem exigant *remediorum* virtutes. Quippe adhibitâ hâc ratiocinandi methodo, concideret omnis illa, quæ pharmacorum viribus immeritò objicitur, *incipitis efficaciae* querela. Queruntur enim medici nullum dari remedium, quod certam aliquam agendi normam persequitur, imò quod non potius ita incertum & fallax est, ut sæpe *variâ*, nonnunquam etiam *contrariâ*, nec in diversis modò, sed & in eodem corpore, vim exerceat. Ita delirantibus medicis, innocua plectuntur pharmaca. Hæc enim, quam medicinæ exprobrant, operationis *varietas*, non ex mutabili *remediorum* virtute,

sed ex multiplici *corporis* statu deduci debet. Eorum quippe actio eadem semper est sibi que consentiens; cùm verò corporis, in quod agunt, dissimillima sit indoles, adhibitis remediis, ratio postulat, ut non *diversus* modò, sed & *contrarius* aliquando oriatur effectus. Ita v. gr. detur medicamentum, quod humores viscidos *resolvat*: id quidem suâ *attenuandi* vi operatur, licet pro vario *lentoris* genio diversè; ita ut in alio, qui minoris est cohærentiæ, *resolutio* sit major; in alio, qui majoris est, minor; in alio denique, qui firmiùs compingitur, nulla; ita varia quidem medicamenti ad *medendum* vis, non varia tamen in *agendo* norma. Quomodo enim eadem vis diversa longè momenta queat pervincere? quomodo similis semper esse posset *agentis* energia, cùm ita dissimilis prorsus sit corporis, in quod agitur, natura? Constantem hanc à medicamentis sperare efficaciam ita ridiculum est, ut nihil mirum sit, si etiam ab eodem medicamento educi possit effectus *contrarius*. Concipiamus enim eam esse sanguinis *crasin*, ut pars ejus longè maxima insigniter lentescat, cohærentiæque in eâ momentum validius sit, quàm quæ ab *attenuantium* viribus resolvi queat: in hoc casu si adhibeatur medicamentum *resolvens*, eam quidem sanguinis partem, quæ minùs lentescit, ita fundit & attenuat, ut per *glandulas secretorias* uberius extrudatur; ita, medicamenti vi eliminatis particulis tenuioribus, crassior erit reliqui sanguinis compages. Ad hunc modum, uti & docet experientia, *lentorem* aliquando

quando augent *diaphoretica*. Igitur *opium*, quod ad *reserandam* sanguinis *compagem*, & *sudores* *movendos* maximè efficax agnoscit *Willisius*, nullo alio modo sanguinem *incrassare* posse arbitratur, nisi quatenus *serositates* copiosè *secerni* & *amandari* faciat; proinde ut liquor *residuus* *spissior*, & *compactior* evadat^a. Neque id sanè *medicamento* imputandum; (hoc enim eam agendi normam, quam ipsi præscripserit natura, constanter fideliterque observat) sed *humoribus* potiùs, qui variæ hujusce efficacix necessitatem inducunt. Ita corpora quædam *emollit*, quædam rursus *indurat* ignis; cum tamen in ipso igne nulla sit agendi varietas. Ita *febris*, si tenuior sit sanguis, pulsus excitat; si crassior, *deprimit*. Etiam *chalybs*, qui, si vasa lentescente sanguine opplata ulterius se distendi sinant, vi suâ *obstructionem* tollit, eandem iis renitentibus *auget*. Quod in *hystericis affectibus* sæpius compertum habui. Pari modo *emetica*, si ventriculus *robustior* sit, *alvum* movent: contrà, si *tenerior* fuerit, *vomitum* cient *cathartica*. Ita denique *syrupus violarum*, cum *acidis* admixtus, colorem *rubrum*; cum *alcalicis*, *viridem* exhibet: quæ tamen coloris diversitas non variæ *violarum* virtuti, sed corporum, quibus commiscentur, dissimili ingenio ascribenda est. Etenim unica eaque levissima nonnunquam circumstantia, si immutata sit, id efficere potest, ut medicamenta non variis modò, sed & contrariis etiam viribus pollere videantur: uti in speculis concavis,

^a *Pharm. Rat. p. 1. 301.*

multiformem objecti imaginem exhibet sola *distantiæ* mutatio.

Ut verò res omnis exemplo clariùs patefcat, sub examen revocetur *opii* in sanguinem operatio : à quo certè, si ab alio quopiam remedio, excitantur *phænomena*, non modò inter se disjuncta maximè, sed & repugnantia. Supponatur igitur, id quod mox ostensuri sumus, actionem *opii* primariam in sanguine *attenuando* consistere. *Attenuato* sanguine, necessariò sequitur, ut uberior spirituum copia fecerni debeat ; hinc *animus alacer, vegetus, pacatus, vigil, vires corporis instauratæ* ; quod præcipuè experiuntur ii, qui *opium* interdium parciore *dosi* assumunt : animo ita refecto, obrepit sensim *doloris oblivio* ; viribus verò roboratis nonnunquam fit, ut *fætum, & calculum expellant opiata*.

Cùm verò sanguinis particulas ita attenuat *opium*, facit, ut siquid in *arteriis* hæserit, jam in *venas* trajici queat : unde remotâ omni *obstructione*, cessat ille, qui ab humoribus stagnantibus frequenter oritur, *dolor*. Eodem modo solvitur *febris intermittens* ; quam à *lentore* suprâ deduximus. Viis igitur reclusis, ita ut consueti spiritibus sanguiniq; pateant aditus, sopitur, quæ à nervis obstructis provenit, *convulsio*. Ita *opio* frequenter cedit *colica convulsiva, & singultus* ; quibus etiam annumerari potest *vomitibus, & purgatio enormis*.

Spiritibus *opio* refectis, validiùs se contrahit *cor*, unde vividior sanguinis circuitus : sanguine autem *attenuato, & velociùs, quàm consuevit*

suevit, ad *cutaneas glandulas* delato, succedit *libera perspiratio*, & *sudor*; quia tum ob *rariorem sanguinis texturam* facilius sit per poros secretio, tum ob *velocitatem* auctam etiam uberius. Hujusmodi *perspiratio* largius provocata, *sanguinis*, & *ventris profluvia sedat*; quia humoribus per *poros* evacuatis, fit à parte affectâ *revulsio*: eadem quoque *tussim*, & *catarrhos solvit*. Humoribus verò ad hunc modum resolutis, & in exteriora protrusis, *efflorescit cutis*, nonnunquam & *prurit*.

Cùm verò, sanguine attenuato, non modò sit uberius spirituum copia, & proinde impetus cordis fortior, sed augeatur etiam ad *vasa humorum plenitudo*, utrâq; de causâ *pulsus excitabit*, *menfes* etiam, & *lochia provocabit opium*.

Ita ferè corpus afficiunt modicâ dosi assumpta *opiata*, cùm adhuc intra debitos limites constiterit ea, quæ ad *vasa* inducitur, *plenitudo*: quæ tamen si, *opio* liberè nimis adhibito, ulteriùs increseat, alia prorsus, eaq; multùm diversa, exhibet *phænomena*. Sanguine enim ita attenuato, ut *arteriæ cerebri* latius, quàm par est, distendantur, *nervorum*, qui iis ubiq; interseruntur, non potest non valida esse compressio: compressione verò necesse est aut intercipi penitus, aut saltem copiâ minore scerni spiritus: ita ut ingruat *dyspnæa*, *obruatur animi vigor*, & pro ratione momenti illius, quo *nervos* premunt *arteriæ*, succedat aut *stupor*, aut *somnolentia*, aut ipse *somnus*; eodem modo ac à *vino* liberiùs epoto sequi solet.

let. Interceptis adeò spiritibus, *imminuuntur vires*; quibus deficientibus, *languescit pulsus*, nonnunquam & *concidit inferior maxilla*: tonusq; partium ita vacillat, ut relaxentur admodum fibræ; inde *pupillæ dilatatio*, *ischuria*, & *membrorum quædam quasi paralysis*. Ad eandem normam facilè illustrari possunt reliqui *opiatorum* effectus, qui utcunq; inter se dissimiles sint, unicam tamen agnoscunt causam, sanguinis scilicet, quæ ab *opio* inducitur, *attenuationem*: quæ cùm *arteriarum carotidum* capacitatem ampliet, à solâ *diametri* mutatione pendet omnis illa operationis discrepantia. Et hæc quidem insequuntur mala, non modò cùm manu nimis liberâ, sed cùm alieno tempore, & corporis cui adhibetur parum spectatâ conditione, detur *opium*: *nimia* enim *dosis* non tam *officinali* mensurâ, quàm corporis ratione dijudicanda est. In alio quippe humorum statu desideratur *larga dosis*, in alio sufficiet mediocris, in alio etiam nocebit minima. Si quid verò hujusmodi acciderit, id *medenti* potius, quam *remedio* imputandum est.

Hæc paulò fusiùs explicata sunt, ut manifestum fiat, quàm iniqua sit medicamentorum accusatio, quasi in iis fuerit agendi modus multiformis, & tanquam desultorius. Ita ut quicquid incerti fuerit, id non tam *instrumentis* medicinæ, quam *subjecto* ascribi; non tam ad *vires pharmacorum inconstantes*, quàm ad *humorum crasin ignotam* referri debeat. Itaque cùm medicina nihil aliud sit, quàm morbi & medicamenti comparatio, nisi illius indoles
 probè

probè intellecta sit, hujus vires frustra explorantur. In eo quippe præcipuus esse debet medici labor, ut *humorum* variam temperiem inclinationesque omnes perspiciat; sic enim, quid eos excitet, quid compescat, feliciùs dignoscet: quorum momenta cùm ita varia sint, ut non tantùm ob *numerum* minùs accuratè animadverti, sed ob *similitudinem* etiam minùs distingui soleant, is certè, qui illorum morem acutiùs inspexerit, aptissimâ utetur medicinâ. Quâ quidem in re, ab *empirico* maximè discernitur *rationalis* medicus; qui non tantùm *remedii*, quod adhibet, sed *mali* etiam, cui id adhibetur, vires explorat.

Sed, ut eò unde digressi sumus redeamus, inquirendum restat, quænam sit *medicamentorum*, quæ mensibus vitiatidis profunt, *operatio primaria*. Ordiamur itaque ab *emmenagogis*, mox ad *astringentia* perventuri.

Emmenagoga ferè omnia sunt etiam *alterantia*, aliter ac censet *Etmullerus*^a; *crasni* enim sanguinis immutant. Eorum verò operatio à vi quâdam *attenuatrice* potissimùm deducitur. Quippe, cùm partium tenuium sint & maximè penetrantium *emmenagoga*, molem sanguineam ita incidunt & comminuunt, ut minor sit globulorum inter se contactus, & proinde compages rarior: sanguis verò ad hunc modum *attenuatus*, non modò spatium amplius intra canales occupat, sed spiritus nervis uberiores sufficit; unde iterum corde vehementiùs contracto, fortiore impetu per arterias circulatur. Ita cùm adhibitis *emmenagogis* non modò ad

^a *Lib. I. 5. 47.*

vasa increfcant *plenitudo*, fed & cordis augeatur vis, fanguis *canales uterinos* præ cæteris validiùs feriens & diffendens, quemadmodum fuprà fatis oftendit, per eos viam fibi patefacit. Cùm verò frequentior mendum fupprefforum caufa à *lentore*, qui *capillaria* obftruit, oriatur, ab *emmenagogis* ita *attenuantur* humores, ut illa ipfa fanguinis portio, quæ vaforum lateribus adhæfit, jam per minima orificia fatis promptè traduci queat; ita aditu patefacto, fanguis folenni more vim fuam in canalium latera exercet, quæ ad capillaria, dum obftructa effent, minùs potuit pertingere. Ita *emmenagogis* inftaurantur fpiritus, & vis cordis augefcit; quia iis adhibitis *attenuatur* fanguis. Id verò notandum volo, non folùm ab hac *attenuatrice* virtute deduci fpirituum incrementum. Hoc enim conceflo fequitur, ut quicquid potentiùs *attenuat*, id etiam maximè effec *cardiacum*; fecus ac teftatur experientia. Ex gr. *cortex Peruvianus* multò magis *attenuat*, quàm *chalybs*; ad *pulfum* tamen excitandum longè ineptior. Igitur in remediis *cardiacis*, & proinde menses moventibus, *duplex* eft operandi ratio; alia enim *attenuando* fanguinem fpiritus reficiunt, alia rursus, etiamfi humores non attenuent, fpirituum fecretionem promovent. De illis fuprà dictum eft. Ad hæc quantum attinet dicendum eft, nonnullis remediis inefle particulas in fpiritus faciliùs mutabiles, iisque quafi cognatas & congeneres, uti & quibusdam *alimentiis* infunt fucci ad nutriendum magis idonei: ita

ita ut, imminutâ sanguinis cohærentiâ, ex ipso medicamento hauriri queant *spiritus*. Spiritibus ad hunc modum reſectis, vehementiùs contrahitur cor, & ſanguis velociùs circumagitur; increbrefcente adeò ſanguinis motu, cum calor etiam increſcat, quod capite 8 ſatis probavimus, *aëris* particulæ, quæ globulis ſanguineis immixtæ ſunt, calore, uti in *thermometro* fit, *rarefactæ*, ſeſe undique expandunt, canaliumque tunicas diſtendunt: ita poteſt eſſe ſanguinis *rareſcentia*, cum minimè interim *attenuetur* compages. Quod in *febris* sæpe fit, licèt parum obſervetur. Hæc tamen *rareſcentia*, cum ad *vaſa plethoram* augeat, menſes æquè potenter provocat, ac ſi *attenuaretur* ſanguis. Cum itaque à *vaſorum durtie* oriatur *ſuppreſſio*, cum fructu adhiberi poſſunt ea, quæ humores *rarefaciunt*; cum verò *sanguis* in vitio fit, ea etiam, quæ *attenuant*, in uſum ſunt vocanda. *Emmenagoga* verò his *attenuandi* viribus præcipuè inſtructa eſſe, tum *ratio* ſuadet, tum *experimenta* confirmant. Argumentorum igitur capita erunt *quatuor*: *remediorum* ſcilicet, 1. *Effectus ſenſibiles*. 2. *Cum ſanguine adhuc tepente*, & 3, etiam cum *ſyrupo violarum commixtio*: 4 denique, *injectiones in vivo animali per ſyringa inſtitutæ*.

I. Itaque *emmenagogis* hanc *attenuandi* virtutem ineſſe probant eorundem *effectus ſenſibiles*; ex quibus ſatis erit ſequentes tantùm expandere.

1. *Saporem*; qui, cum in *emmenagogis* plerumq; *acris* & *amarus* fit, indicat partes eſſe
tenues

tenues, & ad motum excitandum idoneas: igitur hujusmodi *sapor* in iis præcipuè observatur, quæ *sale volatili* abundant; *salis* verò *volatilis* ea est efficacia, ut sanguinem plurimum *attenuet*, spiritusq; instaurat. Ita *sapore* vires suas produnt, *opium*, *gentiana*, *myrrha*, *arum*, *absinthium*, *sabina*, *ruta*, *pulegium*, *centauréum* &c. *calida* omnia, & *odorata*: quibus adjici potest *cortex peruvianus*, qui licet nondum inter *emmenagoga* locum obtineat, iis tamen, propter egregiam illam, quam in *attenuando* sanguine exercet vim, annumerari debet.

2. *Odorem*; qui, si vividior sit, *salis volatilis* æquè ingenuus est index, ac *sapor*. Tali *odore* pollent ex *amaris* pleraque, item *aromatica* omnia, quæ itaq; universa *emmenagogis* ascribi solent, & apud *Heurnium*^a utero *studere* perhibentur. Ex quibus tamen primas merito obtinet *crocus*, & *cinnamomum*. Inter ea quæ odorem *acrem* præ se ferunt, reponenda sunt *urinosa*, v. g. *sal armoniacus*, *sal corn. cerv.* &c. quæ ideo *menses* potenter cient.

3. *Pulsus incitationem*: qui, cum fortiùs increbrescat, satis ostendit sanguinem ita *attenuari* & *rarefcere*, ut copiosior fiat spirituum secretio; unde cordis impetus, qui *pulsus* regit, validior. Hoc præ cæteris *emmenagogis* efficiunt *chalybs*, & *hydrargyrum*, *calida*, & *cardiaca* omnia; quorum usus ad movendos *menses* plurimum semper valuit.

4. *Calorem*. Cum enim *calor* nihil aliud sit, nisi partium motus vividior, hoc inter se invi-

^a *Meth. ad Prax.* 306.

cem attritu fit, ut sanguinis globuli divellantur plurimum, & *rarefiant*. Ita ubi nullum ferè est *emmenagogum*, quod calorem non exciter, sic etiam quicquid calorem inducit, mensibus etiam ciendis prodest : quemadmodum satis ostendunt *cardiaca*, & *stomachica*.

5. *Diaphoresin* ; quam quæ provocare possunt pharmaca, ea certè sanguinis cohærentiam ita *resolvunt*, ut faciliùs per poros secerari queat. Igitur inter *emmenagoga* utramque paginam faciunt *diaphoretica* ; ex quibus ferè cum nullum sit *opio* potentius, satis constat id etiam mensibus movendis haud ineptè adhiberi.

II. *Attenuatricem* hanc, quam *emmenagogis* ascripsimus, virtutem probat ipsorum cum *sanguine* adhuc *tepente* commixtio. Neque hoc, quod ab hujusmodi *experimentis* deducitur, futile videtur argumentum. Quippe si sanguini stagnanti, & jam sponte in *lentorem* abeunti, admista *emmenagoga* prohibeant, quò minùs *coaguletur*, & *concrefcat* ; certè si *motus* accesserit & valida satis partium inter se *agitatio*, quemadmodum in corpore fit, *emmenagogis* adhibitis faciliùs *rarefiet* sanguinis cohærentia ; uti ratio non *analogica* modò, sed & *mathematica* postulat. Idem enim utrobique agendi modus, licèt vis *gradu* multum diversa ; quod qui negant, iidem etiam sensuum testimonia redarguent.

Sanguinis igitur ex arteriâ *canis* recenter extracti sequentibusque admixti, ita se habuerunt *phenomena*, Feb. 12. 1702.

I. Cum

1. Cum *spir. salis armoniaci*. Floridus admodum color, & compages fluida: quod etiam fit, si in *substantiâ* adhibeatur ipse *sal*. Feb. 18. fluorem retinuit sanguis, quoad colorem tamen paululum nigrescens. Cum *spiritu salis armon. succinati* eadem exhibuit, nisi quod citius nigresceret.

2. Cum *decocto sabinae*. Rubedo intensior, & major tenuitas, quàm cum *spir. sal. armon.* Feb. 13. eadem phænomena. Pari modo se habuit *decoctum marrubii*.

3. Cum *laudano liq. Sydenham*. Sanguis rutilantior, quamvis non multò tenuior, quàm cum *decocto sabinae*. Feb. 13. Color paulò subfuscior. Idem quoque admisto *spir. corn. cerv.* apparuit, uti etiam & succo *salviae, lavendulae, imperatoriae, pulegii, absinthii*.

4. Cum *panacéâ opii liq. D. Jones*. Eadem præbuit ac *laudanum liq. Syd.* nisi quòd Feb. 13 color nihil de nitore amiserit.

5. Cum *aquâ rutæ still.* Fluiditas summa, nec Feb. 13, quicquam immutata. Idem præbuit *aqua absinthii*.

4. Cum *spiritu vini rectif.* sanguis coagulatus admodum, & instar *visci* lentescens. Feb. 13, *conservam cynosbati* tam colore, quàm crassitie referebat. Idem exhibuit *spiritus vini camphoratus*, nisi quòd imbecillius esset *coagulum*. Idem quoque effecit & *tinctura opii cum spir. vini camphorato* extracta.

7. Cum *tincturâ corticis peruviani spir. vin. extract.* sanguis crassus valde, & obscurus. Feb. 13. paulò splendidior, tamen fortiùs adhuc

concretus. Idem *cortex vino* ad saturitatem infusus summam sanguini fluiditatem, & colorem elegantissimum conciliabat.

8. Cum *tincturâ jalapii*. Color vividus, & rutilus, compages densa. Feb. 13. Utrumque intensius. Eadem præbuit *tinct. scammonii*, & *spir. lavend. comp.*

9. Cum *tinct. succini*. Color subfuscus. Massa in grumos abiit. Feb. 13. Satis forte coagulum. Pari modo sanguinem immutavit *tartari tinctura*.

10. Cum *calomelan*. Rubedo vivida. Fluor etiam factus intensior. Supernatabat plurimum feri.

11. Cum *æthiop. min.* ad fundum demissa est massa nigra: pars reliqua satis attenuata.

12. Cum *sal. genist.* Color vividus: fluiditas, quàm in ipso sanguine, major.

13. Cum *sal. absinth.* Rubedo & fluiditas summa.

14. Cum *sal. tartar.* Color idem, compages tamen paulò densior, quàm in *sal. absinth.*

15. Cum *tinct. chalyb. Lower.* sanguis tenuior multò factus, & rubicundior. Supernatabat spuma quasi oleosa.

Cum sero sanguinis humani admixta sunt
sequentia.

1. *Tinct. Aloes cum Aq. Menth.*
extract.

Decoctum Sabinæ.

Aqua Sabinæ still.

Aq. Fontan.

Decoctum Gentianæ.

Ari.

Sarzæ.

Chinæ.

Spir. Sal. Armon. cum Cin. Clavell.

cum Calce vivâ.

Succinatus.

Spir. Tartari.

Ol. Semin. Carui.

Panaceâ Liq. D. Jones.

Laudanum Liq. Sydenh.

Spir. Croci.

Spir. Terebinth.

Tinctura martis tartari.

Spir. Guaiaci.

Sp. Corn. Cerv.

Ol. Tereb. Guaiac. Lav. Caryophyl.

2. *Decoctum corticis peruviani.* Serum
multò magis, quàm à prioribus, in fluorem re-
ductum.

3. *Spir. vini. camphorat.* Fortiter coagula-
batur. Phialæ inditum cùm aliquamdiu reman-
ferit, in fundo apparuit *hypostasis* satis copiosa:
liquoris pars superior clara, & pellucens.

4. *Spir. vini rectif.* Phialâ pariter inclu-
sum, sine ullâ præcipitatione turbidum perman-
sit.

5. *Tinc-*

Color pro li-
quorisatione
varius, *seri* ta-
men compa-
ges aliquantò
tenuior facta;
quæ, ad diem
unum aut al-
terum, immu-
tata persistit.

5. *Tinctura Scammonii.*

Castorei.

Succini simpl.

Sulphuris.

Corticis Peruv.

Serum mediocriter coagulabatur. Eadem exhibuit spir. vini tartari. & ratafia.

6. *Tinctura Croci.*

Metallorum.

Potestates Succini.

Sal Volatilis Oleosus.

Leve aliquod coagulum.

7. *Tinctura martis mynsichti.* Coagulum forte. Ad fundum demissa est massa, instar gummi, concreta.

8. *Tinctura antimonii diaphor.* Turbatum & aliquatenus concretum.

9. *Tinct. Jalapii.*

Succini cum Sal. Armon. pp.

} tantum turbidius.

10. *Tinctura coccinea, ex spec. diambrae & cochinellâ cum spir. vini extracta.* Nul- lum ferè coagulum.

Annotabit lector, omnia hæc, quæ sanguini & sero admixta sunt, eorum compagem attenuare & dissolvere, præter tincturas eas, quæ spiritu vini extrahuntur. Sed hæc quæ ab hujusmodi tincturis oritur concretio, non rei solutæ, sed menstruo ascribenda est. Spiritus enim ardentes, quodcunque fere in iis medicamentum dissolveris, sanguini coagulum inducunt. Quod tum aliàs, tum re ipsâ probari potest. Spiritus quippe vini simplex coagulum multò fortius intulit, quàm tinctura quævis eodem spiritu extracta; ideo etiam pro variâ rerum in eo solutarum indole diversa est concretio; levior scilicet, si adjiciatur medica-

mentum attenuans, quale est *sal armoniacus*, *opium*, *crocus*, & *aroma* quodvis. Ita ex experimentis constat, à *potestat. succini*, *sale volatili oleoso*, *spir. vin. camphorato*, *tinctur. opii cum sp. vin. camphorato*, *tinctur. croci admixtis*, sanguinem imbecillius concreescere; à *tincturâ coccineâ*, propter *aromatum* virtutem, vix quicquam coaguli fuscipere. Pari modo *serum* à *tincturâ succini simpl.* fortiter concretum est; ab eâdem *tincturâ*, cui *sal armoniacus* adjectus est, solummodo turbidius evasit. Cujus quidem varietatis hæc est ratio, quòd *attenuantibus* infusis impeditur, aut saltem immittitur ea, quæ à *spiritu vini* semper inducitur, *concretio*. Hæc quippe remedia, quorum *tincturas* cum *spiritu vini* extractas recensuimus, vi *attenuatrice* instructa esse facile sentiet, qui ea aliis *menstruis* accommodârit. Ita *opium*, siue *aquâ* siue *vino* dissolutum, sanguinem potenter *attenuat*, uti satis probat *laudanum liq. Syd. & panacæa D. Jones*; cùm tamen *sp. vin.* extractum, cohærentiam minùs prohibeat. Pariter *cortex peruvianus*, *spiritu vini* in *tincturam* redactus, sanguinem satis fortiter *coagulat*; idem interim *aquæ incoctus*, præ cæteris attenuantibus sanguinis *raritatem* promovet. Quanquam verò *tincturis* hisce cum *sp. vini* extractis minimè *attenuetur* sanguis, eæ tamen jure optimo inter *emmenagoga* recensentur; nam ut nihil dicam de rebus iis, unde educitur *tinctura*, ipse *sp. vini* eas in se continet particulas, quæ in *spiritus animales* facile migrare possunt; quemadmodum satis ostendit

stendit repentina illa assumptis, hujusmodi *spiritibus*, virium resectio. Spiritibus verò in cor uberiùs profluentibus, inducitur illa sanguini *rarefcentia*, quam ad *ciendos menses* satis instructam esse jam paulò antè monstravimus. Ita ut hujusmodi *tincturæ*, *spiritu vini* elicitaë, mensibus ciendis profint, cùm à *vasis* præduris nimiumque renitentibus ortum duxerit suppressio. Sin à *sanguinis* vitio inhibeantur menses, ita ut in *attenuandis* humoribus unicè consistat curatio, *tincturis* hisce *emmenagogis* alia longè aptiora videntur esse *menstrua*, putà *aqua* aut *vinum*, quàm *spiritus ardentis*.

III. *Emmenagogis* sanguinis cohærentiam dimoveri & *attenuari*, indicat ipsorum cum *syr. violarum* commixtio. Cujus argumenti ratio inde deducitur, quòd in confesso sit, quicquid ferè *syrupo violarum* colorem *viridem* aut viridi affinem conciliat, id inter *alkalica* referri debere^a. *Alkalicorum* verò eas esse vires fatentur omnes, quæ *coagulum* sanguinis *resolvant*. Igitur utrùm *emmenagoga* sint *alkalica*, seu quod idem est *attenuantia*, experimentis innotescet.

Syrup. violarum commixt.

1. Cum *ol. succini*——Color subviridis.

2. Cum *chalybe in aceto solut*. Viridis, sed obscurus admodum color. Eadem præbuit *chalybis cum sulph. pp.* tum in *aceto*, tum in *spiritu nitri* solutio; eadem etiam, *tinctura martis* cum *sale armoniaco* præparata.

3. Cum *chalybe in spir. salis solut*. Coloris

^a Boyle de Color. p. 3. 98.

166 *De Remediorum Viribus,*

nulla mutatio, nisi quæ à solâ commixtione provenierit.

4. Cum *chalybe in sp. salis armon. solut.* Viriditas nitidissima. Eadem exhibuit *tinctura tartari, & metallorum, potestat. succini.*

5. Cum *chalybe in aq. fontan. solut.* Color aliquantùm virescens.

6. Cum *spir. sal. armon. succinat.* Color inter viridem & subfuscum medius.

7. Cum *spir. sal. armon. cum calce vivâ pp.* Viriditas, qualis in stagno, aut palude observatur.

8. Cum *spir. sal. armon. cum sale tartari pp.* Color ad saturitatem viridis, & pellucens Idem præbuit *sp. C.C. & tinct. Lower.*

9. Cum *cupro in spir. sal. armon. solut.* Viriditas, qualem exhibet ampulla vitrea.

10. Cum *tincturâ succini cum sal. armon. pp.* Viriditas paulò imbecillior. Eadem exhibuit *sp. lavend. comp.*

11. Cum *panacêâ opii liq.* Color ad viridem accedens.

12. Cum *tinctur. antimonii.* Color *tincturæ* in aqueum conversus. Idem etiam cum *tincturâ corticis peruviani, castorei, jalapii* apparuit.

13. Cum *elix. pp. cum sale volatili pp.* Color viridi appropinquans, sed obscurus paululùm.

14. Cum *spiritu vini.* Nulla ferè coloris mutatio. Pariter etiam cum *spir. succini, & cochleariæ.*

15. Cum *spir. tartari.* Color viridis quidem, sed omnium maximè imbecillis.

16. Cum *sale volat. oleosò.* Viriditas herbacea.

bacea. Idem præbuit *sal tartari*; huic cùm affusus esset *sp. vitrioli*, orta est ebullitio, & color rubicundus.

17. Cum *testis ostreorum* in *aq. forti solut.* Color ex pallido & viridi compositus.

Ita colorem *syrupi cœruleum* in *viridem* commutant *emmenagoga*; ex quibus nonnulla eâ virtute pollent, ut *acidorum* vim omnem redundant, nonnunquam etiam & planè superent. Ita *chalybs* in *spiritu salis* solutus *rubrum* colorem destruit, qui aliàs à *spiritu salis syrup. viol.* commixto induci solet: idem *chalybs* in *spiritu nitri* dissolutus, non modò *rubedinem*, quam *syrupo spiritus nitri* largitur, extinguit, sed & *viriditatem* evocat. Pari modo *testæ ostreorum aquæ fortis* aculeos ita habetant, ut quemadmodum docet experimentum, non *purpureus*, sed *virescens* oriatur color. Eodem modo dignosci possunt *alkalica*, si affundatur *sublimat. corrosiv.* solutio: ex hâc enim cum *alkaliciis* commixtâ colorem oriri *subflavum* docent experimenta *Tornefortii*^a.

IV. *Vim emmenagogorum attenuatricem* declarant *injectiones in vivo animali per syringa institutæ*: ita ut si qui sint fidei nimis religiosæ, quibus priorum experimentorum ratio minùs satisfecerit, eos hujusce *autopsia* coarquat. Horum quidem experimentorum historiam non minutè descriptam, sed quantum ad hoc argumentum sufficiat, perstrictam damus.

I. Igitur in venam canis *jugalarem* injectæ sunt *panacæ opii liq.* ʒ 2 ʒ. Intra quatuor

^a Pref. Histoire des Plantes environs de Paris.

horæ minuta animal mortuum est; artubus diu post mortem minimè rigescentibus. Apertis *venâ cavâ, & aortâ descendente* effluxit sanguis tenuis admodum, & rutilus; pulmones sanguine turgido rubescebant. In corde summus sanguinis fluor. Cujus quidem *ventriculi* coagulo omni ita *immunes* erant, quasi *aquâ calidâ* essent eluti.

2. Alteri itidem cani propinatae sunt *laudan.* *Lond.* in *aq. cinn.* solut. 36. Brevi tempore ingruebat tremor & spasmus, deinde immanis oborta est salivatio. Post horæ quadrantem canis obiit. Aperto cadavere, in ventriculo & intestinis reperta est chylosa materia, *laudano* intimè mista & intincta. Arteriae, uti & venæ omnes, insigniter distentæ sunt; sanguis in universo corpore, suprâ quàm credibile est, tenuis, & rarus.

3. In venam canis *jugularem* per *syringam* immisi *sp. vin.* 32. Cadavere post horæ semiquadrantem aperto, sanguis in venis & arteriis omnibus in grumos fortiter concretus est; quæ tamen sanguinis concretio in cordis ventriculis erat compactior. Hanc à *spiritu vini coagulandi* vim observat *Bohnius*; cujus idèò usum *externum* ad hæmorrhagiam sistendam haud infeliciter tentavit^a.

Ad eundem modum injectæ sunt *tincturæ sp. vin.* extractæ, *croci* nempe, *castorei*, *spec. diambræ*, *myrrh.* &c. à quibus quidem omnibus sanguini inducta est concretio, pro *tincturæ* genio diversa. Eadem quippe à *tincturis* hisce

^a *Aët. Lips. Ann. 1683. p. 154.*

infusis exorta sunt *phænomena*, quæ suprâ, iisdem sanguine admixtis, recensuimus.

4. Venæ canis *jugulari* leniter immissæ sunt *spir. sal. armon.* cum *calce vivâ pp.* circiter ʒ6. Post horæ quadrantem, tremoribus per universum corpus spasmodicis, tendinumque subsultibus correptus est. Apertâ primò venâ *crurali*, deinde *jugulari*, effluxit sanguis liquidissimus, odore spiritûs urinosi foetus: bullis etiam aëris refertus. Durante injectione, cor frequenter admodum, & fortiter se contraxit. Injectâ iterum *spir. sal. armon.* ʒss, intra minuta aliquot mortuus est canis. Aperto thorace, pulmones rubicundi admodum, & quasi inflammati: in arteriis venisque omnibus, uti & corde, sanguis admodum tenuis, & rarefactus. In solo *venæ cavæ descendētis* trunco, ab hepate ulque ad cor, reperiendus est spissus, & compactus; qualis, cùm extra vasa missus paulisper refrixerit. Quæ quidem crassitudo sine dubio inde provenit, quòd dum spiritus à *jugulari* in *auriculam* cordis *dextram* continuò protrusus sit, sanguis in *venâ cavâ descendente*, non potuerit in cor deduci; ibique adeò cohibitus, & stagnans crassitiem istam contraxerit. Atque hoc semper ferè accidit, si instituatur per *jugularem* injectio.

5. In venam canis *jugularem* injecta est *corticis peruviani decoctio* fortis ad ʒi ss. Post horæ quadrantem canis validâ & crebrâ cordis pulsatione, deinde spasmis frequentibus correptus est. Injectâ ulterius ʒss, obiit tetanodes.

tanodes. Sectâ post mortem venâ *crurali* & *axillari*, exiit sanguis rutilans & liquefscens. Postero die, apertus est thorax; pulmones rubicundi admodum, & turgentes; sanguis in *dextro* cordis *ventriculo* plurimum accumulatus, & proinde compactus; in *sinistro* tamen paucus, isque satis fluidus. Pariter è *venâ portâ*, & *jugulari*, liquidus effluxit, & ultra naturalem statum rarus.

6. Cani propinatae sunt hor. 9. Mat. *tinctur. chalybeat. Lower.* 32. Nulla ferè mutatio, nisi quòd tanquam ebrius titubaret. Hor. 12. dati sunt morsuli ex butyro & *chalyb. cum sulph. pp.* 31. qui etiam hor. 3. Pom. repetebantur. Hor. 6. Injecta est in jugularem *tinctura prædicta* ad 32. Mox expiratio fortis, cordis labor & pulsatio vehementissima; quæ ad horam ferè perstitit. Aperto post mortem abdomine, diu duravit motus intestinorum peristalticus. In ventriculo & intestinis omnibus reperta est massa *chalybeata*; quorum interna tunica colore ferrugineo tincta. Vasa omnia sanguinea, uti & lactea, multum distenta. Sectâ venâ *iliacâ*, exiit qualis ex vivo animali, liquidus cruor: idem ex corde vulnerato cum impetu quodam profiluit, intense rarus & rubicundus. Hor. 12. In corde & canalibus appensis multum sanguinis adhuc floridi innatabat, minùs tamen, quàm in priore experimento, liquefcentis.

7. A cane devorata est *sublimat. corrosiv.* 31. Intra horæ quadrantem, vomitus invasit & spasmus enormis; deinde post horam elapsam, super-

superveniente catharsi, interiit canis. Aperto abdomine, viscera omnia rubescentia admodum, multis etiam in locis inflammata: plurimum sanguinis circa pancreas extra vasa effusi; ita ut glandulæ distinctæ, & quasi distinctæ cernerentur. Canales ita distenti, ut oculis se exhiberent etiam ea, quæ per tunicas arteriarum & venarum reptant, vascula. Renes uti & lien, sanguine liquido repleti. Thorace inspecto, pulmones turgidi & rubicundi; in corde plurimum sanguinis fluidi, & coagulo prorsus immunis, difflebat. Ita etiam ex arteriis, & venis omnibus liquidissimus exiit sanguis.

Hoc experimento facilè innotescit egregia illa vis, quam in attenuando sanguine exerit *mercurius*. Reliqua quippe quæ *sublimat. corrosiv.* constituunt corpora, viz. *sal communis; vitriolum, & nitrum*, sanguinem fortiter coagulant: quòd si iis admixtus *mercurius* sanguinis non modò coagulum omne tollat, sed raritatem etiam intendat, vehementiùs certè humores resolvat, si sine salibus istis acidis per se exhibeatur. Itaq; *calomelas*, quem major ingreditur *mercurii* proportio, sanguinem adhuc intensiùs attenuat. Idem de *mercurio* observat vir in *experimentalì anatomia* fidus & diligens *Wepferus*^a; uti etiam de *belleboro albo, hyoscyamo, amygdalis amaris, &c.*

Ad hunc modum de *emmenagogis primariis* instituta sunt experimenta: plura adjicere tum argumento esset minùs necessarium, tum lectori nimis molestum.

Ita compage sanguinis five *rarefactâ* five *attenuatâ*, *momentum* ipsius intendunt *emmenagoga*. Dantur & nonnulla, quæ *proprio* etiam *momento* instructa, menses provocant. Ex quibus præcipua sunt *hydrargyrum* & *chalybs*. Cùm enim ea sit *hydrargyri gravitas*, ut globulis sanguineis pondere plusquam *decies* præpolleat, eâdem ratione *hydrargyri momentum* eo, quod *sanguis* obtinet, erit validius: unde sanguis assumpto *hydrargyro* impetum fortiores nactus, tum humores lentos per *obstructa capillaria* faciliùs protrudet, tum vehementiùs in *uterina vasa* impinget: in quibus quidem efficiendis versatur omnis *emmenagogorum* virtus. Neque hoc *impetu* solùm pollet *hydrargyrum*, sed partium tum *gravitate* tum *tenuitate* cohærentiam sanguinis ita diffringit & segregat, ut humoribus plurimùm *attenuatis* major fiat spirituum secretio, & vis cordis fortior; unde & *velocitatis* ratione, adhibitis *mercurialibus*, increscit sanguinis *momentum*. Hæc satis confirmat *salivatio*; in quâ pulsus ita *frequens* & *validus* observatur, ut ad *febrilem* penè accedat. Etiam peractâ *salivatione*, sanguinem *tenuem* admodum & *rarum* relinqui, testatur experientia. Itaque restrictis mensibus nunquam feliciùs succurritur, quàm cùm *alterantibus* per vices interposita sint purgantia *mercurialia*. Etiam continuum *æthiopis mineralis* usum non modò tutum, sed & efficacem semper comperi; qui cæteris ex *mercurio* præparatis ideo solùm postponi solet, quia sit omnium facillimè parabilis. Ita

se perpetuò habet *hydrargyri* operatio ; quæ utcunque constans sit, minimè tamen vetat, quin & aliis etiam viribus instrui possit *hydrargyrum* : quippe non modò *obstructa vasa* aperit, sed & *acidorum aculeos* æquè constanter retundit.

Chalybs etiam vi *momenti* sui vasa potenter aperit ; quippe qui corpus valdè ponderosum sit, licèt *dimidiatam* tantùm *hydrargyri gravitatem* fortitus sit. Humores etiam *attenuat*, uti ex experimentis & effectibus constat, unde & alio nomine mensibus ciendis prodest. Ex iis præterea est *chalybs*, quæ spiritibus quasi cognata esse diximus, in eosque mutari facilia ; quod satis ostendit *pulsus, chalybeatorum* usu vehementer *increbrescens*. Ita *triplici* modo ad menses provocandos conducit *chalybs* ; ex quibus quidem operandi principiis deduci possunt omnia ea, quæ *chalybs* excitare solet, *phenomena*. Ex. gr. hinc facilè innotescit, quomodo, uti vulgò fertur, & vasa obstructa *aperiat*, & nimis laxa *astringat* : quæ quidem in agendo vires plerisque non *contrariæ* modò, sed & *inexplicabiles* videntur. Nemini quippe obscurum esse arbitror *chalybem* tum *gravitatis* suæ *momento*, tum attenuandi vi, obstructa vasa posse *aperire* ; hinc enim sanguinis lentescentis, unde oritur *obstructio*, cohærentiam tollit ; inde humores impetu quodam per *capillaria* propellit. Vasis igitur obstructione liberatis, eorum latera *astringi*, sive contrahi necesse est. Fibræ enim quæ, dum sanguis stagnaret, *relaxatæ* sunt, nunc, remoto omni obsta-

obstaculo vim suam naturalem exercent, h. e. *Elasticitate* forti sese *tono* suo restituunt, & statum *contractilem* recuperant; unde & *astringi* perhibentur. Et *tonum* quidem roborat *chalybs*, non modò quia vasa obstructione expediat, sed quia spiritus etiam, uti dictum est, uberius sufficiat; à quibus pendet omnis fibrarum *contractio*.

Perlustratis *emmenagogis*, sub examen revocanda sunt *astringentia*. Quorum virtus, cum non modò in *fibris vellicandis* & contrahendis, sed & in *humoribus coagulandis* incrassandisq; sita sit, ad hunc modum *mensēs* immodicos *restringere* posse concipitur. Sanguinis quippe particulis condensatis, & arctius inter se cohærentibus, imminuitur *velocitas*; non modò quia parcior fiat spirituum secretio, sed quia ea sit humorum resistantia, ut difficilius à corde protrudi queant. *Velocitate* verò languente, ita deficit sanguinis *momentum*, ut canales minùs jam distrahat, eorumq; viribus contrariis impar evadat. Ita vi sanguinis debilitatâ, *tonum* suum recolligunt, & coalescunt vasa. Quem tamen si minùs rite recuperent, paululumque adhuc dehiscant, non ideo tamen persistit *fluxus*. Globuli enim sanguinei, cum compactiores sint, & mole admodum excrescant, vasorum rimis ita tandem adhærescunt, ut hiatus omnem quasi cuneo quodam infarciant, & occludant. Has *astringentium* esse virtutes probabimus eodem ratiocinandi modo, quo in *emmenagogis* explicandis usi sumus. Loci igitur argumentorum proferentur quatuor, *remediorum*

mediorum scilicet, 1. *Effectus sensibiles*. 2. Cum sanguine adhuc tepente, & 3. Cum syrupo violarum commixtio: 4. *Injectiones in vivo animali per syringa institutæ*.

I. *Astringentium* operationem indicat duplex potissimum *effectus sensibilis*; quorum alter *vellicandi*, alter etiam *coagulandi* vim declarat.

1. *Sapor subacidus, acerbus, austerus, stypticus*; quorum unus saltem in *astringentibus* omnibus reperitur. Ita subacido sapore pollent *plantago, anagallis, sal marinum, spiritus nitri, & salis dulcis*; acerbo, *herbæ acetosæ, acetum, sal tartari fixus, tartarus vitriolatus, spiritus sulphuris, nitri, salis, & vitrioli*: Austero & styptico, *alumen, vitriolum, cortex granatorum, tormentilla, bistorta, balaustia, bolus armena &c.* Quòd si medicamenta hæc *linguam* pungant admodum & vellicent, quidni etiam & in canales delata *fibras stimulent*, & in statum *contractilem* reducant? quam fanè *contrahendi* vim, cùm *externè* adhibeantur *astringentia*, facile agnoscunt oculi.

2. *Pulsus depressus*; uti fit, si invaluerit usus *astringentium*. *Pulsus* verò *imminutio* indicat sanguinem, qui antea spatium satis amplum intra arterias occupabat, nunc in angustius cogi, seu *concretione* quâdam inductâ arctiùs multò cohærescere; unde non modò parcior spirituum secretio, & proinde impetus cordis imbecillior, sed minor canalium distensio. Ita sæpe in *scorbuto calido*, adhibitis *astringentibus*, remissior observatur *pulsus*.

Eodem

Eodem modo sanguinem, *salivatione* peractâ nimis rarefcentem, incrassant & quasi compingunt, adeoque & *pulsum* deprimunt *astringentia*.

II. Humores *astringentibus* coagulari, & concrefcere, ostendit ipforum cum *sanguine*, & *sero* commixtio. Feb. 12. *Sanguini* igitur *canis arterioso* admixta sunt sequentia;

1. *Spiritus nitri dulc.* Sanguis illico nigredinem contraxit, & in massam admodum spissam abiit. Feb. 13. Nigredo & crassities major.

2. *Spir. salis dul.* Color admodum fuscus. Compages crassa quidem, sed non æquè ac cum *spir. nitr. dulc.* concrefcens.

3. *Spir. nitr. bezoartic.* Citò & fortiter coagulabatur sanguis. Massa instar sanguinis putridi concreta. Feb. 13. Perpusilla pars tenuis adhuc, sed subfusca.

4. *Oleum vitrioli.* Subiit statim cum *fermentatione* concretio. Color ad nigredinem accessit. Feb. 13. Coagulum minùs fortè, quàm in cæteris. Serum quippe separatum est.

5. *Spir. nitri.* Fermentefcebat, & coagulatus est sanguis. Colorem induit subfuscum. Feb. 13. Supernatabat plurimum feri leviusculè concreti.

6. *Aqua fortis.* Fermentatio & coagulatio satis valida. Color subfusco affinis. Feb. 13. Massa nigra, spissa, & in grumos concreta. Serosa tamen pars minùs, quàm cum *spiritu nitri*, crassescens. Eadem ferè exhibuit *histortæ* succus.

7. *Spir.*

7. *Spir. salis*. Color multò magis, quàm cum *spir. salis dulcis*, nigrescens. Massa ad *syrupi* crassitiem accessit. Feb. 13. Eadem exhibuit.

8. *Spir. vitrioli philosoph.* Orta est fermentatio. Coagulum erat coloris cinerei.

9. *Acetum destillatum*. Coagulum levissimum. Color, quàm in sanguine puro, obscurior. Feb. 13. Coagulum fortius, & ad nigredinem propiùs accedens.

10. *Tinctura antiphthisica*. Massa ferè omnis in grumos concreta. Color satis obscurus. Feb. 13. Eadem phænomena.

11. *Spir. vitriol.* Massa spissa admodum, & quoad colorem quasi limosa.

12. *Balsam. Gilead.* Sanguis inspissatus valde, & quasi in putridum conversus.

13. *Sal. chalyb.* Coagulabatur sanguis, aliquâ tamen ex parte adhuc fluidus. Eadem omnino præbuit *sal vitriol.*

14. *Sacchar. saturn.* Concretio mediocris; color tamen satis vividus.

15. *Sal prunell.* Massa aliquatenus grumescens.

16. *Succus alchimillæ.* Præcipitata est massa nigra, & grumescens; reliqua pars satis fluida.

Cum sero etiam sanguinis *humani* instituta sunt *experimenta* sequentia: cui admistum fuit,

1. *Decoctum corticis granatorum.* Serum aliquantò concretius. Eadem exhibuit *tormentillæ*, & *bistortæ decoct.*

2. *Tinctura corallii.* Coagulabatur serum.

3. *Spir. salis.* Seri portiuncula concreta ; reliquum tenue, & liquefcens.

4. *Spir. nitri.* Coagulum forte. Seri tamen dimidia pars fluida permansit. Idem præbuit *spir. nitri bezoartic.*

5. *Oleum vitrioli.* In fundo subfedit coagulum. Liquoris maxima pars haudquaquam concreta.

6. *Spir. nitri dulc.* Nulla mutatio, nisi quòd serum albefceret.

7. *Spir. salis dulc.* Coagulabatur serum ; aliquâ tamen ex parte adhuc liquefcens.

8. *Tinctura antiphthifical.* Serum turbidius factum, aliquatenus etiam concretum.

9. *Aqua fortis.* Coagulum albefcens. Idem à *spir. vitrioli philofoph.* admixto.

10. *Aqua styptica.* Fortiffimè concrevit serum.

11. *Tinct. terræ japonicæ.* Coagulum rubrum.

12. *Solutio falis in aq. com.* Maſſa concreta coloris albi. Idem exhibuit *nitri in aquâolutio.*

Hiſce experimentis elucet ratio, quare *aſtrigentia*, qualia ſunt omnia ex *nitro* præcipuè & *ſale* elicita, *diureſin* promoveant, cùm enim ſanguinem ita *coagulent*, ut magnam interea *ſeri* partem intactam relinquant, fit ut, *coagulo* hoc globulis ſanguineis inducto, faciliùs ab iis ſecedat, perque *renes* tranſeat latex *ſeroſus*. Pariter ac *lacti* ſi ab *acidis* inferatur *coagulum*, partes *ſeroſæ*, quæ priùs cum *oleoſis* promiſcuè temperatæ ſunt, facto divortio diſcedunt, & ſeparantur.

III. *Aſtrin-*

III. *Astringentia* si *syrupo violarum* admixta sint, ulteriùs suas *coagulandi* vires indicabunt. Utì enim ea, quæ *syrupo violarum* colorem *viridem* inducunt, in *alkallicorum* classem reponi debent; ita etiam quicquid *rubrum* communicat^a, *acidis* annumerandum est. Idem affusis *acidis* emergit color, si loco *syr. violarum* adhibeatur *beliotropii* solutio, icu charta tincturâ *beliotropii cœruleâ* fucata, quemadmodum ostendit D. *Tournefort*^b. *Acidis* verò admixtis humores *concreescere* fatis ostendunt ea, quæ jam instituimus, experimenta. *Astringentibus* igitur *syrupo violarum* commixtis, ad hunc modum exorti sunt colores.

1. *Ol. vitrioli*. Color ruber, & rutilus.
2. *Spir. nitri*. Color adhuc splendidior.
3. *Spir. salis*. Rubedo adhuc rutilantior, & veluti ignea. Idem exhibuit *sp. salis dulc*.
4. *Spir. nitri bezoart*. Color ruber, sed non æquè ac in prioribus saturatus.
5. *Spir. nitri dulc*. Color purpureus. Idem præbuit *tartar. vitriolat*.
6. *Sp. vitrioli philosoph*. Color, qualis in *caryophyllo sylvestri*. Idem exhibuit *hydrargyri in aq. fort. solutio*.
7. *Aq. fort*. Color primò pallido-purpureus & pellucens, deinde ruberrimus. A *tartaro* autem in *aquâ forti* soluto, emerfit colore legans, qualis in *cerasis* conspicitur.
8. *Tinctura antiphthisica*. Color paulùm à cœruleo abhorrentior.

^a Boyle de color. p. 3. 95. ^b Pref. Historie des plantes environs de Paris.

9. *Æris in spiritu salis solut.* Color ruber, languidus tamen, & obscurus.

10. *Æris in aquâ fort. solut.* Color flavus, sed obscurus.

11. *Plumbi in ol. vitrioli solut.* Rubedo languidior.

12. *Plumbi in aq. forti solut.* Rubedo satis rutila.

13. *Spir. vitriol.* Color coccineus. Eadem exhibuit *elix. vitriol. Mynsicht.*

Ita cæteris *astringentibus* admixtis, si modò aliqua fuerit in *syrupo* coloris mutatio, ea omnis ad *rubedinem* inclinavit. *Rubris* mixturis instillatæ guttulæ aliquot *olei tartar. per deliquium fermentationem* excitabant; quâ peractâ, color in *viridem* mutatus est: qui quidem tantò erat *viridior*, quantò ante *oleum tartari* admistum intensior fuerat *rubedo*. Ita *oleo vitrioli* cum *ol. corn. cervi*, *lavedulæ*, *carui*, *caryophylli*, *nucis moschatæ*, *roris marini* &c. admixto, color emicuit *rubicundus*, & sanguineus: qui tamen affuso *oleo tartari* aut *tartaro* in *acet. solut.* rubescere omnino desiit, licèt interim ad *viriditatem* parum accedens.

IV. *Astringentibus* sanguinem coagulari docent, quæ per *syringa* fiunt, experimenta.

1. In venam canis jugularem immissa est *spirit. vitriol. ʒjss*. Brevi tempore ingruerat dyspnœa; deinde pulmonibus admodum laborantibus, canis obiit spasmodicus. In venis sanguis spissatus admodum & concretus, ita tamen inæqualiter, ut multum feri coagulo
immune

immune videretur. Cordis ventriculos infarcebat massa grumescens, & quasi polyposa.

In pulmonibus stagnavit sanguis ater, qui etiam lobis nonnullis extra vasa effusus adhæsit. Idem *vitrioli spiritus* cani, qui paulò antè *laudani liq.* ℥2 assumpserat, infusus ita humorum crasin immutavit, ut, qui modò ex incisâ venâ liquidissimus effluerat, jam in grumos concretus esset sanguis.

Eadem exhibuit *spir. nitri & salis*, nisi quòd grumi minùs inter se cohæserint.

2. In venam canis minuscule *jugularem* injeci *sacchar. saturni* in *decocto cortic. granat.* ℥ss. soluti, ℥2. Extemplo ferè cor languescere cœpit, ita ut admotâ ad thoracem manu pulsatio illius vix percipi posset: respiratio gravis & anhelosa; deinde spasimis ingruentibus, intra horæ minuta quinque successit mors. Apertâ venâ *jugulari & iliacâ*, exiit sanguis partim fluidus, partim grumescens tenaciterque concretus: supernatabat quasi oleum quoddam, quod & *saccharum saturni* sapore referebat. In aortâ sanguis ita concrevit, ut penè fibrosus evaderet. Pulmones coagulato sanguine repleti, nonnullis etiam in locis inflammatis. In corde sanguis universus ita concretus est, ut ventriculorum columnis quasi adnasci videretur.

3. In venam canis grandiusculi *jugularem* injecta est, duplici vice, *sanguinis dracon.* in *aquâ* tepidâ soluti ℥ss. Cordis *systole*, & respiratio frequentior; deinde sine ullo gravi symptomate, canis subitò concidebat mortuus.

Mox muscoli thoracis ita spasmis correpti sunt, ut tum ad visum tum ad tactum se per vices constringere, & remittere deprehenderentur. Apertâ venâ versùs caput *jugulari*, exiit sanguis spumofus, & dimidiâ ferè parte in grumos separatus. Sectâ *iliacâ*, totus in massam solidam concrevit, & portiunculæ illius admodum compactæ sunt, quasi cera fuisset injecta, venæ cavitati accuratè respondens, vascula tenuia, quæ renum tunicam externam percurrunt, oculis valde conspicua. Pulmones concreto sanguine intumescebant. Cor sanguine supra modum distentum est: qui quidem in dextro ventriculo *gelatinæ* crassitiem æquabat, in sinistro firmiùs concrevit.

4. In *jugularem* canis injecti *aceti* ℥2. Cordis contractio paulò frequentior; quoad cætera, nulla in cane mutatio. Deinde iteratâ injectione ad uncias itidem duas, respiratio difficilis, & laboriosa: quæ tamen, sectâ arteriâ *iliacâ* (unde exiit plurimum sanguinis nonnihil grumosi) ad consuetam normam redacta est. Injectis tandem ulteriùs ℥2, expiravit animal. Apertâ venâ *iliacâ*, erupit sanguis crassissimus, & in massam densatus: in venis cæteris, uti & arteriis, leviter concretus; in corde, præsertim in sinistro ventriculo, aliquâ ex parte fortiter coagulatus.

5. Venæ canis *jugulari* immissa est *spir. salis dulc.* ℥ss. unde respiratio fortis & sublimis, quæ tandem ita sensim defecit, ut nondum peractâ injectione canis moreretur. Musculis abdominis transversim sectis, subsiluerunt fibræ.

bræ. In arteriis venisque omnibus, sanguis admodum concretus. Pulmones inflammati. Cor sanguine oppletum, & quasi tensum. Ex ventriculo dextro extractæ sunt sanguinis 34. instar *gelatinæ* concreti. In sinistro, sanguis paucus, sed fortiter coagulatus: ex aortâ prodiit quasi polyposus. Eadem prorsus exhibuit in altero cane *ol. terebinth.* 31. nisi quod pulmones fuerint coloris atro-rubei, qualis in *je-core* frixo conspicitur.

6. In *jugularem* canis injecta est *sal. chalyb.* in *aquæ* 32 soluti, 33. Post palpitationem cordis & dyspnœam vehementissimam, obiit animal. Sectâ venâ iliacâ, sanguis non concretus quidem, sed nonnihil grumescens. Ita in corde & aortâ sanguis coagulum quoddam contraxit, licet, quàm in cæteris experimentis, imbecillius.

Ut verò clariùs adhuc elucescant, quas *emmenagogis* & *astringentibus* ascripsimus, virtutes, *attenuandi* scilicet & *coagulandi*, non abs re erit experimenta depromere, unde satis constabit ea, modo à nobis exposito, in se invicem reciprocè operari medicamenta. Igitur iis *mixturis*, quas ex *sanguine* & *emmenagogis* confecimus *sect. 2.* affusa sunt hujusmodi *astringentia*.

1. *Mixturæ* (ex *sanguine* & *sp. salis armon.*) affusus est *spiritus salis*. Massa omnis coagulata. Color, instar cœni, lutulentus.

2. *Mixtur.* (ex *sang.* & *decoct. sabin.*) *spir. nitri bezoartic.* Liquoris pars dimidia in massam duriusculam concrevit; reliqua fluida

quidem permanfit: videbatur verò nihil aliud effe, nifi *spiritus* affusi quædam portio, quæ post coagulationem superfuit.

3. *Mixtur.* (ex *sang.* & *laudan. liq. Syd.*) *ol. vitrioli.* in massam admodum spissam evafit; color fuscus, & subobscurus.

4. *Mixtur.* (ex *sang.* & *panacéâ opii liq.*) *spir. salis.* Fortiter concrevit. Color atro-rubeus.

5. *Mixtur.* (ex *sang.* & *aq. rutæ*) *spir. salis dulc.* Liquor coagulatus, & in grumos concretus. Color pullus.

6. *Mixtur.* (ex *sang.* & *sp. sal. armon. succinat.*) *spir. salis.* Coorta est fermentatio. Liquor partim in grumos abiit, partim fluidus perstitit.

7. *Mixtur.* (ex *sang.* & *aq. absinth.*) *spir. salis.* Statim in coagulum nigerrimum concrevit.

8. *Mixtur.* (ex *sang.* & *sp. corn. cerv.*) *ol. vitrioli.* Fermentatio, & concretio satis valida.

9. *Mixtur.* (ex *sang.* & *marrubii decoct.*) *spir. salis.* Idem exhibuit, ac mixtura prior cum *ol. vitrioli.*

Ad eandem normam *mixturis*, quas ex *sanguine* & *astringentibus* Sect. 2. composuimus, experimenti gratiâ, affusa sunt *emmenagoga*.

1. *Mixt.* (ex *sang.* & *spir. nitri dulc.*) *panacéâ opii liq.* Massa in fluorem denuo redacta est. Idem etiam effecit *panacéâ*.

2. *Mixt.* (ex *sang.* & *spir. nitri bezoart.*) affusa.

3. *Mixt.* (ex *sang.* & *oleo vitrioli*) *spir. sal. armon.*

Armon. Fermentefcebat. *Massa* multò tenuior, quanquam de nigredine nihil amiserit.

4. *Mixt.* (ex *sang.* & *aquâ forti*) *aqua rutæ.* Tota liquefcebat.

5. *Mixt.* (ex *sang.* & *spir. salis*) *panacæa opii.* Crassities penitus sublata est, & color floridus evasit.

6. *Mixt.* (ex *sang.* & *spir. vitrioli philosoph.*) *spir. salis armoniaci.* Compages admodum fluida. Color atro-rubeus.

7. *Mixt.* (*mixt.* ex *sang.* & *aceto destillato*) *sp. salis armon.* Texturæ raritas, & coloris vigor, qualis in sanguine naturali. Eadem quoque præbuit *spir. salis armoniaci.*

8. *Mixt.* (ex *sang.* & *tincturâ antiphthisic.*) admixtus.

Satis jam perspicuum esse arbitror, sanguinis *cohærentiam* ab *emmenagogis*, & *astringentibus* variè mutari; ab his scilicet *tenaciorem*, ab illis *rariorem* fieri. In quâ quidem *cohærentiæ* mutatione consistit unicè, quantum ego concipio, omnis illa *alterantium* virtus; licèt gradibus ad sensum minimè expositis fiat iste in compages varias humorum transitus. *Cohærentiæ fluiditatisque* causas exponere, uti esset opus prolixum admodum & laboriosum, ita etiam meo instituto satis alienum: ea quippe provincia ad *philosophos* potius pertinet; *medico* satis est *proximas* causas posse animo concipere & complecti, *ultimas* rimari minimè necessarium.



TA tandem absoluta est hæc de *Mensium* naturâ, remediisq; disquisitio; in quâ sanè id mihi parum arrogo, non posse subtiliùs perveſtigari *Menses*, aliis interim principiis eſſe minimè explicandos conſiſus. Quantum meus poterat philoſophiæ modulus, *Theoriam* veram atque perſpicuam tradere ſum aggreſſus: cujus quidem fabrica ſi anguſtior ſit, iſti tamen, quæ mihi ſuppeteret, materiæ reſpondet. Eos, qui eruditione *Mechanicâ* pleniùs imbuti ſunt, in quâ me ne quidem ſatis mediocriter eſſe verſatum fateor, multa his poſſe aſtruere facilè ſentio, non modò ad ornamentum operis, ſed etiam firmitatem.

Erunt tamen fortasſe quamplurimi, qui quòd cauſas morborum inveſtigare, ſive non conſueſſent, ſive non vellent, ſive non poſſent, omnem
rerum

rerum medicarum *Theoriam* in *Praxi* prorsus inutilem existimabunt; nonnulli etiam periculofam arguent.

Fieri quidem potest, quod & nonnunquam evenisse non diffiteor, ut iisdemum *Praxis* haud ita feliciter cesserit, qui *Theoriam* multâ cum laude excoluerunt; dum in hanc totis viribus intenti, illam fortè neglexerint: ita enim alterius altera opem poscit, ut nemo de Medicinâ egregiè mereri queat, qui utramque non conjunxerit. Quid verò absurdius esse potest, quàm ut, quò meliùs morbum intellexerit medicus, eò infelicior fore censeatur in adhibendâ medicinâ? ut, qui in malæ valetudinis origine ita acutùm cernit, ad remedia rite applicanda ineptior videatur? Quasi impedimento esset uberior rerum cognitio; aut ille demum felicissimam medendi methodum instituat, qui, quare hæc potiùs quàm illa institui debeat, omnino nescit. Sanè si quis ad morbos tollendos præ cæteris instructior sit, is huic operi plenius satisfaciet, qui eorum

rum

rum fontes optimè nôrit, qui variam humorum, unde profluunt, indolem perspexerit; qui denique normam illam, quâ sanguinis crasin aut conservat aut vitiat natura, penitus investigarit. In eo enim præcipuè spectatur medici sagacitas, ut de *morbi* ingenio acutè judicet; *curationis* formulas describere, cujusvis ferè est in medicinâ operarii.

At morbis, inquiunt, feliciter etiam medentur, qui nullâ *Theoriâ* imbuti sunt, qui nec corporis fabricam, nec modum, quo intra corpus operantur remedia, intelligunt. Sed si quis horum inspectâ *Praxi* animadvertat, quàm pleraque importunè adhibentur, quàm multa, eaque inter se plurimùm diversa, ad nauseam usque porriguntur remedia, agnoscet multum iis gratiæ habere Pharmacopolas, parum interim debere ægrotos. Cùm enim nec morbi rationem, nec certam aliquam medendi methodum satis exploratam habeant, omnem ferè *materiam medicam* percurrunt, haud

haud ignari scilicet pluribus esse ag-
grediendum viis, ne una fortè minùs
succedat. Qui verò ita in *Staticis* at-
que *Anatomiâ* versatus est, ut humani
corporis penetralia intimè pernôrit,
fluidi circulantis naturam & vires ex-
plorârit, dispiciet facilè quæ vera sit
morbi indicatio, & qualis potissimùm
adhiberi debeat medendi ratio: nullum
huic dubium injicit varia illa pharma-
corum supellex, quò minùs certa quæ-
dam ad rem suam aptissima deligat;
& ordinem, quem in iis præcipiendis
secuturus sit, secum multò antè con-
stituat.

Li quidem, qui in *Praxi* diu elabo-
rârunt, experienciâ ita sunt instructi,
ut morbis satis feliciter occurrant,
quanquam *Rationalis Pharmaceutices*
penitus ignari: neque id sanè mirum,
cùm iidem quasi in orbem sæpius re-
currant morbi. Quòd si novus ali-
quis morbus, nec à *Practico* antea vi-
sus exurgat, multùm hærebit vir ex-
periens, & commentarios veteres fru-
stra diu versabit, unde nihil lucis mu-
tuari

tuari queat, quod ad recens hoc symptoma illustrandum traducat. Contrà qui morborum causas naturæque vim penitus inspexit, siquid insolitum acciderit, id non tanquam aliquid monstri suspiciet; sed ideâ illâ, quam de morbis in animo jam antè formatam & descriptam tenet, ad hanc rem accomodatâ, faciliùs intelliget, quænam sit istius mali origo, quænam adhiberi debeat curatio.

Etenim qui *Theoriæ* medicæ omnino rudis est, non tam ipsos morbos, quàm morborum *vocabula* distinguit; qui certè error, uti in medicis non rarò deprehenditur, ita medicinæ plurimùm nocet. In *Febre* v. gr. eadem sæpe reperiuntur symptomata, cùm morbi causa sit multiplex, & dissimillimus humorum status: alia enim ex *redundantiâ*, alia ex *rarescentiâ*, alia ex *lentore* sanguinis oritur *Febris*; ita ut medendi methodum postulet pro causarum varietate diversam. Accersitus verò iste quasi *nominalis* medicus, si morbum hunc

Febrem

Febrē dici debere iudicat, eandem curationis normam persequitur, quæcunque sit in symptomatum causâ diversitas : quam quidem qui insistit viam, si medetur, felix certè erit, sed in arte suâ haud nimium peritus. *Rationalis* verò medicus, non tam *appellationem* morbi, quàm *naturam* explorat ; in hoc præcipuè laborat, ut statum sanguinis accuratè perspiciat ; unde etiam non vana remediorum quærit indicia.

Aliud etiam est in quo deficit *Theoriæ* expers *Præcticus*, viz. *remediorum applicatio*. Quia enim nec quo morbi oriuntur, nec quo in sanguinem agunt pharmaca, modum intelligit, morbis ea solum adhibet remedia, quæ longâ experienciâ prodesse compererit. Cùm verò id potius in medicinâ desideretur, ut præstantissima quæque remedia aliis etiam morbis, ac vulgò solent, applicentur, quàm ut exquirantur nova ; defectum hunc solus tollet *Rationalis* medicus, qui tum morbi, tum medicamenti vires

adeò callet, ut utriusque ad se invicem habitudinem clarè perspiciat : ita novo quodam artificio ad multos alios morbos ea extendet remedia, quæ uni fortè aut alteri quasi *Specifica* fatis pro arbitrio dicavit usus.

Contra *Theoriam* acriter contendunt nonnulli, dicetque eam in morbis explicandis parum proficere, quia ad omnes accommodari minimè queat. Sed hoc certè est imperitè disputantis argumentum, quasi quòd non in omnibus morbis, ideo in nullis obtinere possit *Theoria*. Aliquid est eam tenus prodiisse ; in nonnullis fanè illustrandis ita feliciter processit, ut ulteriùs facilè progredi posse videatur, si ingenio par fuerit medicorum industria. Fatemur quidem hanc, qualem volumus, *Theoriam* in medicinâ parum prodesse, nisi frequens etiam accedat *Praxis* ; quæ tamen si hâc duce dirigatur, erroribus, quos aliàs frustra cavet, minùs erit obnoxia.


Hæc quidem omnia & nôrunt, & fecerunt *veteres* ; neque aliis æquè
6
prin-

principiis morborum & medendi rationem illustrare posse arbitratur, *Prætorum* certè felicissimus, *Hippocrates*: igitur *Theffalo* suo, medicinæ studio, id præcipuè commendat, ut figurarum proprietates, & numerorum scientiam cognosceret; & disciplinæ isti, quæ illas edocet, & magnitudines quas-
cunque metitur, multum studii adhiberet^a. Eos nempe fontes unicè agnoscit, unde vera fluere queat rerum medicarum cognitio. Atque hæc quidem elementa, ad quæ perdiscenda ita vehementer hortatur filium, ipsi penitus perspecta fuisse credibile est. Audiit enim, uti accepimus, & sectatus est *Democritum*, qui temporibus illis eam docuit philosophiam, quæ hodie dicitur *mechanica*; quæque ita parum recens est, quod vulgò fertur, ut sit omnium longè vetustissima. Hæc adeo institutus disciplinâ *Hippocrates*, naturam & observavit, & intellexit acutissimè: & quia naturæ sunt maximè consentaneæ, ideo præstantissimæ e-

^a Epist. ad Theffal.

tiam habentur, quas de morbis conscripsit, historiæ. Itaque non leve præsidium operi huic accessisse existimo, quòd ubique ferè sententiæ meæ vindicem & patronum adduxerim, *Hippocratem*.





INDEX

RERUM.

A

- A** Cria menses cient 178
Æthiops minerale menses ci-
et 172
Affectus animi quomodo ci-
ent menses 61
Alterantia quomodo operan-
tur 185
Alkalica attenuant sanguinem
165
Cum syrupo viol. mix-
ta colorem viridem
excitant ib.
Cum sublimat. corrosiv.
subflavum 167
Alvus dura à suppressis men-
sibus 79
Amara menses cient 158
Anni tempestates periodicæ
39
Non constantes ib.
Anxietas præcordiorum à sup-
pressis mensibus 81
Analeptica post menses nimios
adhibenda 137
Aniculæ sicciore 51
Aortæ truncus descendens
major in fœminis 20
Appetitus quare menstruis in-
stantibus deicitur 49
Apoplexia à suppressis men-
sibus 88
Quot modis efficitur. ib.
Apoplexiæ causa ib.
Aquæ Astropenses in suppress-
is mensibus utiles 120
Aquæ potatio perspirationem
impedit 17
Articulorum dolor à suppress-
is mensibus quomodo ori-
atur 75
Aromatica menses cient 158
Argumenta contra plethoram
30, &c.
Asthma à suppressis mensibus
82
Astringentia menses imminu-
unt 65
In fluxu nimio adhiben-
da 136
Astringentium externo-
rum operatio ib.
internorum
operatio 138
Astringentia cum syrupo vi-
ol. mixta colorem rubrum
excitant 179
Cum emmenagogis mix-
ta 183

INDEX RERUM.

Astringentium effectus sensibiles 175
 Cum sanguine commixtio 176
 Itidem cum sero 177
 Cum syrupo violarum commixtio 179
 Injections 180
 Astringentia interna an stimulo agant 138
 Sanguinem coagulant 175
 Quomodo menses sistunt 174
 Pulsum deprimunt 175
 Quomodo urinam moveant 178
 Athletarum habitus periculosus 69
 Attenuantia quomodo menses cient 155, 156
 Quando adhibenda 157
 Atrophia à mensibus nimis 134, 145
 Quot modis fiat ib.

B

Balnea menses retardant 64
 Balnea ad suppressos menses 96
 Balsamica in mensibus nimis adhibenda 139
 Quo tempore ib.
 Quomodo operantur ib.
 Barba à suppressis mensibus 94
 Bibaces hydropi obnoxii 78
 Et apoplexiæ 89
 Biliosis maturius fluunt menses 2
 Et quare 42
 Biliosum temperamentum quale ib.
 Bruta cur mensibus immunia 14, 27
 Quomodo utero gerunt, cum non habeant men-

ses 35
 Prægnantia voraciora 10.

C

Cachexia à mensibus nimis 60, 181
 Calida menses cient 158, 159
 Calor quid 47, 130
 Chalybs aliquando obstructiones auget 151
 Pulsum excitat 156, 158
 Spiritus instaurat 173
 Triplici modo menses cient ib.
 Quomodo fit deobstruens & astringens 174
 Sanguinem attenuat 168
 Camphoræ externè adhibitæ vis 122
 Cantatrices mensibus immunes 19
 Caput quare afficitur suppressis mensibus 86
 Cardiaca pulsus excitant 158
 menses cient ib.
 Cardiaca quomodo operantur 157
 Cephalalgia à suppressis mensibus 85
 A Suturis nimis arctis 86
 Cephalalgia, instantibus mensibus 2, & quare 48
 In virginibus frequentior ib.
 Non à sympathiâ 86
 Chyli cruditas à plethorâ 48
 A Lentore 18
 Cachexiam parit 132
 Coitus quomodo cient menses 60
 Suppressionis menstruæ remedium ib.
 Colica à suppressis mensibus 80
 Colorum experimenta 165, 179
 Con-

INDEX RERUM.

Convulsio à repletionem	91	struis ad coxas percipitur	48
Quid	ib.		
Ab inanitione	130	Dolor capitis à suppressis men-	
Cauteria quomodo cient men-		sibus, & quare	15
ses	107	Pulsans 85. Gravedino-	
Convulsio à mensibus nimis		sus	ib.
periculosa	131	Quare ad sinciput & oc-	
Corpus quando idem manet		ciput	85
	12		

Cortex peruvianus potenter	
attenuat	156, 158
Cucurbita ad crura in suppress-	
is mensibus	106
Cucurbita ad mammas in	
mensibus nimis	137
Curvitas canalium quid effi-	
ciat	23, 24, 25
Chlorosis à suppressis mensi-	
bis	49
Crurum lassitudo quare à ple-	
thorâ. 49. in gravidis	ib.

D

Desidia perspirationem immi-	
nuit	17
Delirium quid	89
Diaphoretica in mensibus ni-	
mis vix adhibenda	138
Menses cient	159
Sanguinem attenuant.	
	148
Quomodo lentorem au-	
geant	150
Diaphoresis non est actio me-	
dicamenti primaria	148
Ideo neque certa	ib.
A poris pendet	149
Dyspnœa in suppressis men-	
sibus	81
A vesiculis bronchialibus	
	ib.
A musculis thoracis	82
Ab hypochondriis inflatis	
	ib.
Distensio vasorum in plethorâ	
	70
Dolor quare instantibus men-	

E

Emetica quando in suppressis	
mensibus adhibenda	109
In fluxu nimio vitanda	
	137
Emmenagoga plethoram ex-	
citant	140
Eodem modo agunt, licet	
menses non cient.	149
Sanguinem attenuant	
	155
Quomodo menses cient	
	156
Nonnulla sanguinem ra-	
refaciunt	ib.
Emmenagoga pulsum exci-	
tant	158
Pleraque alkalica	165
Cum astringentibus mix-	
ta	183
Emmenagogorum effectus	
sensibiles	157, 158, 159
Cum sanguine commix-	
tio	159, 160
Cum sero commixtio	
	162
Cum syrupo violarum	
commixtio	165
Injectiones	167
Emplastrum resolvens	121
Evacuatio inhibita quomodo	
menses provocat	61
Nimia quomodo retar-	
det	64
Evacuatio additione minor,	
in plethorâ	12, 13
Evacuationis additionisq; ea-	
dem proportio in brutis	14
O	3
	1n

INDEX RERUM.

In foeminis impar	13,	Fomenta ad suppressos men-	
	14	ses	96
Evacuationes sensibiles in se-		Purgationi praemittenda	97
nectute augentur	53		
Evacuationibus subitis & in-		Foetus materno sanguine nu-	
gentibus quomodo immi-		trit	5, 7
nuuntur vires	129	Non per os solum	5
Experimenta cum sanguine	176	Foetus recentis pondus	7
		Foetus an menstruo sanguine	
Cum sero	177	alatur	
Cum syrupo viol.	179	Imbecillis, si gravidæ flu-	
Per injectiones	180	ant menses	54
Per mixturas	113	Fluidorum pressio qualis	21
Externa remedia in utroque		Fluor albus à suppressis men-	
suppressionis genere adhi-		sibus	90
benda	96, 97	Ex glandulis uteri	ib.
In utroque fluxus nimii		Quando symptomaticus	ib.
genere	139	Mensibus erumpentibus	
Extremorum frigus à fluxu		cessat	ib.
nimio	130	A mensibus nimis	134
Quot modis	ib.	Fluxus menstruus quibus diu	
		durat	2, 136
F		Et quare	44
Febris quomodo ciet menses		Quibus citius termina-	
	59	tur	3
Febris intermittens periodus		Fluxus mensium nimius quot	
explicatur	40	modis efficitur	127
Paroxysmus varius	41	Non ita familiaris ac sup-	
Febres pleræque à plethorâ		pressio	ib.
	62	Periculosior tamen	ib.
Febricula à mensibus instanti-		Et quare	128
bis	48	In puerperium expertis	
A suppressis	75	frequentior	135
Fermentum non est mensium		Fluxus nimii symptomata.	
causa	9, 10, 42		128
Fermenta circulationi repug-		Causa	ib.
nant	9	Fluxus nimius vel à vasorum	
Fermenta nulla in visceribus		vel à sanguinis vitio	138
	ib.	Quando à vasis	ib.
Neque in sanguine	ib.	à sanguine	ib.
Frigus quomodo menses re-		A virium imbecillitate ju-	
tardat	63	dicandus	135
Frictiones ad suppressos men-		In quibus sistendus	135,
ses quare adhibentur	106		136
Fibrarum durities plethoræ		Fluxus nimii historiae	
causa	51		140

INDEX RERUM.

G

- Galenī de causis mensium sententia 4, 7, 11
 Glandulæ à suppressis mensibus oppletæ. 80 à frigore ib.
 Gravidis deficiunt menses 3
 Et quare 54
 Gravidæ à coitu abortiunt 60
 Graviditatis symptomata quomodo à suppressorum mensium symptomatis dignoscenda 125, 126
 Gravitas corporis à deficiâ 18
 A suppressis mensibus 80
 Gravitas pectoris à suppressis mensibus 81
 Gibbosi dyspnœæ obnoxii 82
 Globus ad fauces à suppressis mensibus 22
 Quare ib.
 Glutinantia in mensibus nimis adhibenda 139
 Gulosis diu fluunt menses 3
 & quare 44
 Gulosi hydropi obnoxii 78

H

- Hæmorrhagia à suppressis 92
 Præcipuè in virginibus 93
 Hæmoptoe à suppressis mensibus 88
 Hæmorrhoides incisæ callescunt 52
 Solvunt insaniam 90
 Hæctica à mensibus nimis. 132
 Quot modis efficitur 133
 A dilatatis canalibus ib.
 A sanguine imminuto ib.
 Quando gravior 134
 Hydrops imminuit menses 65

- A suppressis mensibus 77
 Ab aliis evacuationibus inhibitis 78
 A mensibus nimis 132
 Hysterica passio ciet menses.
 Spasmi species 90
 A suppressis mensibus ib.
 A fontanellis occlusis 92
 In viris 51, 92
 A mensibus nimis 130, 131

- Humida corpora minus perspirant 17
 Humidæ, suppressis mensibus, citius intumescunt 77
 Humidis menses copiosius fluunt 44, 136
 Humorū crasis ignota est causa cur accusentur medicamenta 154
 Humorū temperies à medico perspicienda 155

I

- Ictus major in curvis canalibus 23, 24, 25
 Fortior pressione 25
 Ictus magnitudo quomodo æstimanda ib.
 Insania quid 89
 A suppressis mensibus ib.
 Evacuandis curatur 89 & 90
 Ischuria quomodo à vesicâ nimis distentâ 32

L

- Lac ab aquis frigidis vitiatur 65
 A suppressis mensibus 94
 Lactantibus menses deficiunt 3
 Et quare 54
 Macilentis fluunt 32
 Lacteorum oscula quid ad catharsin faciant 112
 O 4 Lactis

INDEX RERUM.

Lactis usus imminuit menses 54, 65
 Languor quare menstruus instantibus mulieres invadat 49
 Lassitudo crurum unde ib.
 Lentor à frigore 63
 Menses supprimit 34
 A plethorâ 70
 A motu cordis imminuto 71
 Qualem pulsum efficiat 72
 Plethoræ causa 73
 A chylo crasso 79, 132
 Palpitationem efficit 85
 A velocitate imminutâ 132
 Aliquando à diaphoreticis 150
 Lentor supprimit menses 34
 Febris intermittens causa 40
 Lindani doctrina de venæ sectione examinata 103
 Lumborum dolor quomodo à plethorâ 48
 Luna non est mensium causa 8, 42

M

Macilenti plus sanguinis habent 31
 Ideo V. S. melius ferunt 32
 Macilentis copiosius fluunt
 Menses 44
 Mammarum tumor, instante fluxu 50
 Materia medica post menses nimios qualis 139
 Materię quantitas ex pondere dignoscitur 12
 Medendi methodus in suppressione menstruâ 95
 Intentio ib.
 Duplex 96

Qualis cum à vasis oriatur suppressio ib.
 Qualis cum à sanguine 97
 In fluxu mensium nimio 135
 Qualis cum à vasis oriatur fluxus 136
 Qualis cum à sanguine 137
 Melancholicorum pulsus rarus 63
 Menses quando incipiunt, quando desinunt 1
 Et quare 51, 52
 In quibus maturius fluunt 2
 Mensium quantitas 13
 Pro ratione ætatis diversa & quare 46, 50
 Qualitas 1
 Periodi 2
 Mensium causa finalis 47
 Foetus nutritio 5, 7
 Mensium causa efficiens 7
 Plethora 11, 36
 Menses quâ vi evacuantur 22
 Quare per uterum 23, 24, 25, 26, 27
 Et ab utero & à vaginâ fluunt 21
 Ex capillaribus vasis 29
 In puellis perquam modici 50, 52
 Mensium suppressio non à plethorâ 33
 A lentore 34
 Per aliena loca eruptio 55
 Menses ad conceptum non necessarii 4, 35
 Ad concipiendum aptiores facit 45
 Post morbum chronicum suppressi 3, 45
 A quibus maturius cientur 58
 A quibus retardantur 62
 Menses

INDEX RERUM.

Menses critici	59	A suppressis mensibus	114
Quot modis imminuti	66	A terrore reſtincta	64
Quomodo à ſaphænæ ſeſtione inhibiti	104,	In pueris pubeſcentibus	51
	105	Nutritio quid	134
Pallidi	115	O	
Mercurius lentorem tollit	108	Obefi minùs ſanguinei	31,
Purgantibus admiscenda	ib.		44
Attenuat ſanguinem	172	Obefis menses parciùs fluunt	44
Acida retundit	173	Citiùs ceſſant	45
Quomodo menses ciet	172	Obefæ plerumque ſteriles	ib.
Mercurii gravitas	ib.	Obefis menses ſupprimuntur	ib.
Mœſtitia quomodo menses retardat	63	sine noxâ	ib.
Momentum ſanguinis quo- modo augetur	21	Objecta quomodo moveri videantur, immoto oculo	87
Augetur in plethorâ	22	Occipitis dolor à ſuppreſſis menſibus	86
Quando à yenæ ſeſtione augetur	96, 101	Et tumor	87
Motus violentus quomodo ci- et menses	60	Odorata menses cient	158
Motus inteſtinus in ſanguine non datur	9	Opiata remittunt appetitum	49
Motûs imminutio in vafis ute- rinis	23	Vires iñſtaurant	114
Motus rerum externarum quomodo percipitur	87	Quomodo adhibenda	ib.
Mulieres concipiunt, etiam ſine menſibus	4	Opium animum exhilarat	152
Mulieres viris imbecilliores	15	Vires iñſtaurat	ib.
Humidiores	16	Calculus & fœtum ex- pellit	ib.
Habent plus ſanguinis quàm viri	17	Dolorem quomodo tollit	ib.
Mulierum textura mollior	15	Febrem intermittenteſ ſolvit	ib.
Mulieres ſanæ in eodem ſtatu permanent	13	Singultum, vomitum, & hy- percathariſin ſiſtit	ib.
Mulieres citiùs adoleſcunt quam viri	17	Profluvia ſiſtit	153
Menſtris ceſſantibus pin- gueſcunt	53	Tuſſim ſedat	ib.
		Pruritum ciet	ib.
		Menses & lochia provocat	ib. 159
		Dyſpnœam, & ſtuporem in- fert	ib.
		Somnum conciliat	153
		Pupillam dilatat	154
		Iſchuriam inducit, & pa- ralyſin	ib.
		Opium	

INDEX RERUM.

- Opium externè adhibiti vis 122
Opium quomodo sanguinem
 incrassare dicatur 158
 Sanguinem attenuat 151,
 152, 158
 Sudorem movet ib.
 153, 159
Opium operatio primaria 152
 Effectus 152, 153, 154
 Quomodo omnes ab at-
 tenuatrice vi oriantur
 ib.
Otiosa vita quid faciat 17,
 44, 50
- P
- Placenta in utero per bienni-
 um retenta 142
 Quomodo exclusa ib.
Partus menses retardat 64
Pallor à lentore 79, 130
 A fluxu nimio 139
 A defectu sanguinis ib.
Palpitatio cordis quomodo fit
 84
 A suppressis mensibus
 ib.
 In quibus morbis fre-
 quentior 85
Periodi ab authoribus parum
 explicatæ 37
 Et quare 42
 Quomodo à Plethorâ
 pendent 37, 38, 42
 Quare ad definitum tem-
 pus redeunt 39, 41
 Aliarum rerum explican-
 tur 40, 41
 Quare variæ in diversis
 fœminis 43
Discrepant pro ratione ætatis
 46
 Victus 44, 46
 Temperamenti 43
 Soli ib.
Periodus mensium bimestris
 118
- Perspiratio in fœminis quare
 minor 15, 16, 17
 Differt à sudore 18
 Exercitio promovetur 17
 A sudore minuitur 18
Plethora in fœminis demon-
 stratur 13, 14
 Quomodo accumulatur
 12, 13
 Non accumulatur in bru-
 tis 14
 Quomodo accumuletur
 37, 38
Plethoræ causæ tres 15, 16, 17
 Origo 51
Plethora quomodo menses
 moveat 22, &c.
 Contra Charletonum de-
 fenditur 30
 Non potest menses sup-
 primere 32, 33, 105
 Regit periodos 44
 In provectionibus deficit
 51
 Excitatur iis omnibus,
 quæ menses cient 62
Plethora ad vasa à rarefactio-
 ne 62
Plethoræ effectus 68
 Periculum 69
Plethora lentoris causa 70
 Qualem pulsum efficiat 69
Plethora ad vires à suppressis
 mensibus 80
Podagra à suppressis mensibus
 76
Potatio ciet menses 60
Prægnantibus deficiunt menses
 3
Phthisis à suppressis mensibus
 83
Pudendi situs in fœminis 20
 Quid ad menses faciat
 26
Pulsus plenus & imbecillis ve-
 næ sectionem indicat 100
 Post purgationem fortior
 108
 In

INDEX RERUM.

In salivatione vehemens	172	Rarefacientia quando adhibenda	157, 165
Pulsus roboris index	15	Remediorum vires	147
In fœminis imbecillior	13	Remedia utero non specifica	148
Qualis in plethorâ	69	In sanguinem agunt	ib.
Quomodo creber	ib.	Remediorum operatio sensibilis non certa	148, 149
validus	ib.	Primaria est certa & uniformis	149, 150
plenus	ib.	Varius effectus unde	150
Qualis à lentore	72	Remediis incertitudo falsò exprobratur	149, 154
Quomodo imbecillis	ib.	Remediis effectus aliquando varius	150
Rarus	ib.	Aliquando contrarius	150
Inæqualis à chylo crasso	ib.	Quare	151
A crasi sanguinis	73	Revellentia in mensibus nimis adhibenda	137
Intermittens à suppressis mensibus	85	Et qualia	138
Quando excitatus à venæ sectione	99, 101	Robur quid	15
Pulsatio arteriarum à suppressis mensibus	74	Quomodo æstimandum	128
Quando definit	ib.	In ratione sanguinis triplicatâ	129
Purgantium vires non ex dejectionibus judicandæ	111	Rusticis parcius fluunt menses	144
Purgantia aliquando alvum non subducunt	ib. & quare ib.		
Purgantium varia efficacia unde	112		
Mitiora tantùm in mensibus nimis adhibenda	38		
Purgantia quomodo crient menses	107		
Purgantium duo genera	ib.		
vel primas vias, vel sanguinem afficiunt	107, 108		
Purgantia qualia adhibenda in suppressis mensibus	108		
Purgantium virtus à salibus	108		
Purgantia attenuant sanguinem	ib.		
Rarefcentia humorum unde	157		
Menses ciet	ib.		
Poteit esse sine attenuatione	ib.		

INDEX RERUM.

bus secanda	102	Suffocatio à suppressis men-	
Quando	ib.	bus	91
Quarto	102, 103, 104	A mensibus nimis	131
Sapor acris quid indicet	158	Suppressionis menstruæ symp-	
Acidus quid	157	tomata	67
Secretiones in ratione veloci-		Curatio	95
tatis & orificii	16	Suppressio vel à vasorum vel	
Quomodo à velocitate		à sanguinis vitio	68
pendet	131	Quando à vasis	ib.
Sincipitis dolor à suppressis		A lentore	71, 73
mensibus	85	Quænam morbosa	95
Symptomata instante fluxu		Quomodo à vasorum vi-	
mensium	2	tio	96
A plethorâ deducuntur		A vasis curatu facilior	
	47		97
Mensium suppressorum	67	Suppressorum mensium histo-	
Quænam à plethorâ	68	riæ	110
Quænam à lentore	72	Suppressio à frigore	116
Varia in diversis mensibus		A venæ sectione	120
	94		
Fluxus nimii	128	-T-	
Syncope a suppressis mensibus		Temperamentum humidum	
	85	perspirationi officit	17
Quot modis fit	85	A partium mollitie	16
A fluxu nimio	129	Theeæ potu menses imminuti	
Solidæ partes exhaustæ diffi-		Tincturæ spiritu vini extra-	
cultè resarciuntur	128	ctæ quid faciant	164
Sphincter vesicæ ischuriam		Tinctura antiphthifica ad	
adjuvat	33	menses nimios prodest	141
In ischuriâ contractus	ib.	Tumores à suppressis men-	
Spiritus vini sanguinem coa-		bus	76
gulat	164, 168	Etiam & tubercula	77
Quomodo menses ciet		In humidis citius fiunt	
	164	ib.	
Quando in suppressis men-		Tumor in tibiâ à suppressis	
sibus adhibenda	165	mensibus	116
Spiritus quomodo instauran-		Tumores à mensibus nimis	
tur	156		132
Spinæ dolor à suppressis men-		Tussis à suppressis mensibus	
sibus	74		81
Variolarum imminenti-		A glandulis tracheæ	ib.
um signum	75		
Sternutatio ciet menses	61	U	
Stomachica menses ciet	159	Ulcera, subito siccata, peri-	
Sublimat. corrosivi experi-		culosa	57
mentum	179	Urinæ stillicidium à suppressis	
Suffitus ad suppressos menses		men-	
	96		

INDEX RERUM

menfibus	92
Suppreffio quot modis ib	
Urinofa menses cient	158
Urticæ succus quomodo narium hæmorrhagiam fiftit	136
Uteri ftructura	20
Quid ad menses ibi evacuandos conferat	23, 24, 25
Uteri arteriæ & venæ per anafomofin conjunctæ	20
Uteri & vaginæ interna tunica qualis	ib.
Uteri inflammatio quomodo à fuppreffis menfibus	74
Gangræna	ib.

V

Varices à fuppreffis menfibus	75
Quomodo formentur	76
Quare ad partes inferiores	ib.
Solvunt infaniam	90
Variolæ cient menses	59
Vaforum umbilicalium & uterinorum anafomofis	56
Vafa uteri in virginibus anguftiora	93
Et quare	ib.
Vafa uteri contorta	20
Quomodo menfibus evacuandis inferviunt	23, 24, 25
Valvularum ufus	27
Defectus in utero quid faciat	28
Vafa uterina quare faciliùs rumpantur	22, 23
Relaxanda in fuppreffione menftruâ	96
Vaforum tumor & pulfatio à plethorâ	68
Velocitas fanguinis augetur in plethorâ	22
Est in ratione copiæ	68

A venæ fectione	98
Victus increffans quomodo menses retardat	65
Acris ciet	61
Venæ fectio ad fuppreffos menses	98, 99
Quo tempora instituenda	98, 100, 102, 106
Quo loco	98, 102
Quare in talo	102
Velocitatem fanguinis intendit	98
Et quare ib.	100, 101
Venæ fectionis indicatio	100
Venæ fectio vix præmitti debet	100, 106
Venæ fectio menses immittit	54, 56
Abortum præcaver	54
Venis uterinis defunt valvulæ	21
Ventris tumor inflante fluxu	50
Ventriculi inflatio, & tormina à fuppreffis menfibus	78
Vertigo a fuppreffis menfibus	87
Vertiginis ratio explicatur	ib.
Virgines menfibus nimis rariùs laborant	
Vires imbecilles quomodo perfpirationem imminuunt	15, 16
Quomodo accumulante Plethoram	16
Virium imbecillitas à plethorâ	80
Grave efficit corpus	ib.
A nimio fluxu menfium	128
Quomodo crefcit	ib.
Quare ab evacuationibus magnis	129
Fluxus nimii regula	134
Vires quomodo poft fluxum cohibitum inftaurandæ	139
Viraginum pulfus fortior	19

INDEX RERUM.

Viragines mensibus immunes	18	etâ evacuatione sanguinis periodicâ	58
Virgines suppressioni maximè obnoxiaë 66 & hæmorrhagiæ à suppressione	93	Vitrioli spiritus quomodo hæmorrhagiam sistit	136
Viri habent menstruam evacuationem 41. & quare	42	Vomica pulmonum quid	82
Ante crisin quomodo affecti	50	Quomodo à suppressis mensibus	16
Hysterici evadunt, restricti		In glandulis bronchiorum	
		Vomitum ciet menses	61
		Sanguinis menses nimios sistit	137

F I N I S.



*Catalogus Librorum prostantium apud
Gul. & Joh. Innys.*

Hippocratis de Morbis Popularibus Liber primus & tertius Gr. Lat. His accommodavit novem de Febribus commentarios *Joannes Friend*, M. D. Coll. Med. Londin. & Societatis Reg. Socius, 4to. & 8vo. 1717.

Johannis Friend, M. D. de Purgantibus in secundâ Variolarum confluentium Febre, adhibendis Epistola 4to. 1719.

De Curandis Febribus continuis, liber, in quatuor divisus sectiones; quarum singulæ singulorum Morbi Temporum, quæ totidem quoque sunt numero, Remedia continent. Autore *Fodoco Lommio*. 8vo. 1718.

Sanctorii Sanctorii de Staticâ Medicinâ Aphorismorum Sectiones septem cum Commentario *Martini Lister*, 12mo. 1714.

Pharmacopœia Extemporanea, sive Præscriptorum Chilias, in quâ Remediorum elegantium & efficacium Paradigmata, ad omnes fere medendi Intentiones accommodata candidè proponuntur; unâ cum viribus, Operandi ratione, Dosibus & Indicibus annexis. Editio quinta longè auctior & emendatior, per *Tho. Fuller*, M. D. Cant. 12mo. 1714.

Pharmacopœia Extemporanea: Or a Body of Medicines, containing a thousand select Precepts answering most Intentions of Cure; to which are added useful *Scholia*, a Catalogue of Remedies, and a copious Index for the Assistance of young Physicians; the third Edition, with large Additions by the Author *Tho. Fuller*, M. D. 8vo. 1719.

Phthisiologia: or a Treatise of Consumptions, wherein the Difference, Causes, Signs, and Cure of all sorts of Consumptions are explain'd. By *Richard Morton*, M. D. the second Edition 8vo. 1720.

Gault. Harris, M. D. de Morbis acutis Infantum. Editio tertia auctior. 8vo. 1720.

Processus integri in morbis fere omnibus curandis, nec non de Phthisi Tractatulus, Editio quarta à *Tho. Sydenham*, M. D. 12mo. 1712.

Pharmacopœia Colleg. Reg. Londini Remedia omnia succinctè descripta, Editio quarta, per *J. Shipton*. 12mo. 1711.

Tractatus de Fœtu Nutrito: or a Discourse concerning the Nutrition of the Fœtus in the Womb, demonstrated to be by Ways hitherto unknown; in which is likewise discover'd the use of the Gland Thymus; with an Appendix, being some practical Observations on the Food of Children newly born,

Catalogus Librorum prostantium apud G. & J. Innys.

born, and the Management of the Milk of Women. By *F. Bellinger* of the College of Physicians.

The Symptoms, Nature, Cause, and Cure of a Gonorrhœa. The third Edition with Additions. By *W. Cockburn*, M. D. Fellow of the Royal Society and College of Physicians. 8vo. 1719.


Pharmacopœia Bateana, in Libros duos digesta. Primo Compositiones Galenicæ, altero Processus Chymici: Ordine Alphabetico exarantur: Viribus Dosibusque illustrantur: Atque Catalogis & Indicibus accommodantur. Cura & Opera *Thomæ Fuller*, M. D. Cantab. 12mo. 1719.

Anthropologia Nova: Or a new System of Anatomy, describing the Animal Oeconomy, and a short rationale of many Distempers incident to human Bodies. Illustrated with above fourscore Figures, drawn after the Life by *James Drake*, M. D. late Fellow of the College of Physicians and Royal Society. The second Edition in 2 Vol. 8vo.

A Treatise of the Asthma in four Parts, containing 1. A History of the Fits, and the Symptoms preceding them. 2. The Cacochymia which disposes to the Fit, and the Rarefaction of the Spirits which produces it. 3. The accidental Causes of the Fit, and the Cure of the Astmas are observ'd. 4. The Cure of the Asthma Fit, and the Method of preventing it is proposed, &c. By *Sir John Floyer* of *Litchfield*, Kt. The second Edition corrected, 8vo. 1717.

Specimen Physico-medicum, de corpore humano, & ejus morbis; or an Essay concerning the Knowledge and Cure of most Diseases afflicting human Bodies; to which is annex'd a short Account of Salivation and the use of Mercury. By *P. Paxton*, M. D. 8vo.

Praxis Medica. The Practice of Physic: Or *Dr. Sydenham's Processus Integri*, translated out of *Latin* into *English*, with large Annotations, Animadversions, and practical Observations on the same. Containing the Names, Places, Signs, Causes, Prognostics, and Cures of all the most usual and popular Diseases afflicting the Bodies of human Kind, according to the most approved Modes of Practice. Among which you have the Pathology, and various Methods of curing a Clap, or virulent running of the Reins and the *French Pox*, with all their Symptoms, beyond whatever was yet published on this Subject, by any other Author, Ancient or Modern, since the Diseases first appear'd in the World to this Day. The third Edition, enlarged throughout with some thousands of Additions not in the first Impression. By *W. Salmon*, M. D. 8vo. 1716.



164

